

※ 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.

일반의약품
KGMP 적격업체
2207-06

속쓰림엔 속이 편안 위소탈정

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분 : 메타규산알루민산마그네슘(KP)..... 40.0mg
((건조물이며)산화알루미늄으로서 12.92mg, 산화마그네슘으로서 5.08mg)
탄산수소나트륨(KP)..... 50.0mg
디아스타제-프로테아제-셀룰라제(별규)..... 20.0mg
(전분당화력(pH4.5) 278단위, 단백소화력(pH3.0) 170단위)
스코폴리아엑스(KP)..... 5.0mg
(총알칼로이드[히요시아민(C₁₇H₂₃NO₃: 289.37) 및 스코폴라민(C₁₇H₂₁NO₄: 303.35)]으로서 50μg)
리파제(KP)..... 7.5mg
(지방소화력(pH6.0) 45단위)
감초가루(생규)..... 25.0mg
(글리시리진산으로서 0.63mg)
침강탄산칼슘(KP)..... 100.0mg
트리메부틴말레산염(KP)..... 50.0mg
- 첨가제(타르색소) : 황색 2호, 황색 4호, 청색 1호
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타 첨가제 : 옥수수전분, 포비돈, 자치한도히드록시프로필셀룰로오스, 크로스카멜로오스나트륨, 콜로이드성이산화규소, 스테아르산마그네슘, 박하유, 오파드라이 그린 03B610039

[성상]

녹색의 원형 필름코팅정제

[효능 · 효과]

위산과다, 속쓰림, 위부(상복부)불쾌감, 위부(상복부)팽만감, 식체(체함, 위체), 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부(상복부)팽만감

[용법 · 용량]

성인 1회 2정, 1일 3회 매 식후 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
1) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
1) 이 약으로 알레르기 증상(발진, 발적(충혈)되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
3) 신장애(신장(콩팥)장애) 환자
4) 간장애 환자
5) 의사의 치료를 받고 있는 환자
6) 이 약은 황색 4호(타르트라진)을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 부작용

- 1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- 2) 이 약을 투여함으로써 드물게 동계(두근거림), 졸음, 현훈(아지러움), 권태감, 두통이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- 3) 이 약을 투여하는 동안 드물게 변비, 또는 입이 마르는 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- 4) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있습니다.
- 5) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있습니다.

4. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자(노인)
- 2) 심장 또는 신장(콩팥)에 장애가 있는 환자
- 3) 부종(부기)이 있는 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 본제(이 약의 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담하십시오.
- 2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기연용(계속 복용(사용))할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고인), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지하십시오.
- 3) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지하십시오.

6. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의하십시오.

- 1) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용(함께 복용(사용)) 시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여하십시오.

7. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킵니다.
- 2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의합니다.

8. 상호작용

- 1) 위장진통, 진경(경련완화)제와 병용(함께 사용(복용)) 투여하지 않습니다.

9. 소아·임부에 대한 투여

- 1) 이 약은 소아(15세 미만)에게는 투여하지 않습니다.
- 2) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유 중인 부인에게는 투여하지 않습니다.

10. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

[저장방법]

차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위]

10정

[취급상의 주의사항]

- ※ 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.
- ※ 이 첨부문서 개정일자(2022년 07월 04일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr/>)의 ‘의약품검색’에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 본 제품 사용으로 인한 부작용 피해구제 신청은 한국약품안전관리원(T.14-3330(상담) 또는 1644-6223(신고 및 상담))에서 할 수 있습니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ☎ 소비자 상담실 (02)561-4011

[제조자의뢰자] 에이프로젠제약(주) / 경기도 화성시 양감면 두머리길 16

[제 조 자] (주)마더스제약 / 전라북도 익산시 삼기면 산단오름길 38 마더스제약 제2공장

[판 매 자] (주)대웅생명과학