

항산화제를 함유한 고탐량 활성비타민

모아비 액티브 정

일반 의약품
품목기준코드: 201706380
분류번호: 319

음식으로 채워지지 않는 눈의 피로 신경통 관절통 근육통 허리통증 목 어깨결림 입술 입안염



활성비타민
벤포티아민
100mg 함유

활성비타민
4종을 포함한
비타민 B군 9종 함유

항산화 성분과
면역체계 강화에
도움되는 아연 함유

비타민 C, D, E
UDCA, CoQ10
감마오리자놀 함유

마그네슘
셀레늄
함유

【원료약품 및 그 분량】

벤포티아민(KP).....	100mg
(티아민염산염으로서 72.31mg)	
니코틴아미드(KP).....	100mg
판토텐산칼슘(KP).....	100mg
비오틴(USP).....	100μg
폴산(KP).....	100μg
리보플라빈부티레이트(KP).....	12mg
피리독살포스페이트수화물(KP).....	10mg
히드록스코발라민아세트산염(KP).....	10.45μg
(히드록스코발라민으로서 10μg)	
콜린타르타르산염(DAB).....	10mg
이노시톨(KP).....	30mg
제피아스코르브산(별규).....	52.1mg
(아스코르브산으로서 50mg)	
토코페롤아세테이트 2배산(KP).....	40mg
(비타민E로서 20 IU)	
농축콜레칼시페롤(분말형)(EP).....	10mg
(비타민D로서 1000 IU)	
셀레늄함유건조효모(KP).....	25mg
(셀레늄으로서 13.5μg)	
산화마그네슘(KP).....	30mg
(마그네슘으로서 18mg)	
산화아연(KP).....	20mg
(아연으로서 16mg)	
유비데카레논(KP).....	5mg
감마오리자놀(KP).....	10mg
우르소데옥시콜산(KP).....	10mg

【성상】 연한 주황색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】 1. 다음 경우의 비타민 D, E, B1, B2, B6, C의 보급
- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나
회복 후)의 체력저하시 - 발육기 - 노년기 2. 이 약에 함유된 비타민
등의 효능·효과는 다음과 같다. - 뼈, 이의 발육불량 - 구루병의
예방 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(오허리)통, 어깨
결림 등, 구각염(입꼬리 염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염
(혀염), 습진, 피부염 - 각기 - 눈의 피로 3. 아연의 보급

【용법·용량】 성인: 1회 1정, 1일 1회 복용한다.

【사용상의 주의사항】 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재
하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신
염증질환, 신장질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민
반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 신장결석 환자
5) 심한 증상의 신부전 환자 6) 이 약을 유당을 함유하고 있으므로,
갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증
(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-
galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는
투여하면 안 된다. 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지
말 것. 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
2) 레보도파 3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사,
치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 고옥
살산노증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ①

비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
5) 심장·순환기계기능 장애 환자 6) 신장장애 환자 7) 저단백혈증 환자
8) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자 9) 신장결석 병력이 있는 환자
10) 임부 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과
의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 설사,
위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 땀, 몸이 붓기, 식욕부진, 복부팽만감, 붉은
반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신 경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡
시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통 증, 저혈압,
폐부종 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점
많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함
한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가
비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 장기간
고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 5) 피리독신을 1일 500
mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상
(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수
있다. 6) 폴산이 부족한 환자(예: 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할
경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 7) 고용량 투여에 의해 소화성
궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance
impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증
(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을
일으킬 수 있다. 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨
혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 9) 항
알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수
있으므로 주의할 것. 10) 우발적으로 과량복용 한 경우 11) 개월 정도
복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용 시 주의
사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 각종 요검사에서 혈당
의 검출을 방해할 수 있다. 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사
치에 영향을 줄 수 있다. 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용
중, 복용전후에는 피할 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에
닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 뭍 수 있는 한 습기
가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것 3) 오용(잘못 사용)을
막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 / 제조
일로부터 36개월

【포장단위】 60정, 120정

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시
사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품
일 경우에는 구입처에서 교환해드립니다. ※자세한 의약품정보는 식품
의약품안전처 온라인 도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 검색을
참고하여 주세요. ※의약품을 사용하기 전에 반드시 첨부 문서를 주의
깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
※의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이 손에
닿지 않는 곳에 보관하십시오.

소비자상담실: 02-843-1500

【제조자】

한국코러스

충청북도 제천시 강제로 30

【판매자】

BORYUNG

보령제약

경기도 안산시 단원구 능안로 107

www.boryung.co.kr

개정연월일: 2017. 11. 01