

화상형 복합 관절 영양제 콘파워600[®]

고함량 콘드로이틴 600 mg + 활성 비타민B 복합제

일반의약품

KGMP작업제

분류번호: [316]

혼합비타민제

(비타민A, D 혼합제를 제외)



[원료약품 및 그 분량] 1정 중

유효성분:

콘드로이틴 황산염(트라이수염)(KPI)	600.0mg
루로살티아민(KPI)	60.0mg
리보플라빈부티레이트(KPI)	6.0mg
피리독신염산염(KPI)	20.0mg
니코틴산아미드(KPI)	40.0mg
판토텐산칼슘(KPI)	15.0mg
감마오리조놀(KPI)	5.0mg

참가제: D-인산, 메티오닌, 메티오닌, 메티오닌, 스테아르산, 오메가-3, 200 브라운(200F2 6500%), 크로스카멜로오스나트륨, 폴리알렌글리콜6000

[상징] 진한 갈색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음경우의 비타민 B₁, B₂, B₆의 보충

- 육체피로 - 임신 - 수유기

2. 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시

3. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절염(요통, 어깨결림 등)

- 각기

- 눈의 피로

[용법·용량] 만 8세 이상 어린이 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 식후 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

(1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

(2) 만 3개월 미만의 유아

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

(1) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사의 상의할 것.

(1) 만 1세 미만의 장녀

(2) 의사의 치료를 받고 있는 환자

(3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아 유아

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사의 상의할 것. 상시 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

구역, 구토, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감

(2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.

(3) 고음량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperursemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

(4) 우발적으로 과량복용 한 경우

(5) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 장해된 용법·용량을 잘 지킬 것.

(2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.

(3) 오용·한용으로 변하게 하여 임상감사자에 영향을 줄 수 있다.

6. 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.

(3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[유효기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 45정/병, 90정/45정/병(2)

[소비자상담실] 080-024-0030

[제조원] **한한행제약** 전라북도 완주군 봉동읍 원주신단6로 301 1~3층, 5층, 봉동로 705

[판매처] **광동제약(주)** 경기도 평택시 산단로 114

본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 구입 시 사용기간에 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

본 제품은 공상(과)와 안전을 최우선으로 고려하여, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.

의약품 사용기간 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어 하, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

자세한 사항은 의약품안전관리원(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

부작용: 피부구제 신장: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 작성일: 2019년 10월 25일