

비노생식기관용제

네포신질연질캡슐

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

유효성분 : 네오마이신황산염(KP).....50.2mg

(역가)네오마이신으로서 35mg, 35,000IU

니스타틴(USP).....100,000IU

폴리믹신B황산염(KP).....35,000IU

첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸.....0.12mg

파라옥시벤조산프로필.....0.03mg

첨가제(타르색소) : 황색203호

첨가제(동물유래) : 황색(벌의 발집), 젤라틴(소의 가죽)

기타 첨가제 : 농글리세린, 디메티론, 산화티탄, 아자경화유, 중쇄트리글리세리드

【성상】 미황색의 내용액을 함유한 유백색 타원형 연질캡슐형 질자제

【효능·효과】 비특이성 세균성질염의 국소 치료

【용법·용량】

성인 : 1일 1캡슐을 6일간 저녁에 침대에 깊숙이 삽입한다.

중증 또는 만성 감염의 경우 1일 1캡슐을 6 ~ 12일간 저녁에 투여한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약 성분에 과민반응 환자
- 2) 곤돌, 질내 피임용격막을 사용하는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

살정제를 사용하는 환자

3. 이상반응

- 1) 접촉성 알레르기성 습진이 나타날 수 있으며 특히 장기간 사용시 자주 나타난다. 때때로 점막자극과 드물게 과민반응이 나타날 경우에는 사용을 중지한다.
- 2) 대두유로 인한 과민반응이 일어날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 신장 및 청각 등에 대해 전신적 독성을 일으킬 수 있으므로 단기간 사용하라는 것이 바람직하다.
- 2) 신부전 환자 또는 2차 전신 독성이 나타난 환자에는 투여하지 않는 것이 바람직하며 치료상의 유효성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 사용한다.

3) 항생물질 또는 그 유사 제제를 사용시 과민반응이 생기는 경우에는 이 약 사용을 특히 주의한다.

4) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현 등을 방지하기 위하여 원칙적으로 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소기간만 투여한다.

5. 상호작용

- 1) 이 약은 곤돌, 질내 피임용격막과 같은 라텍스 또는 고무제품을 약화시킬 수 있으므로 주의한다.
- 2) 이 약은 살정제의 피임력을 약화시킬 수 있으므로 주의한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 동물 실험에서 이 약의 최기형성에 대한 증거는 확인되지 않았다. 임상적으로 특정한 기형 혹은 태아독성에 대한 데이터는 확인되지 않았지만, 임부 또는 임신할 가능성이 있는 여성에 대한 실험은 충분치 않으므로 유약성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2) 수유부에서 약물 이행에 대한 데이터가 없으므로 수유부는 이 약을 사용하지 않는다.

7. 적응상의 주의

- 1) 이 약은 질에만 사용하고 내복용으로는 사용하지 않는다.
- 2) 생리기간 중에도 치료를 중단하지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 25℃ 이하 보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【포장단위】 12캡슐(6캡슐/PTP X 2)

- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 반드시 의사·약사와 상담 후 사용하십시오.
- ※ 본 제품에 관련된 문의는 소비자상담전화 : 02)2182-0400으로 연락하시기 바랍니다.
- ※ 만약 구입시 사용(유효)기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품인 경우 복용(사용)하지 마시고 구입처에서 교환하시기 바랍니다.
- ※ 본 첨부문서의 변경된 최신내용은 당사 소비자상담실 또는 식품의약품안전처 온라인약사도서상(http://drug.mfds.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

의약품은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

170821-I-R(0)

설명서 최종 개정년월일 2017년 08월 21일



제조사/의자 :



주|비씨월드제약

서울시 강남구 개포로22길 78 경빌딩
공정:경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23
소비자상담실 : 02)2182-0400
www.bcwp.co.kr

제조사 :



콜마파마(주)

충청북도 제천시 바이오밸리2로 93