

130*170

일반 의약품

분류번호 219

말초동맥순환장애
징코에프정 80mg
(은행엽엑스)

HT-20170720

GINKGO-F Tab.

【원료약품 및 분량】 1정 중

주성분 : 은행엽엑스(생규) 80mg
첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
첨가제(타르색소) : 황색4호알루미늄레이크, 청색1호알루미늄레이크
기타첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 카르복시메틸셀룰로오스 칼슘, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스

【성 상】 녹색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

- 주효능 효과
 - 말초동맥순환장애(간헐성파행증)의 치료
 - 어지러움, 혈관성 및 퇴행성이명
 - 이명, 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움등의 치매성증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

【용법·용량】

- 성인
 - 말초동맥순환장애, 어지러움, 이명 : 은행엽엑스로서 1회 40mg 1일 3회 또는 1회 80mg 1일 2회 경구투여한다.
 - 기질성 뇌기능장애 : 은행엽엑스로서 1회 40~80mg 1일 3회 또는 1회 120mg 1일 2회 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약에 과민증 환자
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것
- 부작용
 - 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.

2) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

- 어지러움
- 가려움증

- 일반적 주의
이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.
- 임부에 대한 투여
동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신 중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.
- 소아에 대한 투여
소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.
- 저장상의 주의사항
직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

【포장단위】 30정/병, 600정/병

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(☎031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.

※ 이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 한국휴텍스제약(주) 홈페이지(www.hutechs.co.kr)에서 확인해 주십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



한국휴텍스제약(주)

우수의약품제조관리기준

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99

KGMP 적격지정업체

제조의뢰자 : 한국휴텍스제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99

제 조 자 : (주)씨엘지제약 경기도 시흥시 공단1대로27번길 27

설명서 작성일 : 170720