



고혈압 활성비타민과 비타민B12를 함유한 근육경련 및 혈액순환 개선제

마그비액티브

MG42465/01A

일반의약품
화이트박스




본문번호 319 (7타의 베타인제)

【원산지】 중국

- 유효성분
 - 산화마그네슘 (KP) 300mg (마그네슘으로서 181mg)
 - 트코페롤아세이트 2배산 (베타인제) (KP) 200mg (베타인제로서 100U)
 - 벤조티아민 (베타인제) (KP) 50mg (티아민염산염으로서 36.2mg)
 - 리보플라빈 (베타인제) (KP) 50mg
 - 피리독살린산염 (베타인제) (KP) 50mg
 - 시아노코발라민100배산 (베타인제) (별규) 50mg (시아노코발라민으로서 500μg)
- 첨가제: 미결정셀룰로오스, 크로스포비돈, 이산화규소, 스테아르산마그네슘, 오파드라이본황색(AMBI88A-540008), 카라나우바

【성상】 흰색의 원형한 유효캡슐



【주요효과】

- 다음경우의 비타민 E, B1, B2, B6의 보급
 - 육체피로, 임신수유기, 병중 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 효능 효과는 다음과 같습니다.
 - 베타인제(트코페롤아세이트) : 말초혈행장애 및 경년기시 다음 증상의 완화 : 어깨-목결림, 수족저막-수족냉증(손발이 차가움)
 - 베타인제(벤조티아민) : 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등) ● 각기 ● 눈의피로
 - 베타인제(리보플라빈), 베타인제(피리독살린산염) : 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

● 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

【용법·용량】 성인 12세 이상일 경우 1일 2회, 1회 1정 복용

※ 충분한 양의 물과 함께 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 12개월 미만의 어린이
 - 3) 심한 증상의 신부전 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 일부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 3) 심장 순환기계기능 장애 환자
 - 4) 신장(콩팥)장애 환자
 - 5) 저단백혈증 환자
 - 6) 일부
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 붉은 변결, 설사, 부종수축(심장 박동 정지), 중추신경계 기능저하
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리(예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
 - 3) 예스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 베타인제를 복용할 경우 혈전혈관 막힘증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 4) 피리독살린 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증 증상(neuropathy; 말초신경계의 기능장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 5) 물산이 부족한 환자(예 베타인 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 유헤르만-리케 증후(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 7) 할랄(도스레제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 8) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 경해진 용법 용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 요통 통색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있습니다.
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오염(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【사용기법】 외부포장에 표기

【포장단위】 50정/병, 120정(60정/병 X 2)

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 장제를 개년 후에는 두장을 꼭 닫아주십시오. (본 제품은 습기가 많은 곳에서는 보관 중 인습(흡습)되어 변색될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.)

※ 이 제품은 정부의 "소비자분쟁해결기준"에 의거 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

※ 이 첨부문서의 개정연월일 이후 변경내용은 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 이 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

첨부문서 작성연월일 2017. 8. 22



제조판매자

유한양행

본사: 서울특별시 중구구로동로 74
공장: 충청남도 아산시 오성동 999-1

홈페이지: www.yuhan.co.kr
소비자상담실: 080-024-1188 (순선자 요금부담)

MG42465/01B