

12시간 지속, 알레르기비염 치료제!

코슈엘정

(레보세티리진염산염, 슈도에페드린염산염)
COSUE-L Tab.

■ 원료약품 및 그 분량 : 1정 중

- 유효성분 : 레보세티리진염산염(별규) 2.5mg 슈도에페드린염산염(USP) 120.0mg
- 첨가제(동물유래성분): 스테아르산·그나소(소, 지방), 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 부틸레이티드히드록시톨루엔, 오파드라이한색(XB2876), 폴리비닐리크로다옥사이드, 크로스보디온, 포비돈, 폴리메틸렌옥사이드, 히드록시프로필셀룰로오스
- 성상 : 흰색의 정방형 필름코팅정
- 효능·효과

■ 용법·용량

1. 만 12세 이상의 소아와 성인
식사와 관계없이 1회 1정씩 1일 2회(아침, 저녁) 복용한다.
이 약은 씹거나 부수어서 복용하지 말고 그대로 삼켜서 복용한다.
2. 이 약은 2~3주 이상 복용하지 않도록 한다.
3. 신기능 저하 환자 및 간기능 저하 환자의 경우 감량하여 1회 1정씩 1일 1회 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
1) 이 약 또는 에페드린 또는 파페라진류에 과민증이 있는 환자
2) 심각한 고혈압 또는 심각한 관상동맥질환 환자
3) 모노아민산화효소 저해제를 투여 중이거나 2주 이내에 투여한 환자
4) 중증의 신부전 환자, 혈액투석을 받고 있는 환자
5) 조절되지 않는 갑상선기능항진증, 중증의 부정맥, 크론치화세포증, 안내압이 증가되어 있거나 녹내장, 소변고임(노저류)이 있는 환자
6) 뇌졸중의 병력이 있거나 출혈성 뇌졸중을 일으킬 수 있는 위험이 높은 환자
7) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
8) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
1) 당뇨병, 갑상선 기능 항진증, 고혈압, 빈박, 부정맥, 허혈성 심질환, 신장 및 간기능 부전 환자, 전립선비대증 환자
2) 교감신경장 약물(비총혈 제가약, 식욕억제제, amphetamine등의 정신흥분제), 삼환계 항우울약, 디기탈리스 제제를 투여 받는 환자
3) 기타 다른 중추신경 흥분약을 투여 받는 환자
4) 알코올 또는 기타 중추신경억제제를 투여받는 환자
5) 고령자
6) 뇨저류의 선행요인(예, 척수장애, 전립선 비대 등)이 있는 환자
7) 간질 환자 및 발작 위험성이 있는 환자
8) 슈도에페드린의 혈관수축작용이 있으므로 염증성 장질환과 같이 과다응고의 위험이 있는 환자에 투여할 경우 주의한다.
9) 슈도에페드린 및 NSAID는 모두 혈압을 상승시킬 수 있으므로, NSAID를 동시에 투여받는 고혈압 환자는 주의가 요구된다.
3. 이상반응
1) 입마름, 두통, 불면, 졸음, 무기력, 빠른맥, 신경과민증, 어지러움증, 현기증, 구역
2) 공포, 흥분, 긴장, 불안, 떨림, 호흡곤란, 환각, 경련, 중추신경억제, 부정맥, 저혈압이 있는 심혈관계 허탈, 구토, 허혈성 대장염, 간기능장애(아미노전이효소, 알칼린포스파타제, 감마-GT 및 빌리루빈 상승), 미각이상, 뇌혈관 사고(뇌졸중), 초조, 정신증적 장애, 배뇨장애, 창백함, 고혈압, 무력증
3) 파부반응(피부 건조, 발진, 땀 증가, 두드러기), 고정약물발진, 혈관부종 등의 과민반응
4) 안과질환 : 조절장애, 시야흐림, 산통, 눈의 통증, 시각장애, 눈부심

이 약의 주성분인 레보세티리진과 및 슈도에페드린과 관련하여 각각 수집된 이상반응은 다음과 같다.

- 6) 이 약을 할로겐화 마취제와 동시에 사용하는 경우 심실성 부정맥을 일으키거나 더 악화시킬 수 있으므로, 동시에 사용하지 않는다.
- 7) 항히스타민제는 알레르기항원피내반응을 억제하므로, 알레르기항원피내반응검사를 실시하기 3~5일 전에는 이 약을 복용하지 않는 것이 바람직하다.
- 8) 슈도에페드린은 재산제 및 프로토포브 억제제에 의해 흡수속도가 증가되는 반면, 카일린에 의해 흡수속도가 감소된다.
- 9) 다른 항히스타민제와 마찬가지로 과량의 알코올과 병용투여 하지 않는다.
- 10) 레보세티리진과의 상호작용을 분석한 연구는 없지만 이성체인 세티리진과의 상호작용을 분석한 연구가 있는데 아티피린, 슈도에페드린, 에리스로마이신, 아지스스로마이신, 케토코나졸, 시메티딘과는 상호작용이 없었다. 테오필린(1일 400mg)과의 다용량 시험에서는 세티리진 클리어런스가 경미한(16%) 감소를 보였다.
- 11) 리토나비어는 세티리진의 반감기 증가(53%) 및 클리어런스 감소(29%)와 함께 혈장 AUC를 42%(7지) 증가시켰다. 리토나비어의 약물동태는 세티리진과의 병용투여로 인해 약간 변화(11% 감소)되었다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여
임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
이 약물은 모유로 분비되므로 이 약을 복용하는 동안 수유하거나 수유하는 동안 이 약을 복용해서는 안 된다.
7. 소아에 대한 투여
12세 미만의 소아환자에 대한 안전성·유효성이 확립되어 있지 않으므로, 이 약의 투여가 권장되지 않는다.

8. 고령자에 대한 투여
이 약은 주로 신장을 통해 배설되므로 일반적으로 신기능이 저하되어 있는 고령자에서는 혈중농도 과다 상태가 지속될 수 있으므로 주의한다. 고령자는 특히 이 약에 의한 부작용이 나타나기 쉽고 과량투여 시 환각, 경련, 중추신경계 억제 및 사망을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
9. 과량투여시의 처리
1) 성인은 과량 투여 시 졸림이 나타나고 소아의 경우 초조와 안절부절이 선행된 후 졸림이 나타난다.
2) 이 약에 대한 특별한 해독제가 없으므로 과량투여 시 대증요법 또는 지지요법을 실시한다. 단기간 과량 투여 시 위 세척을 실시한다.
3) 이 약은 혈액투석에 의해 효과적으로 제거되지 않는다.
4) 세티리진의 과량투여 후에 관찰된 증상들은 주로 중추신경계 영향 또는 항콜린성 효과로 여겨지는 영향과 관련되어 있다. 고용량 투여 시, 교감신경유사작용 약물은 망상 및 환각을 동반한 독성 정신증을 일으킬 수 있다. 또한 일부 환자들은 치명적일 수 있는 심장 부정맥, 순환하탈, 경련, 혼수, 및 호흡기능상실을 일으킬 수 있다.

- 과량 투여 시 설사, 어지러움증, 피로, 두통, 권태감, 동공확대, 소변고임, 빈맥(빠른맥), 부정맥, 고혈압, 중추신경억제효과(진정, 무호흡, 무의식, 청색증, 심혈관계 허탈증) 또는 반구과(불면, 환각, 떨림, 경련)가 나타날 수 있다. 즉시 병원에 응급하고 대증요법을 취하도록 한다. 자발적으로 구토가 일어나지 않는다면 인위적으로 유도해야 한다. 위세척을 실시하고 고혈압은 α-억제약으로 조절하고 빈맥은 β-억제약으로 조절한다. 교감신경유사작용 아민류를 사용해서는 안 된다. 경련이 나타나면 디아제팜을 정맥투여(소아의 경우, 디아제팜 적정내 투여)한다. 알려진 해독제는 없고, 세티리진 및 슈도에페드린은 혈액투석을 통해 거의 제거되지 않는다.
10. 보관 및 취급상의 주의사항
기밀용기, 실온(1~30℃)에 보관하고 다음 사항을 주의한다.
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약약품 용법에 의한 사고 발생이나 약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.
11. 약품동등성시험 정보
1) 슈도에페드린
가. 시험약 레보세티리진염산염/슈도에페드린염산염정2.5/120밀리그램(썬비씨월드제약)주과 대조약 코색알정(한미약품)을 22 교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 공복시 단회 경구 투여하여 26명의 혈중 슈도에페드린을 측정하고, 비교평가항목치(AUC, Cmax)를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90% 신뢰구간이 log0.8에서 log1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

10. 보관 및 취급상의 주의사항

기밀용기, 실온(1~30℃)에 보관하고 다음 사항을 주의한다.

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 용법에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 덮어 보관한다.

11. 의약품동등성시험 정보 ^{제4}

1) 슈도에페드린

가. 시험약 레보세티리진염산염/슈도에페드린염산염정2.5/120밀리그램 (썬비씨월드제약)과 대조약 코색알정 (한미약품)을 2X 교차시험으로 각 1정씩 원장시험시간에 공복/식후 시 단회 경구 투여하여 26/28일의 혈중 슈도에페드린을 측정하고, 비교평가항목치(AUC, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 치의 90% 신뢰구간[1] log_{0.8}에서 log_{1.25} 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

(AUC_t, C_{max}, t_{1/2} : 평균값±표준편차, T_{max} : 중앙값(범위), n=26)

AUC_t : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 까지의 혈중농도-시간곡선하면적
C_{max} : 최고혈중농도
T_{max} : 최고혈중농도 도달시간
t_{1/2} : 말단 소실 반감기

【분류번호 : 141】
【전문 의약품】

* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간(실험후)

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-24hr} (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	코색알정 (한미약품(주))	352.6±74.4	340.0±60.0	5.00 (2.00~7.00)	5.08±0.90
시험약	레보세티리진염산염/수도 에페드린염산염정2.5/120 밀리그램(썬비씨월드제약)	380.3±89.4	364.9±70.8	4.00 (2.00~7.00)	5.11±0.74
90% 신뢰구간* (기준: log0.8~log1.25)		log1.0236~ 1.1277	log1.0304~ 1.1122	-	-

(AUC_t, C_{max}, t_{1/2} : 평균값±표준편차, T_{max} : 중앙값(범위), n=28)

AUC_t : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 까지의 혈중농도-시간곡선하면적
C_{max} : 최고혈중농도
T_{max} : 최고혈중농도 도달시간
t_{1/2} : 말단 소실 반감기
* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간

- 2) 레보세티리진
가. 시험약 레보세티리진염산염/슈도에페드린염산염정2.5/120밀리그램(썬비씨월드제약)과 대조약 코색알정(한미약품)을 22 교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 공복시 단회 경구 투여하여 26명의 혈중 레보세티리진을 측정하고, 비교평가항목치(AUC, Cmax)를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90% 신뢰구간이 log0.8에서 log1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

(공복)

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-24hr} (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	코색알정 (한미약품)	827.8±170.7	101.2±18.5	0.75 (0.33~1.50)	9.08±1.65
시험약	레보세티리진염산염/슈도 에페드린염산염정2.5/120 밀리그램(썬비씨월드제약)	866.0±159.1	91.7±16.4	0.75 (0.50~3.00)	9.67±1.65
90% 신뢰구간* (기준: log0.8~log1.25)		log1.0186~ 1.0882	log0.8489~ 0.9731	-	-

(AUC: C_{max}, t_{1/2}: 평균값±표준편차, T_{max}: 중앙값(범위), n=26)

(AUC_t, C_{max}, t_{1/2} : 평균값±표준편차, T_{max} : 중앙값(범위), n=26)

AUC_t : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 까지의 혈중농도-시간곡선하면적
C_{max} : 최고혈중농도
T_{max} : 최고혈중농도 도달시간
t_{1/2} : 말단 소실 반감기
* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간

주 1, 이 약은(썬비씨월드제약 레보세티리진염산염/슈도에페드린염산염정2.5/120밀리그램과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전 공정을(썬비씨월드제약에 위탁 제조)하였다.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 30정, 300정

■ 사용기한 : 외부 포장재에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

■ 소비자상담 : 080-203-6000(수신자 요금부담)

*본 약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

*첨부문서 작성일(2017년 11월 27일) 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실(TEL: 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

*약품용 용어 설명 및 기타 자세한 약품 정보는 온라인 의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) '약품찾기' 란을 참조하세요.

제조/외자 : 판매원 : 코오롱제약(주) 대전광역시 대덕구 문정서로 18번길 45
제조자 : (주)비씨월드제약 경기도 여주시 기념읍 여주남로 872-23

최초 작성연월일 : 20171127

코오롱제약