

육체피로
체력저하

피로회복!

비타빅 연필 임용

일반 의약품
분류번호:319

1캡슐

[원료약품 및 분량] 1캡슐 중 레티놀팔미테이트유(KP) 5mg(비타민A로서 5000 I.U.), 콜레칼시페롤농축물(유상형)(EP) 0.4mg(비타민D로서 400 I.U.), 아스코르브산(KP) 75mg, 티아민염산염(KP) 2mg, 리보플라빈(KP) 3mg, 니코틴산아미드(KP) 20mg / 첨가제(보존제): 파라옥시벤조산메틸(KP) 0.084mg, 파라옥시벤조산프로필(KP) 0.021mg / 첨가제(타르색소): 청색1호, 황색4호, 황색5호 / 첨가제(동물유래성분): 젤라틴(소, 가축) [성 상] 황갈색의 내용물이 든 암녹색의 장방형 연질캡슐체 [효능·효과] 1. 다음경우의 비타민 A, D, B1, B2, C의 보급 1) 육체피로 2) 임신·수유기 3) 병중·병후(병을 앓는 동안이나 병 후)의 체력저하시 4) 발육기 5) 노년기 2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다. 1) 노년기 2) 아맹증(밤에 잘 못보는

증상) 3) 구루병의 예방

[용법·용량] 성인 1회 1캡슐, 1일 1회 복용

[제조·의뢰자] (주)테라젠이텍스 / 경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58

[제조자] (주)레고켐텍/경기도 안성시 원곡면 원당로 354

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 변질·변색·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
※ 작성일 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drugmktg.co.kr>)에서 확인할 수 있습니다. ※ 작성일: 2017. 09. 01(P050169-170901-00)
※ 소비자상담전화: 02-3463-7111



010880698503769

제조번호: | 사용기한:

[사용상의 주의사항]

1. 경고: 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것(비타민 A결핍증 환자는 제외)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcomatosis: 원인을 알 수 없는 전신 염종결핵), 신장질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 3개월 미만의 젖먹이 4) 신장결석 환자 5) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 6) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자 3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에서 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다. ② 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. 4) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자 5) 신장결석 병력이 있는 환자 6) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 황장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유래를 신중히 투여해야 하는 환자 7) 이 약은 황색5호(타르트린)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 8) 이 약은 황색5호(산셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통풍성 관절부종, 설사, 묽은 변 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 3) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. 4) 장기간 고용량의 비타민 A(비타민A로부터 전환된 것을 제외함) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(골다공증) 위험을 높일 수 있다. 5) 우발적으로 과량복용 한 경우 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다. 3) 각종 요강치사에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다. 5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼합되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것 [저장방법] 차광밀폐용기, 실온(15~30℃)보관

