

알마펜정

(알마게이트)

ALMAFEN^{Tab.}

1000
TABLET

[원료의약품 및 그 분량] 1정 중 유효성분 : 알마게이트(KP)-----500mg

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)

기타첨가제 : 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성이산화규소

[성 상] 흰색의 타원형 정제 **[포장단위]** 500정/병, 1000정/병

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[효능효과] 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다, 속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림

[용법용량] 성인 및 12세 이상의 소아 : 알마게이트로서 1회 1g을 1일 3회, 식후 30분~1시간에 씹어서 경구 복용한다. 필요시 취침 전에 1회 더 복용할 수 있다.


[제 조 자] 오스템파마주식회사 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 265

[사용상의 주의사항] 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말것. 1)이 약 또는 이 약의 구성 성분에 대해서 과민반응이 있는 환자 2) 알츠하이머병 환자 3)치질환자 4) 체액 저류(고임,쌍임)(부기) 환자 5)임신 중독증 환자 6)설사 환자 7)진단되지 않은 소화 기관 출혈 환자 8) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말것 테트라사이클린계 항생물질(함께 복용시 흡수를 억제할 수 있음) 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 : 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH 상승에 의해 함께 복용하는 약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 복용한다. ①비스테로이드소염진통제 (NSAID), 궤양 치료제, 디기탈리스 제제,

클로르프로마진, 란소프라졸, 프레드니솔론, 페니실린, 퀴놀론, 철(Fe)염 제제 : 흡수를 감소시킬 수 있으므로 2~3시간 간격을 두고 복용한다. ② 살리실산염 : 신장의 배설을 증가시킨다. 2) 신장애(신장장애) 환자 : 마그네슘 또는 알루미늄이온이 오랜 기간 동안에 걸쳐 콩팥에 축적될 수 있다. 심한 신장애(신장장애) 환자에게는 권고되지 않는다. 3) 신체 허약자, 인 함량이 낮은 식이 요법 실시자, 소화 흡수 장애가 있는 사람 : 이 약의 알루미늄염이 인 흡수를 감소시키므로 장기간 복용할 경우, 혈중 인산염함량 감소 및 뼈의 무기질 침착장애를 야기할 수 있음. 4) 고령자 5) 혈액구토 또는 흑색 대변 등과 같은 소화기관 출혈 증상이 있는 환자 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 소화기계 : 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사 2) 2주정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것. 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. *구입시 사용기한이 지났거나, 변질, 변패, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다. * 자세한 품목 허가 또는 신고사항은 오스템파마 홈페이지(www.osstempharma.com) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (nedrug.mfds.go.kr)을 통해 확인하실 수 있습니다. * 이 제품 사용 후 부작용(이상반응) 이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644 -6223) 에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다. * 소비자 상담전화 070-4394-1477
최종개정연월일: 2023.08.11



50x20mm



(01)08800535000924