

5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4

전문의약품	KGMP 적격업체 제품
 미르젠탁[®]	 7.5mg
 미르타자핀	 15mg
 30mg	 30mg

- **원료약품의 분량** :1정 중
- 미르젠탁정 7.5mg :
 - 유효성분 : 미르타자핀(USP)..... 7.50mg
 - 첨가제(타르색소) : 청색 2호(인디고카르민) 말라미늄염이크
 - 첨가제(동물유래) : 유당수화물(소, 우유)
 - 기타 첨가제 : 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 오파드라이파렌색(04F605002), 옥수수전분, 히드록시프로필셀룰로오스
 - 미르젠탁정 15mg :
 - 유효성분 : 미르타자핀(USP)..... 15.00mg
 - 첨가제(동물유래) : 유당수화물(소, 우유)
 - 기타 첨가제 : 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 오파드라이노란색(04F620003), 옥수수전분, 히드록시프로필셀룰로오스
 - 미르젠탁정 30mg :
 - 유효성분 : 미르타자핀(USP)..... 30.00mg
 - 첨가제(동물유래) : 유당수화물(소, 우유)
 - 기타 첨가제 : 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 오파드라이주황색(04F23084), 옥수수전분, 히드록시프로필셀룰로오스

- **성상**
- 미르젠탁정 7.5mg : 청색의 다원형 필름코팅정제
 - 미르젠탁정 15mg : 마황색의 다원형 필름코팅정제
 - 미르젠탁정 30mg : 적갈색의 다원형 필름코팅정제

- **내용 · 용량** : 주요유효물

이 약의 치료 용량은 환자의 임상 상태에 따라 조절되어야 하며, 가능한 최소 유효량을 투여해야 합니다.

- 성인
미르타자핀으로서 초기용량은 1일 15mg이며 적절한 임상효과가 나타나 때까지 용량을 증가시킬 필요가 있습니다. 1일 유효용량은 보통 이 약으로서 15~45mg입니다.
- 특이성단에서의 투여
성인환자
중증도에서 중증의 신장애 환자(크레아티닌청소를 <40mL/분)에서 이 약의 청소율이 감소할 수 있으므로 처방 시 주의해야 합니다.
- 간장애 환자
간장애 환자에게서 이 약의 청소율이 감소할 수 있으므로 처방 시 주의합니다. 특히, 중증의 간장애 환자에게는 연구되지 않았으므로 처방 시 주의해야 합니다.
- 고령자
추진용량은 성인과 동일합니다. 용량을 증가시킬 때 에는 만족스럽고 안전한 효과를 얻기 위해 세심한 관찰이 필요합니다.
- 소아 및 18세미만의 청소년
두 개의 단기 임상시험을 통해 그 유효성이 입증되지 않았고, 안전성의 우려가 있으므로 소아 및 18세 미만의 청소년에 이 약을 사용하지 않습니다.(사용상의 주의사항 중 '4. 이상반응' 및 '8. 소아 및 청소년에 대한 투여'항 참조).
- 정신질환 치료를 하기 위한 MAO 저해제 전환 관련
정신질환 치료를 위한 MAO 저해제 투약을 중단하고 동 제제 치료를 시작할 경우 적어도 14일 이상 간격을 두어야 합니다. 반대로, 정상상태로 되돌아 가기 위해 MAO 저해제 투약을 시작하려면 동 제제 투약 중단 후 적어도 14일 간격해야 합니다.

- 리네졸리드 또는 메틸렌블루제제와 같은 다른 MAO 저해제
리네졸리드 또는 메틸렌블루제제 투여받은 환자는 새로운 중추군 위험성 증가 때문에 동 제제 투약을 시작해서는 안 됩니다. 임명을 포함한, 다른 중추핵시술을, 세로토닌 정신질환성 상태 치료를 필요로 하는 환자의 경우는 투약을 고려해야 합니다.
이외 동 제제를 투여받은 환자에게 리네졸리드 또는 정맥주사용 메틸렌블루제제를 긴급히 투여할 필요가 있을 수 있으며, 리네졸리드나 정맥주사용 메틸렌블루제제에 대한 대체요법이 없고 특정환자에게 리네졸리드 또는 정맥주사용 메틸렌블루제제 치료의 유효성이 세로토닌 중추군 위험성을 상회한다고 판단되는 경우 동 제제를 즉시 중단하고 리네졸리드 또는 정맥주사용 메틸렌블루제제를 투약할 수 있습니다. 환자는 리네졸리드 또는 정맥주사용 메틸렌블루제제를 투약한 지 2주 또는 마지막 투여 후 24시간 중 먼저 어느 시점에서 세로토닌 중추군 증상을 모니터링해야 합니다. 리네졸리드 또는 정맥주사용 메틸렌블루제제 마지막 투여로부터 24시간 후 동 제제 치료를 다시 시작할 수 있습니다.
비정맥주용(경구정제 또는 국소주사)도 메틸렌블루제제 투여 또는 동 제제를 1mg/kg 이하 정맥주사한 경우에 대한 위험성은 명확하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 임상용에 대한 세로토닌 중추군에 대한 세로토닌 증후군의 증상을 경험할 수 있습니다.
- 이 약의 반감기는 20~40시간으로 1일 1회 복용으로 충분하며 가능한저녁 취침 전 일정 시간에 복용합니다. 약한 이 약은 1일 복용량을 아침과 저녁에 각 1회씩 동일한 투여량으로 나누어 복용할 수 있습니다.
이 약의 투여용량에 대한 치료과관용성을 충분한 시간을 갖고 평가하여야 하며 1~2주 미만 간격으로 용량을 변화시키지 않도록 해야 합니다. 적절한 용량으로 치료하면 2~4주 이내에 임상효과가 나타나며 치료효과가 불충분 하면 최대용량까지 용량을 증가시킬 수 있습니다. 2~4주 더 치료를 계속하여도 효과가 없다면 치료를 중단하도록 합니다.
- 치료는 환자의 증상이 완전히 없어질 때까지 최소 4~6개월 동안 계속되어야 합니다. 이후 치료는 금단 증상이 없도록 점진적으로 중단할 것이 권장됩니다.
- 이 약은 경부 근육하여 물과 함께 씹지 말고 삼키도록 합니다.

- **사용상의 주의사항**
- 경고**
 - 1) 자살성향 및 항우울제
주요유효물이나 다른 정신과적 질환을 가진 소아, 청소년 및 젊은 성인(18~24세)에 대한 단기간의 연구에서 항우울제에 의하여 비해 자살 증등과 행동(자살성향)의 위험도를 증가시킨다는 보고가 있습니다. 소아, 청소년 및 젊은 성인에게 이 약이나 다른 항우울제를 투여를 고려 중인 의사는 임상적인 유약성이 위험성보다 높은 지 항상 신중하게 고려하여야 합니다. 단기간의 연구에서 25대 이상의 성인에게는 위약과 비교하였을 때 항우울제가 자살성향의 위험도를 증가시키지 않았고, 65세 이상의 성인에서는 위약에 비해 항우울제에서 이러한 위험이 감소하였습니다.
우울증 및 다른 정신과적 질환 자체가 자살 위험 증가의 관련이 있습니다. 항우울제로 치료를 시작할 모든 연령의 환자는 적절한 모니터링과 함께 치환의 약학, 자살 성향 또는 자계실, 공격성, 분노 등 다른 비정상적인 행동의 변화가 있는지 주의 깊게 관찰되어야 합니다. 환자의 가족이나 보호자 또한 환자를 주의 깊게 관찰하고 필요한 경우 의사와 연락하도록 지도합니다. 이 약은 소아 및 청소년에서에서의 사용은 승인되지 않았습니다.
 - 2) 무의혈색소증
이 약의 투여 중 과립구감소 혹은 무과립구증으로 나타나는 골수기능억제가 보고되었습니다. 이것은 대부분 투여 4~6주 후에 나타나고 일반적으로 투여 종료 후 회복되었습니다. 그러나 무과립구증은 매우 드물게 치명적일 수 있습니다. 이 약의 임상시험에서 가역적 무과립구증이 드물게 보고되었습니다. 이 약의 시판 후 조사 기간 동안 무과립구증이 매우 드물게 보고되었습니다. 대부분 가역적이었으나 몇몇 경우는 치명적이었습니다. 치명적인 사례와 관련된 대부분의 환자는 65세 이상이었습니다. 만약 환자가 백혈구감소와 함께 목이 아프거나 열, 위염, 감염증상등이 나타나면 이 약의 투약을 중단하고 혈구수를 측정해야 합니다.
 - 3) 동시적인 전진소요법에 관한 경청은 불충분합니다.
 - 4) 항암 발생 시 투여를 중단해야 합니다.
 - 다른 환자에게는 투여하지 마십시오**
 - 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응이 있는 환자
 - 2) MAO 저해제를 투여하고 있는 환자
: 정신질환 치료를 위해 이 약과 MAO 저해제를 병용 투여하거나 이 약 투여 중단 후 14일 이내에 MAO 저해제를 투여하는 것은 세로토닌 중추군 위험성을 증가시키며 때때로 금기입니다. 정신질환 치료를 위해 MAO 저해제 투여 중단 후 14일 이내에 이 약을 투여하는 것 또한 금기입니다.(용법 · 용량항 및 5. 일반적 주의항 참조).
 - 리네졸리드 또는 정맥주사용 메틸렌블루제제와 같은 MAO 저해제를 투여받은 환자에게 이 약 투약을 시작하는 것은 또한 세로토닌 중추군 위험성 증가 때문에 금기입니다.(용법 · 용량항 및 5. 일반적 주의항 참조).
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 다른 원인 문제에서 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

- 다음 환자에게는 신중히 투여하십시오**
 - 1) 간장애 환자 지 신장애 환자
 - 2) 간질 및 기질성뇌수막 환자
 - 3) 당뇨병 환자
 - 4) 자극 전도장애, 협심증 및 심근경색증 등의 심질환 환자
 - 5) 저혈압 환자
- 4.이상반응**
 - 1)투여중단을 유발한 이상반응
6주간의 임상시험에서 이 약을 투여한 453명 중 16%가 이상반응으로 인해 투약을 중단하였으며 위약투여군은 361명 중 7%였습니다. 투여중단을 유발하였고 약물 투여기간에 이르는(즉 위약 투여군에 비해 적어도 2배 의 탈락율을 보인 이상반응) 이상반응은 우울증(0.4% 대 2.2%), 구역(1.5% 대 3.2%),이상반응) 등의 반응이 있었습니다.
 - 2)가장 많이 관찰된 이상반응
임상시험에서 이 약 투여에 의한 이상반응은 가장 많이 관찰되거나(6% 이상) 위약투여군과 동일한 빈도로 관찰되지 않은(여러도 위약투여군의 2배) 이상반응은 졸음(64% 대 18%), 식욕증가(17% 대 2%), 체중증가(12% 대 2%), 어지러움(7% 대 3%)이었습니다.
 - 3) 이 약 투여환자 중 1% 또는 그 이상 빈도나 있어나 이상반응
다음은 이 약 5~60mg/day를 투여한 미국에서의 단기 위약대조시험의 결과로서 약물투여 동안 때때로 적어도 한 번의 증상이 나타난 환자의 각 군당 비율입니다. 의사가 알아야 할 것은 환자배경 및 기타 다른 인자는 증상을 임상시험마다 다를 수 있으므로 이 표로 임상시 전과정에 이상반응을 예측할 수 없다는 것입니다. 마찬가지로 여러이러한 빈도는 다른 처치방법 사용조작자가 실시한 다른 조사에서 얻은 결과 비교할 수 없습니다. 그러나 이 표를 연구할 때 환자의 이상반응을 발견하는 다른 약물과 비특정성 요인의 상대적 기여도를 예상하는 데에 이용할 수 있습니다.
<단기간중 미국 대조시험에서 이상반응의 빈도>(1 %)

	신체부위 이상반응	미르타자핀 (n=453)	위약(n=361)
전반발			
구역증		8%	5%
복강부종		5%	3%
요통		2%	1%
소화기계			
구강건조		25%	15%
식욕증가		17%	2%
변비		13%	7%
대사 및 영양			
체중증가		12%	2%
발초부종		2%	1%
부종		1%	0%
근골격계			
근통		2%	1%
신경계			
졸음		54%	18%
어지러움		7%	3%
비정상적 꿈		4%	1%
이상사각		3%	1%
떨림		2%	1%
척추간		2%	0%
호흡기계			
호흡곤란		1%	0%
외로기계			
빈뇨		2%	1%

*1) 약 투여로 적어도 1% 이상 환자에 나타났던 증상이 포함되었습니다. 이 약보다 위약에 발현빈도가 많은 약의 증상은 제외되었습니다. *2) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*3) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*4) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*5) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*6) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*7) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*8) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*9) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*10) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*11) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*12) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*13) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*14) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*15) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*16) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*17) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*18) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*19) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*20) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*21) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*22) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*23) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*24) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*25) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*26) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*27) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*28) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*29) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*30) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*31) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*32) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*33) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*34) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*35) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*36) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*37) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*38) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*39) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*40) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*41) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*42) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*43) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*44) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*45) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*46) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*47) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*48) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*49) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*50) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*51) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*52) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*53) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*54) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*55) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*56) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*57) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*58) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*59) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*60) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*61) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*62) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*63) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*64) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*65) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*66) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*67) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*68) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*69) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*70) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*71) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*72) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*73) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*74) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*75) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*76) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*77) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*78) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*79) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*80) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*81) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*82) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*83) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*84) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*85) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*86) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*87) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*88) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*89) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*90) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*91) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*92) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*93) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*94) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*95) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*96) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*97) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*98) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*99) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*100) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*101) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*102) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*103) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*104) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*105) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*106) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*107) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*108) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*109) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*110) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*111) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*112) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*113) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*114) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*115) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*116) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*117) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*118) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*119) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*120) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*121) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*122) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*123) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*124) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*125) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*126) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*127) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*128) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*129) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*130) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*131) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*132) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*133) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*134) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*135) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*136) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*137) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*138) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*139) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*140) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*141) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*142) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*143) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*144) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*145) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*146) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*147) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*148) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*149) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*150) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*151) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*152) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*153) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*154) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*155) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*156) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*157) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*158) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*159) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*160) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*161) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*162) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*163) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*164) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*165) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*166) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*167) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*168) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*169) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*170) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*171) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*172) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*173) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*174) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*175) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*176) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*177) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*178) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*179) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*180) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*181) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*182) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*183) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*184) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*185) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*186) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*187) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*188) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*189) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*190) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*191) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*192) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*193) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*194) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*195) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*196) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*197) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*198) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*199) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*200) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*201) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*202) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*203) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*204) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*205) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*206) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*207) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*208) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*209) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*210) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*211) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*212) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*213) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*214) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*215) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*216) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*217) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*218) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*219) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*220) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*221) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*222) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*223) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*224) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*225) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*226) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*227) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*228) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*229) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*230) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*231) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*232) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*233) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*234) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*235) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*236) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*237) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*238) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*239) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*240) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*241) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*242) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*243) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*244) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*245) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*246) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*247) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*248) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*249) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*250) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*251) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*252) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*253) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*254) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*255) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*256) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*257) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*258) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*259) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*260) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*261) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*262) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*263) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*264) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*265) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*266) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*267) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*268) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*269) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*270) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*271) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*272) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.
*273) 위약 투여를 받은 환자는 세로토닌 증후군 증상을 경험할 수 있습니다.