

퓨록심정250밀리그램

(세푸록심아세틸)

전문약품
분류번호 618

K.G.M.P

우주약물저장업체

【원료약품 및 그 분량】 이약 1정 중

- 유효성분: 세푸록심아세틸(KP) 250mg (세푸록심으로서 250mg(약기)) 300.72mg
- 기타 첨가제: 라우릴황산나트륨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라아[03B28796, 이산화규소, 전분, 글리콜산나트륨, 코코바돈, 크로스카르멜로오스나트륨]

【성상】 흰색의 장방형 필름코팅정제

【효능·효과】

- 1) 호기성 그람양성균
 - 황색포도구균(메치실린 감수성 균주, 페니실린내제 생성균 포함), 황색성연쇄구균, 베타용혈성 연쇄구균, 코아글라타 음성 포도구균(Coagulase negative staphylococcus)(메치실린 감수성 균주), 폐렴연쇄구균*
- 2) 호기성 그람음성균
 - 대장균*, 클레브시엘라 속(페렴간균 포함, 단 폐렴간균 중 ESBL 생성균주 및 카피페네메이즈 생성균주 제외), 프로테우스 미리빌리스*, 프로비덴시아* 속, 인돌플라센자(안파실린내성균주 포함), 모락셀라 카타랄리스, 파라인돌루스연쇄균, 임균*(페니실린내제 및 아미노페니실린내제 생성균 포함), 시트로박터 속(시트로박터 프렌디스 제외), 엔테로박터 속(엔테로박터 에어로게네스균 및 엔테로박터 클로아케 제외), 프로테우스 속(프로테우스 페넬라 및 프로테우스 불가리스 제외)
- 3) 혐기성 그람양성균
 - 펩토엔쇄구균 속, 클로스트리듐 속(클로스트리듐 디피테리 제외), 프로피오니박테럼 속
- 4) 혐기성 그람음성균
 - 박테로이데스 속(박테로이데스 프라글리스 제외), 푸스박테럼 속*
- 5) 스피로헤타
 - 보렐리아 부르그도페리
 - * 획득내성이 문제가 될 수 있는 균종(Species for which acquired resistance may be a problem)에 해당함.
- 적응증
 - 세푸록심은 베타락탐마제에 매우 안정하여 대부분의 암피실린 및 아목시실린 내성 균주에 대하여도 효과를 나타내는 광범위 살균성 세발로스포린계 항생물질이다.
 - 상기도 감염증: 중이염, 부비동염, 편도염, 인두염 등
 - 하기도 감염증: 급·만성기관지염, 폐렴 등
 - 비뇨생식기계 감염증: 신우신염, 방광염, 요도염 등
 - 피부 및 연조직감염증: 종기(농, 농창, 농치), 농창 등
 - 임질: 단순금강임균성요도염, 임균성자궁경관염

【용법·용량】

- 최적의 흡수를 위하여 식후에 복용한다.
- 성인 및 12세 이상의 소아
 - 대부분의 감염증에 있어서 상용량은 1일 2회, 1회 250mg이다. 중증 하기도 감염증 또는 폐렴이나 중증의 감염증, 저감수성균에 의한 감염증이 의심될 때는 1일 2회, 1회 500mg을 투여한다. 요로감염증에 있어서 상용량은 1일 2회, 1회 125mg이며 신우신염이나 중증에 따라 용량은 1일 2회, 1회 250mg으로 할 수 있다. 단순임질의 경우 1일 1회 1회 투여한다.
 - 유아 및 12세 미만의 소아
 - 대부분의 감염증에서는 1회 125mg을 1일 2회 투여한다. 단, 2세 이상의 중이염 환자에게는 1회 250mg을 1일 2회 투여한다. 3개월 미만의 영아에 대해서는 사용된 경험이 부족하다. 스트렙토코쿠스 피오게네스(그룹A-베타용혈성)에 의한 감염증 치료에 있어서는 7-10일간 이 약을 투여하여야 한다.
 - 노인환자
 - 세푸록심은 주로 신장으로 배설된다. 신기능이 현저하게 손상된 환자에서 느린 배설을 보상하기 위해 아래와 같이 세푸록심의 용량을 감량하는 것이 권장된다.

크레아티닌 청소율	T _{1/2} (시간)	권장 용량
≥ 30mL/분/1.73m ²	1.4 ~ 2.4	용량 조절 불필요 (표준 용량: 1일 2회, 1회 125mg ~ 500mg)
10 ~ 29mL/분/1.73m ²	4.6	24시간마다 표준 단일용량 투여
< 10mL/분/1.73m ²	16.8	48시간마다 표준 단일용량 투여
혈액투석 중인 환자	2 ~ 4	각 투석 종료 시점에 표준 단일용량을 추가 투여

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 세발로스포린계 항생물질에 과민반응 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 페니실린계 또는 다른 베타락탐계 항생물질에 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 2) 본인 또는 부모, 형제에 기관지천식, 천식, 두드러기 등의 알레르기 증상을 일으키기 쉬운 체질을 가진 환자
 - 3) 중증의 신장애 환자
 - 4) 경구투약이 불리한 환자 또는 비경구영양 환자, 고령자, 전신상태가 나쁜 환자(비타민 K 결핍 증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰한다.)
3. 이상반응
 - 약물 이상반응은 일반적으로 경도이고 일시적이다.
 - 이상반응 대부분이 발생물을 신장할 수 있는 적절한 지혈제(예를 들어, 위약 대조 시험 자료)를 가지고 있지 않으므로 이러한 이상반응은 빈도 범주는 추정치이다. 또한 이 약과 관련있는 이상반응의 발생률은 적응증에 따라 다를 수 있다.
 - 이상반응 중 '매우 흔하게' ~ '드물게'에 해당하는 이상반응의 빈도는 임상시험 자료로부터 결정되었다.
 - 모든 다른 이상반응의 빈도 (즉, <1/10,000로 발생한 사례들은) 주로 시판 후 자료로부터 결정되었고, 이들은 상제 빈도보다는 보고된 비율을 나타낸다.
 - 빈도 분류에 다음과 같은 용어를 사용한다: 매우 흔하게(≥1/10), 흔하게(≥1/100, <1/10), 흔하지 않게(≥1/1000, <1/100), 드물게(≥1/10000, <1/1000), 매우 드물게(<1/10000).

감염 및 감염증 - 흔하게: 칸디다 과도증식 혈액 및 림프계 - 흔하게: 호산구 증가 - 흔하지 않게: 림프시원 양성, 혈소판 감소, 백혈구 감소(가끔 백혈구 초소강), 과립구 감소 - 드물게: 적혈구 감소, 헤모글로빈 감소, 헤마토크릿 감소 - 매우 드물게: 용혈성 빈혈 세발로스포린계는 적혈구 표면에서 흡수되는 경향이 있고 항체와 직접적으로 반응하여 림프시원 양성이나 나타내거나(이것은 혈액 적혈구시험을 방해할 수 있다) 매우 드물게 용혈성 빈혈을 일으킬 수 있다.	면역계 과민반응은 다음을 포함한다. - 흔하지 않게: 피부발진 - 드물게: 두드러기, 가려움 - 매우 드물게: 약물 발열, 혈청병, 아나필락시스 - 안면부종, 림프관종증, 관절통
신경계 - 흔하게: 두통, 어지러움 경련이 나타날 수 있다. 특히 고령이거나 고령 또는 중증감염이 동반 되었을 때 불안, 초조, 정신착란, 환상이 나타날 수 있다.	소화기계 - 흔하게: 설사, 구역, 복통을 포함하는 위장 장애 - 흔하지 않게: 구토, 소화불량, 변비, 식욕부진 - 드물게: 위막성 대장염, 복부팽만감
호흡기계 드물게 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X-선상, 호산구증가 등을 수반한 간질성폐렴, 호산구성 폐렴이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 코르티코이드를 투여하는 등 적절한 처치를 한다.	

간-담도계 - 흔하게: 간효소의 일시적인 증가(ALT(SGPT), AST(SGOT), LDH) - 매우 드물게: 황달(대부분 담즙을체성형할), 간염	신장 기증 BUN 등의 상상이 나타날 경우가 있고, 급성 신부전 등의 중증의 신장애가 나타날 수 있으므로 정기적으로 검사를 실시하는 등 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
피부 및 피하조직 - 매우 드물게: 다형홍반, 스티븐스-존슨증후군, 독성표피괴사증후군(발진성 괴사성)면역계 질환을 또한 참조한다.	비타민결핍증 - 드물게: 비타민 K 결핍증상(프로트롬빈혈증, 출혈경향 등), 비타민 B6 결핍증상(설염, 구내염, 식욕부진, 신경병 등)
기타 - 드물게: 이통, 입주위귀각이상, 혀의 마비감, 인두이상감, 구내건조, 심계항진, 습진	

4. 일반적 주의

- 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료 상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직하다.
- 2) 속 등의 반응을 예측할 수 있도록 충분히 문진해야 한다.
- 3) 드물게 속 증상을 일으키는 경우가 있으므로 세밀히 관찰해야 하며, 불쾌감, 구내이상감, 현명, 어지러움, 변의, 이명, 발한 등의 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지해야 한다.
- 4) 다른 항생물질과 마찬가지로 이 약을 투여시 칸디다의 과도한 증식이 나타날 수 있으며 이 약의 장기간 투여시 비감수성균(내구균, Clostridium difficile)의 과도한 증식이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 치료를 중단해야 한다.
- 5) 항생제 사용과 관련하여 경도에서 생명을 위협하는 중증도 병원의 위약성 대장염이 보고되었다. 그러므로 항생제 사용기간 동안 또는 사용 후에 설사가 발생한 환자에서 위약성 대장염의 진단을 고려하는 것은 중요하다. 만약 지속적인 또는 유행한 설사가 발생하거나 환자가 경련성 복통을 경험하는 경우, 치료를 즉시 중단하고 환자를 추가적으로 조사하여야 한다.
- 6) Lyme병 환자에서 투여 시에는 아리스(헤르소니아) 발음이 나타날 수 있다. 이는 Lyme병의 원인균 Spirochaete burgdorferi에 대한 이 약의 살균 효과로 인한 직접적인 결과이며, 이러한 증상은 Lyme 병에 대한 항생제 투여시 나타나는 일반적인 현상으로, 일정한 기간이 지나면 소실되기 쉬움을 환자에게 알려 주어야 한다.
- 7) 순차적 치료방법으로서 경우 치료제로의 변경 시점은 환자의 감염 증증도와 임상 상태, 그리고 관련된 병원의 감수성에 따라 결정된다. 72시간 이내에 임상적 개선이 없을 경우에는 주시요법이 계속되어야 한다. 순차적 치료방법을 시작하기 전에 세푸록심 나트륨의 처방정도를 참고한다.
- 8) 이 약은 어지러움을 유발할 수 있으므로 운전 또는 기계조작시 주의를 기울여야 한다.

5. 상호작용

- 1) 푸로세미드 등의 이뇨제나 아미노글리코사이드계 항생물질과 병용투여 시 신장애가 증가될 수 있으므로 신중히 투여한다.
- 2) 프로베네시드와 병용투여 시 이 약의 세뇨관 배설 속도가 감소되어 혈중농도를 지속시킬 수 있다.
- 3) 제산제 등 위산 억제제와 병용시 효과가 감소되므로 식사의 함께 복용하는 것이 흡수에 좋다.
- 4) 다른 항생물질과 마찬가지로 장내균에 영향을 주어 예스트로겐 재흡수율을 낮추거나 병용하는 경우용 피임제의 효과를 감소시킬 수 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신 중의 투여에 대한 인성증상이 확인되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2) 이 약은 모유로 이행되므로 수유부에 투여 시는 주의해야 한다.

7. 소아에 대한 투여

- 1) 3개월 미만의 영아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.
- 2) 정제물 깨서 먹을 경우 매우 낮은 산도에서 투여 시에는 건조시럽제가 추천된다.

8. 고령자에 대한 투여

- 1) 고령자의 경우에는 다음과 같은 점에 주의하여 용량 및 투여간격에 주의하는 등 환자의 상태를 관찰하고 신중히 투여한다.
- 2) 일반적으로 신기능이 저하되어 있어 많은 이상반응이 발생할 수 있다.

9. 임상검사에 의한 영향

- 1) 네이티브트와, 펄릭시와, 클리나-테스트에 의한 요양감사에서 위양성이 나타날 수 있으므로 주의한다.
- 2) 직접 콜레스테롤 양성이 나타날 수 있으므로 주의한다. 이 형상은 혈액의 교차시험에 영향을 미칠 수 있다.
- 3) 혈당 측정 시험할 때에는 페라시나이드 검사에 의해 위음성이 나올 수 있으므로 글루코스옥시데아이나트 효소키나제 방법에 의해 측정한다.

- 4) 이 약은 피크로신 알칼리 방법에 의한 크레아티닌 검사에 영향을 미치지 않는다.

10. 과량투여시의 처치

- 1) 세발로스포린계 약물의 과량투여는 경련을 야기하는 뇌자극을 일으킬 수 있다. 세푸록심의 혈청농도는 혈액투석이나 복막투석으로 감소될 수 있다.

11. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 이 약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

12. 의약품동등성시험정보

- 가. 시험약 세푸록심아세틸정250밀리그램(국제약품(주))과 대조약 진네트정250밀리그램(주)글락소스미스클라인을 2x2 교차시험으로 각 1정씩 건강인 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 24명의 혈중 세푸록심을 측정하고 결과, 비교평가항목치(AUC, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90%신뢰구간이 log0.8 에서 log1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

<세푸록심아세틸>

《세푸록심약제실》					
구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-∞} (μg·hr/mL)	C _{max} (μg/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	진네트정 250밀리그램 (주)글락소스미스클라인)	9.368 ± 2.139	3.107 ± 0.808	1.75 (1.0-5.0)	1.33 ± 0.20
시험약	세푸록심아세틸정 250밀리그램 (국제약품(주))	9.281 ± 1.888	3.170 ± 0.719	1.75 (1.0-3.0)	1.42 ± 0.29
90% 신뢰구간* (기준: log0.8 ~ log1.25)		log 0.9553~1.0371	log 0.9446~1.1144		

(AUC, C_{max}, t_{1/2}: 평균값 ± 표준편차, T_{max}: 중앙값(범위), n = 24)
AUC: 투약시작부터 최종혈중농도 정량시간까지의 혈중농도-시간곡선하면적
C_{max}: 최고혈중농도
T_{max}: 최고혈중농도 도달시간
t_{1/2}: 말단속성 반감기

* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간
주: 이 약은 국제약품(주) 세푸록심아세틸정250밀리그램과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전 공정을 국제약품(주)에 위탁 제조하였다.

【포장단위】 50정(10정/PTP×5)

【저장방법 및 사용(유효기간)】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 24개월

【제조자】 국제약품(주) 경기도 안산시 단원구 산성로 47

【제조외지 및 판매】 (주)바이넥스 부산광역시 서구 구대로 368-3

* 본 약품은 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 주시기 바랍니다.

* 이 약을 사용하시기 전에 반드시 본 설명서를 읽어주시기 바랍니다.

* 첨부서의 개정연월일 이후로 변경된 허가사항은 온라인 의약품대사관(http://drug.mds.go.kr) 혹은 당사 홈페이지(http://www.bi-nex.com)나 전화(080-263-3151)로 문의하신 확인하실 수 있습니다.

* 부작용 피해구제 신청: 한국약물안전관리원(1644-6223)

http://www.bi-nex.com

퓨록심정250밀리그램

☎080-263-3151

개정연월일: 2017년 09월 21일

BINEX

주:바이넥스

비즈니스 센터 3083

S171100H