

# 아레나스<sup>정</sup>

전문의약품

**[원료약품 및 분량]** 1정 중

- 유효성분 : 에피나스틴염산염 (별규) ..... 10.0mg
- 첨가제 (동물유래성분) : 유당수화물 (소, 우유), 스테아르산마그네슘 (돼지 (돈지), 소 (우지))
- 기타 첨가제 : 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 카르나우바납, 크로스포비돈, 탈크, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프록셀로오스2910

**[성상]** 흰색 또는 미황색의 원형 필름코팅정

**[효능·효과]**

1. 기관지천식
2. 알레르기비염
3. 두드러기, 습진 · 피부염, 피부가려움, 가려움발진 (痒疹), 가려움을 동반한 보통건선

**[용법·용량]**

1. 천식, 두드러기, 습진 · 피부염, 피부가려움, 가려움발진 (痒疹), 가려움을 동반한 보통건선  
성인 : 에피나스틴염산염으로서 1일 1회 20 mg을 경구 투여하십시오. 증상에 따라 적절히 증감하십시오.
2. 알레르기비염  
성인 : 이 약으로서 1일 1회 10~20 mg을 경구 투여하십시오. 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

**[사용상 주의사항]**

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
  - 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
  - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.  
간질환자 또는 간질환의 병력이 있는 환자(간질환이 악화되거나 재연될 수 있습니다.)
3. 이상반응
  - 1) 과민반응 : 알레르기 반응 (예, 발진, 두드러기, 발적), 가려움, 부종 (얼굴, 수족 등), 가려움을 동반한 홍반이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
  - 2) 정신신경계 : 때때로 졸음, 권태감, 두통, 드물게 어지러움, 불면, 악몽, 마비감, 머리가 멍한 상태 등이 나타날 수 있습니다.
  - 3) 소화기계 : 때때로 구역, 위부불쾌감, 구갈, 복통 드물게 식욕부진, 구토, 위중감, 위저감, 설사, 변비, 구순건조감, 복부팽만감, 구내염 등이 나타날 수 있습니다.
  - 4) 간장 : AST, ALT, γ-GTP, ALP, LDH의 상승의 간기능장애, 황달 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상반응이 나타난 경우 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오. 간염 및 기존에 간손상이 있던 환자에서의 증상악화가 산발적으로 보고되었습니다.
  - 5) 신장 : 드물게 단백뇨가 나타날 수 있습니다.
  - 6) 비뇨기계 : 드물게 빈뇨, 혈뇨 등의 방광염양 증상, 요저류가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상반응이 나타난 경우 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오.
  - 7) 순환기계 : 때때로 심계항진이 나타날 수 있습니다.
  - 8) 호흡기계 : 드물게 호흡곤란, 가담곤란, 코막힘이 나타날 수 있습니다.
  - 9) 혈액계 : 빈도불명의 혈소판 감소, 드물게 백혈구 증가가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상반응이 나타난 경우 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오.
  - 10) 빈도불명의 여성형 유방, 유방종대, 드물게 월경이상, 화끈거림, 쓰앰, 미각저하, 가슴통증 등이 나타날 수 있습니다.
4. 일반적 주의
  - 1) 이 약은 기관지 확장제, 스테로이드제 등과는 달리, 천식 발작의 증상을 신속히 경감시키는 약제가 아니므로 이런 환자에게는 충분한 설명을 해 줄 필요가 있습니다.
  - 2) 장기 스테로이드제 요법을 받고 있는 환자에서 이 약 투여에 의해 스테로이드제를 감량하게 되는 경우, 충분한 관리 하에 서서히 행하십시오.
  - 3) 운전능력에 대한 임상시험 결과, 이 약이 운전능력에 영향을 미치지는 않았습니다. 그럼에도 불구하고 이약은 졸음을 초래할 수 있으므로 환자들에게 기게 조작 시나 자동차 운전시 주의하도록 권고해야 합니다.
  - 4) 이 약의 사용에 의해 효과가 확인되지 않은 경우에는 장기투여하지 않도록 주의하십시오.
  - 5) 저절상 환자에게 투여하는 경우에는 호발계절을 고려하여 그 직전에서부터 투약을 시행하여 호발계절이 종료될 때까지 연속투여하는 것이 바람직합니다.
5. 상호작용
  - 1) 전임상결과에 비추어 볼 때, 이 약이 수면제, 항히스타민제 또는 알코올의 진정작용을 강화시키지는 않을 것으로 보입니다. 그러나 이러한 약물과 병용투여한 임상적 경험은 없습니다.
  - 2) 진정효과가 없는 다른 항히스타민제들과는 달리 이 약은 주로 비대체로 배설됩니다. 이 약은 CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 와 상호작용을 전혀 하지 않거나 거의 하지 않습니다. 따라서 CYP-450에 의존하여 배설되는 다른 약물들의 대사에 영향을 미치지 않을 것으로 기대됩니다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
  - 1) 임신 중의 투여에 관한 안전성은 확립되지 않았으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에 한하여 투여하십시오 (임산전 또는 임신초기시험(캣트)에서는 수태율의 저하가 있었고, 기관형성시험(토끼)에서는 태자치사작용은 모두 고용량에서 확인되었습니다.).
  - 2) 동물실험 (캣트)에서 모유중으로 이행한다는 보고가 있으므로 수유중인 여성에게는 투여를 피하고 부득이하게 투여해야 하는 경우에는 수유를 중지하십시오.
7. 소아에 대한 투여  
저체중아, 신생아, 영 · 유아 및 소아에 대한 안전성은 확립되지 않았습니다 (사용경험이 적습니다.).
8. 고령자에 대한 투여  
고령자에서는 간, 신기능이 저하된 경우가 많고 흡수된 이 약은 주로 신장에서 배설되므로 정기적으로 이상반응, 임상증상(발진, 구갈, 위부불쾌감 등)의 관찰을 충분히 하고 이상반응이 나타난 경우 감량(10 mg/일) 또는 휴약하는 등의 적절한 처치를 하십시오.
9. 과량투여시의 처치
  - 1) 증상 : 이 약의 과량투여한 경험은 부족합니다. 다른 H1-길항제와 마찬가지로 과량투여시 QT간격을 연장시킬 가능성을 배제할 수 없으며 따라서 잠재적으로 부정맥을 일으킬 수 있습니다. 이러한 증상이 이 약과 관련하여 보고된 적은 없지만 과량투여시 ECG를 모니터링 해야 합니다.
  - 2) 처치 : 위세척 및/또는 배뇨를 유도하십시오. 대증치료를 실시하십시오.
10. 보관 및 취급상의 주의사항
  - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하십시오.
11. 의약품동등성시험 정보<sup>\*)</sup>
  - 가. 시험약 에피나스틴염산염정 10밀리그램 [제일약품(주)]과 대조약 알레지온정 10밀리그램 (에피나스틴염산염) [한국배리거인컬처임주]을 2×2 교차시험으로 각 2명씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 28명의 혈중 에피나스틴을 측정하고, 비교평가항목치 (AUC<sub>0-24h</sub>, C<sub>max</sub>)를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90%신뢰구간이 log 0.8 에서 log 1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였습니다.

| 구분                                    |                                            | 비교평가항목                               |                             | 참고평가항목                |                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                       |                                            | AUC <sub>0-24h</sub><br>(ng · hr/mL) | C <sub>max</sub><br>(ng/mL) | T <sub>max</sub> (hr) | t <sub>1/2</sub> (hr) |
| 대조약                                   | 알레지온정 10밀리그램<br>(에피나스틴염산염)<br>[한국배리거인컬처임주] | 216.2±57.8                           | 24.55±7.13                  | 3.00<br>(0.67 ~ 4.00) | 7.68±1.22             |
| 시험약                                   | 에피나스틴염산염정<br>10밀리그램<br>[제일약품(주)]           | 224.8±50.3                           | 26.34±6.92                  | 2.00<br>(0.67 ~ 4.00) | 7.38±1.52             |
| 90% 신뢰구간*<br>(기준: log 0.8 ~ log 1.25) |                                            | log 0.9862<br>~ 1.1238               | log 0.9820<br>~ 1.1850      | -                     | -                     |

(AUC<sub>0-24h</sub>, C<sub>max</sub>, t<sub>1/2</sub> : 평균값 ± 표준편차, T<sub>max</sub> : 중앙값(범위), n = 28)

AUC<sub>0-24h</sub> : 투약시간부터 최종혈중농도 측정시간 까지의 혈중농도 - 시간곡선하면적

C<sub>max</sub> : 최고혈중농도

T<sub>max</sub> : 최고혈중농도 도달시간

t<sub>1/2</sub> : 말단 소실 반감기

\* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간

<sup>\*)</sup> 이 약은 제일약품(주) 에피나스틴염산염정 10밀리그램과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전 공정을 제일약품(주)에 위탁 제조하였음.

12. 기타

공복시 투여하는 경우에 식후투여보다 혈중농도가 높아진다는 보고가 있다(기관지천식 및 알레르기비염에 대해서는 취침전 투여, 두드러기, 습진, 피부염, 피부가려움, 가려움발진 (痒疹), 가려움을 동반한 보통건선에 대해서는 식후 투여에서 유효성 및 안전성이 확인되었다.).

**[저장 방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관      **[포장 단위]** 30정/병, 100정/병

• 제조자 : 제일약품(주) 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 7 (8동 외)

• 제조의뢰자 : 삼익제약주식회사

\* 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.

\* 첨부문서를 읽고, 첨부문서를 보관하십시오.

\* 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.

\* 본 제품의 적절한 사용에도 불구하고 부작용 발생 시, 한국의약품안전관리원(1644-6223)으로 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

\* 이 첨부문서 작성일자(2017. 09. 12)이후 변경된 내용은 삼익제약 홈페이지(http://www.samik.co.kr) 또는 온라인의약품도서관(drug.mfds.go.kr)의 약품 정보를 참조하세요.

\* 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다. 본 제품은 공정거래위원회 고시 "소비자분쟁해결기준"에 의해 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 171219

**삼익제약주식회사**  
인천광역시 부평구 청안로 13  
학술/개발부 : (02)928-0661