

## 고함량 활성비타민의 빠른 흡수를

## 메가비

액티브

본 약은 사용하기 전에 본 첨부문서를 주의있게 읽어 하에, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

## [의약품 및 그 분량] 1정 중

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| ■ 유효성분 : 벤토티아민(KP)  | 100.0mg   |
| (티아민염산염으로서 72.31mg) |           |
| 리보플라빈(KP)           | 45.0mg    |
| 리보플라빈부타레이트(KP)      | 5.0mg     |
| 니코틴아미드(KP)          | 50.0mg    |
| 판토텐산칼슘(KP)          | 50.0mg    |
| 피리독신염산염(KP)         | 45.0mg    |
| 피리독실포스페이트수화물(KP)    | 5.0mg     |
| 비오틴(USP)            | 0.1mg     |
| 폴산(KP)              | 0.25mg    |
| 히드록스코발라민아세트산염(KP)   | 0.05225mg |
| (히드록스코발라민으로서 50μg)  |           |
| 아스나롤(KP)            | 50.0mg    |
| 콜린타르타르산염(DAB)       | 50.0mg    |
| 제파아스코르빈(불규)         | 52.1mg    |
| (아스코르빈산으로서 50mg)    |           |
| 산화아연(KP)            | 30.0mg    |
| (아연으로서 24mg)        |           |
| 토코페롤아세테이트2배산(KP)    | 20.0mg    |
| (비타민E로서 10IU)       |           |
| 셀레늄함유간조효소(KP)       | 30.0mg    |
| (셀레늄으로서 16.2μg)     |           |
| 뉴클레오타이드(불규형)(EP)    | 10.0mg    |
| (비타민B로서 1000IU)     |           |
| 우르스테옥시콜산(KP)        | 10.0mg    |
| 감마오리자놀(KP)          | 10.0mg    |

- 첨가제(타르사스): 청색2호 인디카르민
- 첨가제(동물유래성분): 유당(젖당)수화물(소, 우유)
- 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 저자한도인드록시프로필셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 경질수무규산, 스테아르산나트륨, 스테아르산, 폴리에틸렌글리콜6000, 탈크, 산화티탄, 바닐라아크론, 오파드라이트노란색(03662869)

## [생성] 연한 황색상 장방형 필름코팅 정제

## [효능·효과]

1. 다음경우의 비타민 D, E, B1, B2, B6, C의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기 - 발육기 - 노년기
- 병중·병후(병을 앓은 동안이나 회복 후)의 체력 저하

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 뼈, 이의 발육유형 - 구루병의 예방 - 2기 - 노인기
- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요하리통, 어깨 결림통), 구강염(입고름), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

3. 아연의 보급

[용법·용량] 만 8세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

## [사용상의 주의사항]

## 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- (1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(saroidosis: 결핵을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환(신장기능) 질환 환자 (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (3) 만 12개월 미만의 영아 (4) 신장(콩팥)결석 환자 (5) 이 약은 유당(젖당) 수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency), 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

## 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- (1) 인산염, 칼슘염, 경구약(먹는) 용해하는 용액 테트라시클린계 제제, 제산제
- (2) 레보도파
- (3) 다음과 같은 사람(경우는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의) 할 것.
  - (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
  - (2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
  - (3) 고칼슘혈증 환자(hypercalcaemia: 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
  - (4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
  - (1) 비타민 D는 오줌을 분비하여 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
  - (5) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
  - (6) 심장-순환기계기능 장애 환자
  - (7) 신장(콩팥)장애 환자
  - (8) 저칼슘혈증 환자
  - (9) 동통환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
  - (10) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자

## 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 설사, 위부 불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 붉은 변, 식욕부진, 복부(배부)팽만감, 피부염, 몸·호흡기악취, 탈모, 조골증, 위장관장애, 소화장애, 심박동(배부)부동, 저혈압, 저혈당, 폐부종(부기)
- (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- (3) 에스트로겐을 포함한 경구약(먹는) 복용하는 용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관)형성 소인이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
- (4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- (5) 피리독신을 1일 500mg-2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- (6) 폴산이 부족한 환자(예 비타민B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- (7) 고용량 투여에 의해 소화성 용해 속진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애, 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. (니코틴아미드 또는 니코틴산 함유제제)
- (8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고칼슘혈증, 출혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- (9) 항알도스테로이드, 트리암테렌과 병용(함께복용(사용))투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- (10) 우발적으로 과량복용한 경우
- (11) 1개월 이상 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

## 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것
- (3) 각종 요양시설 혈당의 검사를 방해할 수 있다.
- (4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에서 영향을 줄 수 있다.
- (5) 녹차, 홍차 등 탄산을 함유하는 차는 복용, 복용전후에는 피할 것.

## 6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않을 것.

[저장방법] 기온 15℃, 습도 60% (1~30℃) [사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 60정/병, 120정(60정/병 X 2)

※ 부작용 보고 한국약물안전관리센터(1644-6223)

[소비자상담번호] 080-001-0321

본 제품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드려며, 공정거래 위원회 및 식품의약품안전처에 해당 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

DS-1710-00

첨부문서 최초 작성년월일 2017. 10. 30

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 동성제약 홈페이지([www.dongsung-pharm.com](http://www.dongsung-pharm.com)) 및 식품의약품안전처 홈페이지(지문인식) 온라인의약품안전(지문인식) <http://drug.mfds.go.kr>의 해당 제품정보관리에서 확인하실 수 있습니다.

[제조사]

한국코스모스

충청북도 제천시 강서로 30

[주최자]

동성제약주식회사

충청남도 아산시 둔포면 관대안길 45