

바이크라 정625mg,375mg

(아목시실린·클라불란산칼륨)

전문의약품
분류번호 618

허가사항 변경지시(재평가)(2017.8.16) 반영

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1정 중

- 바이크라정 625mg
*유효성분: 아목시실린수화물(KP) 500mg(약가)
 묽은클라불란산칼륨(EP) 212.73mg
(클라불란산칼륨으로서 125mg(약가))
*기타 첨가제: 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이인핵소(OY-C-7000A), 전분글리콜산나트륨, 카르나우바남, 히프로멜로오스

- 바이크라정 375mg
*유효성분: 아목시실린수화물(KP) 250mg(약가)
 묽은클라불란산칼륨(EP) 212.73mg
(클라불란산칼륨으로서 125mg(약가))
*기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이인핵소(OY-C-7000A), 전분글리콜산나트륨, 카르나우바남, 클로이드스산인화구소, 히프로멜로오스

【성상】 백색이거나 거의 백색 타원형의 필름 코팅 정제

【효능·효과】

○ 유효균종

*항생포도구균, *표피포도구균, 스트렙토코쿠스 피오게네스(그룹 A-베타용혈성), 폐렴연쇄구균, 스트렙토코쿠스 비리단스, 엔테로코쿠스 파이칼리스, 코리네텍테룸, 탄저균, 리스테리아 모노사이토제나스, 클로스트리듐, 펩토구균, 펩토엔세구균, *대장균, *스트레프토스 미라빌리스, *프로테우스 불가리스, *클레브시엘라, *살모넬라, *시겔라, 보르데텔라 백일해, *에르시니아 엔테로콜리더가, 부루셀라, *수막염균, *임균, *모락셀라 카타랄리스, *인플루엔자균, 동물 파스퇴렐라증 병원균, 공작감필로박터, 콜레라균, *박테로이드(박테로이디즈 프라질리스 포함)
(*알파실린 및 아목시실린에 내성이 있는 베타락타마제 생성균주 포함)

○적응증

- 급·만성 기관지염, 대엽성 및 기관지 폐렴, 농흉, 폐농양, 편도염, 부비동염, 중이염
- 방광염, 요도염, 신우신염
- 골반감염, 임질
- 중기 및 농양, 연조직염, 상처감염
- 골수염
- 치과감염

【용법·용량】

- 성인 및 12세 이상 또는 체중 40 kg 이상 소아 : 아목시실린/클라불란산칼륨으로서 1회 250mg/125mg, 1일 3회 8시간마다 경구투여하며 증중 및 호출기 감염 시 아목시실린/클라불란산칼륨으로서 1회 500 mg/125 mg으로 증량할 수 있다.
- 신장애가 있는 경우 크레아티닌 청소율에 따라 적절히 증감한다.
- 성인:

Table with 2 columns: 크레아티닌청소율, 용법·용량
Row 1: 10~30mL/min, 아목시실린의 양으로서 1회 250~500mg을 12시간마다 경구투여한다.
Row 2: 10mL/min 이하, 아목시실린의 양으로서 1회 250mg을 24시간마다 투여하되 용량이 초과되지 않도록 한다.

-소아: 같은 방법으로 감량한다.

- 단, 치과 감염 시는 아목시실린의 양으로서 1회 250mg, 1일 3회 5일간 투여한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 약제에는 투여하지 말 것.

- 이 약의 성분 또는 베타락탐계(페니실린계, 세페페계)에 과민반응을, 아나필락시스, 피부점막만종증(스티븐스-존슨 증후군), 쇼크 포함)의 병력이 있는 환자(베타 락탐계 약물에 교차 과민반응의 우려가 있다)
- 동반감염 바이러스 질환 특히 전염단핵증 및 림프성백혈병 환자(발진위험이 증가할 수 있다)
- 이 약 또는 페니실린에 의한 항암 또는 간기능 장애의 병력이 있는 환자(재발할 수 있다)
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 간장애 환자(간기능장애가 악화될 수 있다)
2) 중독 또는 증중 신장애 환자(혈중농도가 지속되므로 투여간격을 두고 사용한다)
3) 분변 또는 부조, 정체가 기관지전신, 발진, 두드러기 등 알레르기 증상을 일으키는 쉬운 체질인 환자
4) 경구 섭취가 불량한 환자, 비경구적 영양 환자, 고령자, 전신상태가 나쁜 환자(비타민 K 결핍증상이 나타날 수 있다)
5) 구토 및 설사를 동반한 소화기계 질환환자(약물의 충분한 흡수를 보장할 수 없다)

3. 이상반응

- 소화기계: 설사, 위막성대장염, 소화불량, 구내염, 두물결 위염, 혀염, 흑모설, 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 복통, 복부팽만감, 변비, 결장통, 위산증, 연변, 구강건조증 등이 나타날 수 있다. 또한 칸디다증, 항생제에 의한 대장염(위막성대장염 및 출혈성 대장염 포함)이 드물게 보고되고 있다. 혈변을 동반한 증중의 대장염이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 복통, 빈번한 설사가 나타나는 경우에는 즉시 투약을 중지하고 적절한 처치를 한다. 드물지만 구역 현상이 고통량 복용 시 나타나는 가장 보편적인 증상이다. 경구 투여로 발생하는 위장관계 이상반응은 식사 직후 시 약을 복용함으로써 경감될 수 있다.
다른 항생물질과 마찬가지로 위장관계 이상반응을 발현율은 2세 미만인 영아에서 상승할 수 있다. 그러나 임상시험에서는 2세 미만 영아의 4%만이 치료를 중단하였다.
- 간장: 때때로 AST, ALT, ALP, LDH, 혈청빌리루빈의 상승, 드물게 간염, 담즙울체성 황달이 나타날 수 있다. 이러한 증상은 다른 페니실린 제제보다 이 약을 사용하는 경우에 더 일반적으로 나타났고, 성인, 고령자(특히 60세 이상), 남성, 임신의 경우에 더 빈발한다고 보고되어 있다. 이상반응의 징후 및 증상은 치료 중 발현할 수 있지만 치료 중단 후 최대 6주까지 뒤늦게 보고되는 예가 있다. 간에 대한 이상반응은 대체로 가역적이나 극히 드물게 사망에 보고되어 있다. 이들 사망에는 일반인과도 심각한 지병을 앓고 있는 경우 또는 병용투여 약물과 관련되어 있었다. 간에 대한 이상반응은 남성 및 고령자에게 주로 보고되고 있으며 이 이상반응은 14일 이상 장기투약 시 더 증가된다. 간장애에 의한 조직학적인 관찰에서 담즙울체성, 간세포괴사, 또는 담즙울체성 및 간세포괴사 혼합성 변화가 보였다. 특히 소아에게서도 드물게 보고되었다. 투여기간은 적응증에 따라 적절히 검토해야하며 검토 없이 14일을 초과하지 않는다.
- 골관절염: 드물게 가려움, 다형성출혈반, 피부점막만종증(스티븐스-존슨 증후군), 독성표피괴괴사증(러셀증후군), 수포성백막피부염 그리고 급성 전신발진 증후군이 드물게 보고되고 있다. 이러한 피부반응은 항히스타민제나 필요 시 코르티코이드 전신투여로 조절가능하고, 이러한 발진 증상이 발현한 경우에는 투약을 중지하고, 의사의 지시를 따른다. 다른 베타락탐계 항생물질과 마찬가지로 드물게 혈관부종, 아나필락시스 혈청병양 증후군(혈청병양 이행 과민반응 (면역복합체질환)은 발열, 발진(특히 입 주위 피부발진, 두드러기, 마진양 발진), 관절통, 부종, 림프절증종 특징으로 한다.) 및 과민성 혈관염, 급성전신성 발진성능포증, 기관지경련을 동반한 호흡곤란, 후두부종, 아나필락시스 쇼크를 일으키는 혈압강하 증상을 보고되고 있다.
- 혈액계: 다른 베타락탐계 항생물질과 같이 투여시 백혈구 감소(호중구 감소 및 과립구 결핍 포함), 가역성 혈소판 감소 및 오폐혈성 빈혈, 빈혈, 혈소판 감소제 저혈, 호산구 증가, 백혈병, 후파리구증, 펩토구 감소, 드물지만 경미한 혈소판 감소와 과수핵적 등이 보고되고 있다. 또한 출혈시간 및 프로트롬빈시간도 감소될 수 있다.
- 비교적: 점막칸디다증을 비롯하여 질가려움·쓰러림, 분비물 증가 등이 나타날 수 있다.
- 중추신경계: 극히 드물게 중추신경계에 대한 이상반응이 확인된 바 있다. 그 이상반응으로는 초조감, 불안, 행동변화, 착란, 졸음, 불면, 기억력 활동 항진증, 어지럼, 두통 등 두 가지가 있다. 경련현상이 있는 노인이나 고령자 투여환자에게서 주로 발생될 수 있다. 항부(복부류)경직, 발열, 두통, 구역·구토 또는 의식 혼탁 등이 드물게 무균성수막염이 나타날 수 있으므로 인지기능의 증상이 나타나는 경우에는 투약을 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 신장: 드물게 급성 신부전, 간질성 신염, 이차 관련된 혈뇨 등 증중 신장애가 나타날 수 있으므로 정기검사를 하는 등 충분히 관찰해야 이상이 인정되는 경우에는 투약을 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 근교동증: 드물게 구내염, 칸디다증이 나타날 수 있다. 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투약을 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
- 비타민 결핍증: 드물게 비타민 K 결핍증상(저프로트롬빈혈, 출혈경향 등), 비타민 B군 결핍증상(하안염, 구내염, 식욕부진, 신경염 등)이 나타날 수 있다.
- 기타: 구토, 설사, 구내염, 마진양성, 권태감 등이 보고되었다.
- 유대 사람 후 이식장기(1989~2015)를 대상으로 실시한정모 분석·평가 결과 새로 확인된 이상사건은 다음과 같다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사건 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
· 피부 및 피하조직계: 피부염
· 전신 및 투여 부위 이상: 구강부종

4. 일반적 주의

- 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료 상 필요한 최소기간만 투여하는 것이 바람직하다.
- 페니실린을 투여한 환자에서 심각한, 때때로 치명적인 과민반응(아나필락시스모양 반응) 및 혈관부종이 나타날 수 있다. 이러한 반응은 페니실린 과민반응의 병력이 있거나 다발성 알레르기항원에 대해 감수성의 병력이 있는 환자에서 발생하기 쉬우며, 비경구적 요법에서 더 자주 발생하나 경구적 요법 시에도 발생할 수 있다.
- 아나필락시스 쇼크가 매우 드물게 나타날 수 있으므로 연밀히 모니터링하고 안정한 상태를 유지하도록 처치하여야 한다. 투여 후 환자를 안정한 상태로 유지시키고 충분한 관찰을 실시한다. 심각한 아나필락시스가 발생하는 경우에는 에피네프린과 같은 신속한 응급처치를 한다. 살균을 포함한 산소, 코르티코이드의 정맥주사, 쇼크 확보 등의 처치를 의사의 지시에 따라 실시한다.
- 항생제의 사용과 관련하여 위막성대장염이 경미한 수준에서 생기는 경우에는 예방하는 수준까지 보고되어 있다. 따라서 항생제 사용 중후 시 설사나 환자로 의심되는 위막성대장염이 고려되어야 한다. 장기간 또는 심각한 설사가 발생하거나 환자에게 복부경련이 나타나면, 이 약의 사용을 즉시 중단하여야 하는 추가적으로 조사되어야 한다. 항생물질 사용에 의해 장내세균군이 변화를 일으켜 클로스트리듐의 과잉번식을 일으킬 수 있다. 연구에 의하면 클로스트리듐 다이피셀레에 의해 생산되는 독소가 항생물질관련 대장염의 주 원인으로 알려졌다. 위막성대장으로 진단된 내과적인 치료를 시작해야 한다. 경미한 위막성대장염은 투약중지에 의해 회복될 수 있다. 증중도 또는 증중의 경우에는 수액, 전해질, 단백질 보충 등의 처치를 하고 클로스트리듐 다이피셀레에 대해 임상적으로 효과 있는 항생물질로 치료한다.
- 장기 투여 시 때때로 비감수성균의 과잉 증식 등이 나타날 수 있으므로 14일 이상 투여할 경우에는 충분히 관찰한다.
- 임부 이 약 투여환자에서 간기능 검사 상 변동이 확인된 바 있다. 임상적 유의성은 불확실하나 간기능부전 징후가 있는 환자의 경우 주의하여 사용해야 한다. 증중이나 대체로 가역적인 담즙 울체성 황달이 드물게 보고되고 있다. 치료중단 후 6주 경과 시까지 그 증상 및 징후가 과민성 발현하지 않을 수 있다.
- 이 약의 대부분은 신장으로부터 증중도 이상의 신장애 환자의 경우 용변·용량 한도에 준하여 이 약 사용량을 조정하여야 한다.
- 홍반성 발진은 아목시실린 사용으로 발생하는 전염단핵구증과 관련되므로 전염단핵구증이 우려되는 경우 이 약 사용을 피하여야 한다.
- 두드러기, 피부발진, 혈청병과 같은 증상이 나타나는 경우에는 약물투여를 중지하고 의사의 지시에 따라 적절한 처치를 한다.
- 이 약은 페니실린계 항생물질중에서는 비교적 낮은 독성을 나타내기는 하지만, 장기투약하는 경우에는 신기능, 간기능, 조절기능 등에 대한 정기적인 관찰이 필요하다.
- 이 약물로 치료를 시작하기 전에 페니실린, 세팔로스핀 또는 다른 알레르기 항원에 대한 이전의 과민반응의 병력 등에 대한 문진이 필요하다.

5. 상호작용

- 프로베네시드와의 병용 투여는 바람직하지 않다. 이는 아목시실린의 신세뇨관 배설을 감소시킴으로써 아목시실린의 혈중농도가 상승 지속될 수 있으며 클라불란산은 무관하다.
- 알로푸리놀과 암파실린을 병용 투여할 경우에는 암파실린을 단독 투여한 환자에 비해 알레르기성 피부반응(발진) 발생 가능성이 높으나 알로푸리놀에 의한 것인지 고신장증에 의한 것인지도 확실하지 않다.

- 디설파필과 병용투여하지 않는다.
- 이 약 투여환자 일부에서 출혈시간 및 프로트롬빈 시간 연장이 보고되었으므로 항응고요법 중인 환자에는 신중히 투여한다.
- 장내세균총에 영향을 주어 경구피막의 효과를 떨어뜨릴 수 있으므로 환자에게 주의를 시킨다.
- 아세트살리실산, 페니부타돈 및 다양한 항염증제를 페니실린과 동시 투약하면 혈중농도가 증가된다.
- 테트라사이클린계, 마크로라이드계, 설프아미드계, 클로람페니콜계를 포함한 경우로 화확요법 항생물질과의 병용투여 시 길항작용이 일어난다.
- 설파살라진과 동시 투여 시 설파살라진의 혈장농도를 감소시킨다.
- 아목시실린은 메토트렉세이트의 임상 정상소용을 떨어뜨린다.
- INR(INR(국제정상화비율)의 연하 : 이 약을 포함한 항생물질을 항응고제와 동시에 투여 받은 환자에서 항응고 활성의 증가가 보고되었다. 감염성질환(그리고 염증성 과정들 동반한), 환자의 연령과 일반적인 상태는 위험요소가 된다. 비록 이 약과 와파린의 상호작용이 임상시험을 통해 밝혀지지 않았지만 INR 모니터링을 실시하여야 하고, 필요한 경우 경구용 항응고제의 용량을 적절히 조절한다. 항생물질의 일부 종류들 특히 플루오퀴놀론, 마크로라이드, 사이클린, 코트리목사졸과 일부 세팔로스포린의 경우는 더 심하다.
- 항생물질 사용이 장내세균총에 영향을 끼쳐 일반 환자에서는 감시배당체(디곡신 등)의 흡수가 증가될 수 있다.
- 미코페놀레이트모페틸을 투여받는 환자가 경구 아목시실린/클라불란산칼륨을 병용한 직후, 수일동안 미코페놀산의 최저혈중농도(pre-dose, trough)가 약 50 %로 감소한 사례가 보고되었다. 투여를 지속함에 따라 이러한 현상이 감소되었으며 투여 중단 후에는 회복되었다. 최저혈중농도 변화가 미코페놀산 노출도의 변화를 정확히 반영한다고 볼 수는 없으므로 이러한 현상에 대한 임상적 유의성은 분명하지 않다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 임상시험에서 기형발생작용은 없으나 임신 중 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하며 특히 임신 초기 3개월 동안은 투여하지 않는다.
- 수유 중 미량이나 페니실린(암파실린 포함)이 모유로 이행될 수 있다.
- 수유부에 대한 투여로 인해 영아에게 설사, 점막의 전균서사, 과민반응 발현(피부발진 등) 등의 위험이 나타날 수 있으므로 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

7. 소아에 대한 투여

투여량(12세 이상 또는 체중 40 kg 이상 소아) 외의 소아에게 권장하지 않는다(사용경험이 적다).

8. 고령자에 대한 투여

고령자에는 다음과 같은 점에 주의를 하고 용량 및 투여간격에 유의하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.

- 생리기능이 저하되어 있는 경우가 많기 때문에 이상반응이 나타나기 쉽다.
- 비타민 K 결핍에 의한 출혈경향이 나타날 수 있다.

9. 임상감사치에의 영향

- 이 약은 요중으로 다량 배설되며 고농도의 요중 암파실린은 베네딕트 시약, 펄링시약, 클리테스테이트 시약에 의한 요당검사에서 거짓양성이 나타날 수 있으므로 주의한다. 따라서 환자에게 이 약을 투여하는 동안 이러한 검사를 실시하는 것은 바람직하지 않다. 테스테이트시약은 이 약에 의해 영향을 받지 않는다.
- 임부에게 암파실린 투여 시에 혈장내의 총 결합형 에스트로겐, 에스트로겐 글루쿠로나이드, 결합형에스트론 및 에스트라디올 농도가 일시적으로 감소되어 관찰되었다. 그러나 결과는 아목시실린 및 이 약 투여 시에도 관찰되었다.
- 유효농도였다. 검사에도 영향을 나타낼 수 있다.
- 클라불란산은 적혈구막의 표면에 흡수되는 경향이 있다. 만약 약물에 대한 항체가 존재한다면 콤스시험 양성 결과 나타낼 수 있다.
- 아목시실린 고농도 투여 시에 다음과 같은 경향이 있으므로 주의한다. : 유색반응으로 혈청의 총단백질비율을 결정하는데 간섭한다.

10. 과량투여시의 처치

- 증상
(1) 과량투여에 의한 문제는 거의 발생하지 않으나 발생한 경우에는 소화기증상(위통 및 복통, 설사, 구토 등) 및 체액과 전해질 평형이상, 소수의 경우에는 발진, 활동 항진증, 졸음이 나타날 수 있다.
(2) 아목시실린 과량투여 시 드물게 소변감소증 신부전으로 인한 간질성신염이 보고되기도 한다. 신부전증상은 이 약의 투여를 중지하면 가역적으로 회복되기도 한다. 아목시실린 및 클라불란산칼륨의 신장청소율 감소로 신부전환자는 높은 혈중농도를 유지할 수 있다.
(3) 페니실린을 고용량 투여하는 경우에는 간질성 뇌경련에 일해할 수 있다. 페니실린을 투여 받은 환자에게 중독증상은 아니지만 자주 일어날 수 있는 현상은 과민성 쇼크이다. 드물지만 급성하면서 치명적일 수 있다. 일반적으로 투여 직후 30분 안에 나타날 수 있다. 즉시 모든 가능한 처치를 실시하여 혈액순환을 정상화 시켜야 한다.
(4) 피부반응, 출혈, 빈혈소 감소 등 기타의 알레르기 반응도 일어날 수 있다.
- 처치: 이러한 경우에는 즉시 투여를 중지하고 증상에 따른 수분 전해질 평형에 주의하면서 처치한다. 이 약은 혈액투석으로 제거될 수 있다. 만약 과량투여사태가 발생한 지 얼마 지나지 않았고, 급기투여의 대상이 아니라면 구토 또는 위내유출물 제거를 위한 다른 방법도 실시가능하다.
비교량투여로 인한 경련이 있을 경우에는 디아제팜으로 진정시킨다.

11. 보관 및 취급상의 주의사항

25℃ 이하의 건조한 곳에 보관한다.

12. 의약품동등성시험 정보(바이크라정375mg 해당제)

가. 시험용 아목시실린수화물/묽은클라불란산칼륨정375밀리그램 [보형제약(주)]과 대조용 오구멘틴정(아목시실린·클라불란산칼륨(2:1)) [알성신약(주)]을 2×2 교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 58명의 혈중 아목시실린 및 클라불란산혈 농를 측정한 결과, 비교평가항목치(AUC_{0-∞}, C_{max})를 로그변환 하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90%신뢰구간이 log0.8에서 log1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

<아목시실린>

Table with 5 columns: 구분, AUC0-∞hr (ug·hr/mL), Cmax (ug/mL), Tmax (hr), t1/2 (hr)
Rows include 대조약, 시험약, and 90% 신뢰구간* (기준: log0.8~log1.25)

(AUC_{0-∞}, C_{max}, t_{1/2} : 평균값 ± 표준편차, Tmax : 중앙값(범위), n = 58)

AUC_{0-∞} : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적

C_{max} : 최고혈중농도

T_{max} : 최고혈중농도 도달시간

t_{1/2} : 말단 소실 반감기

* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간

<클라불란산>

Table with 5 columns: 구분, AUC0-∞hr (ng·hr/mL), Cmax (ng/mL), Tmax (hr), t1/2 (hr)
Rows include 대조약, 시험약, and 90% 신뢰구간* (기준: log0.8~log1.25)

(AUC_{0-∞}, C_{max}, t_{1/2} : 평균값 ± 표준편차, Tmax : 중앙값(범위), n = 58)

AUC_{0-∞} : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적

C_{max} : 최고혈중농도

T_{max} : 최고혈중농도 도달시간

t_{1/2} : 말단 소실 반감기

* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간

주1. 이 약은 보형제약(주) 아목시실린수화물/묽은클라불란산칼륨정375밀리그램과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전 공정을 보형제약(주)에 위탁 제조하였음.

13. 기타

테오마의 초기파일 여성에 대해 예방의 목적으로 이 약을 투여하는 것이 산생아에게 과다한 소장장애를 발생시키는 증가와 관련이 있다고 추정되는 한 건의 연구 사례가 있다. 만약 다른 약물과 마찬가지로 의사에 의해 필요한 것으로 판단되지 않으면 이 약의 사용은 피해야 한다.

【저장방법 및 사용(유효기간)】 기밀용기(방습포장), 25℃이하 건조한 곳에서 보관, 제조일로부터 24개월

【포장단위】 바이크라정625mg : 40정 /PTP

바이크라정375mg : 100정(10정 /PTPX10)

【제조사】 보형제약(주) 경기도 안산시 단원시 부안로 107,109

【제조외지 및 판매】 (주)비이넥스 부산광역시 사하구 대대로 368-3

* 본 의약품은 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 이 약을 사용하시기 전에 반드시 본 설명서를 읽어주시기 바랍니다.

* 첨부문서의 개정연월일 이후로 변경된 허가사항은 온라인약도서판(http://drug.mfds.go.kr) 혹은 당사 홈페이지(http://www.bi-nex.com)나 전화(080-263-3151)로 문의하시면 확인하실 수 있습니다.

* 부작용 폐해구제 신청 : 한국약약품안전관리원(1644-6223)

http://www.bi-nex.com

☎080-263-3151

바이크라정

개정연월일 : 2017년 09월 28일



[주]바이넥스
부산광역시 사하구 대대로 368-3