



※ 의약품 사용하기 전에 다음 문서를 주의깊게 읽고 반드시 의약품과 함께 보관하세요.



010890942050200

정우궁하탕정 [단미엑스혼합제]

일반의약품 / 분류번호 : 239

【제품명】 정우궁하탕정(단미엑스혼합제)

【성분·함량】 1회용량(2정, 1,120mg)

천궁연조엑스(1.8~2.2→1)X별규X환산한 건조물로서 0.264g 천궁으로서 1.25g)	-----	0.619g
반하연조엑스(1.9~2.4→1)X별규X환산한 건조물로서 0.191g 반하로서 1.25g)	-----	0.588g
복령연조엑스(32.3~40.0→1)X별규X환산한 건조물로서 0.013g 복령으로서 1.25g)	-----	0.034g
진피연조엑스(1.9~2.3→1)X별규X환산한 건조물로서 0.126g 진피로서 0.63g)	-----	0.304g
청피연조엑스(2.0~2.5→1)X별규X환산한 건조물로서 0.123g 청피로서 0.63g)	-----	0.281g
지각연조엑스(1.8~2.2→1)X별규X환산한 건조물로서 0.121g 지각으로서 0.63g)	-----	0.324g
백출연조엑스(2.3~2.8→1)X별규X환산한 건조물로서 0.071g 백출로서 0.31g)	-----	0.121g
감초연조엑스(2.3~2.8→1)X별규X환산한 건조물로서 0.052g 감초로서 0.31g)	-----	0.120g
생강연조엑스(6.1~7.4→1)X별규X환산한 건조물로서 0.029g 생강으로서 0.83g)	-----	0.123g
----- 건조엑스로서 0.989g -----		

*동물유래성분 : 유당수화물/소/우유

*기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 카복시메틸셀룰로오스칼슘, 실리콘디옥사이드, 스테아르산마그네슘, 히드록시프로필셀룰로오스, 폴리에틸렌글리콜6000, 피마자유

【성상】 갈색의 장방형 필름코팅 정제

【효능·효과】 한방건강보충용

【용법·용량】 한방건강보충용

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 염증성 열이 있는 자, 몸에 열이 있는 자, 몸이 허약하여 마른기침을 하는 자.
- 2) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 부작용

- 1) 글리시리진산으로서 1일 최대량 40mg이상을 함유하는 제제는 장기연용(함께 복용(사용)시 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨체액의 저류(고임, 붓임), 부종(부기), 체중증가 등의 알도스테론 유사 증상이 나타날 수 있으므로 주의하여 사용할 것.
- 2) 구갈(목마름), 혀의 구부러짐 등 외부작용이 나타날 수 있음.

3. 적응상의 주의 사항 : 반하와 오두는 배합하지 않는 것이 좋다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것

- 1) 고혈압 환자
- 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움

- 2) 심장에 또는 신장에(신장장애) 환자
- 3) 부종(부기) 환자
- 4) 현저하게 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.)
- 5) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 6) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 7) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 8) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다))
- 9) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

- (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 붓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
- (2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.
- (3) 소화기계 : 식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 구역, 설사 등

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이디드)와 병용(함께 복용(사용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로 신중히 복용할 것.
- 2) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- 3) 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.
- 4) 다른 한약(생약)제제 등과 함께 복용하는 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사포장단위

본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

2017년 05월 29일 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 문의(☎ 02-574-2541)에서 확인할 수 있습니다.



정우신약주식회사

충남 아산시 신창면 서부남로790번길 60

1711-01