

칼리테크 정(칼리디노게나제)

[원료약품 및 분량] 1정 중

- 유효성분 : 칼리디노게나제(JP) 50 I.U.
- 첨가제(동물유래성분) : 무수유당(소, 우유)
- 첨가제(타르색소) : 적색3호, 적색40호
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성산화규소, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스프탈레이트

[성상]

적색의 원형 장용성 필름코팅정

[효능·효과]

- 다음 질환에 의한 말초순환장애: 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
- 갱년기장애, 망맥락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

[용법·용량]

1일 30~150I.U.를 3회 분할하여 경구투여 한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 부작용
 - 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
 - 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
 - 소화기계 : 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - 기타 : 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있다.
- 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

[사용기간] 제조일로부터 24 개월

[포장단위] 30정/병, 300정/병

[제조의뢰자] (주)시어스제약 (070-8822-7755)

충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 22, 3층일부

[제조자] (주)메디카코리아 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 96

[판매자] 에이치엘비제약(주) / 경기도 남양주시 경강로 27

- ※ 올바른 복용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우는 의사·약사와 상담하십시오.
- ※ 본 의약품은 "우수의약품제조관리기준(KGMP)"에 따라 엄격하게 품질관리를 실시한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 제품은 구입한 장소에서 교환하여 드립니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 의약품을 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관합니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 이 설명서 작성(개정)일 이후 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

작성일자 : 2021.02.02(00)