

피부질환 가려움 및 염증 치료제

알레스원정 10mg (에피나스틴염산염)

분류번호 : 01490

전문약품

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정(88.17mg) 중

유효성분 : 에피나스틴염산염(별구) ..... 10.00mg

첨가제(동물유래성분) : 스테아르산마그네슘(기원동물:소(사용부위:우지), 돼지(사용부위:돈지)), 유당수화물(기원동물:소 (사용부위 :우유))

기타 첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 카르나우바납, 크로스포비돈, 탈크, 폴리메틸렌글리콜6000, 히프르멜로스

[성상] 이 약은 백색 또는 미황색의 원형 필름코팅정이다.

[효능·효과]

- 기관지천식
- 알레르기비염
- 두드러기, 습진·피부염, 피부가려움, 가려움발진(痒疹), 가려움을 동반한 보통건선

[용법·용량]

- 천식, 두드러기, 습진·피부염, 피부가려움, 가려움발진(痒疹), 가려움을 동반한 보통건선  
성인 : 에피나스틴염산염으로서 1일 1회 20 mg을 경구 투여한다. 증상에 따라 적절히 증감한다.
- 알레르기비염  
성인 : 이 약으로서 1일 1회 10~20 mg을 경구 투여한다. 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

간질환 환자 또는 간질환의 병력이 있는 환자(간질환이 악화되거나 재연될 수 있다.)

3. 이상반응

- 과민반응 : 알레르기 반응(예, 발진, 두드러기, 발적), 가려움, 부종(얼굴, 수족 등), 가려움을 동반한 홍반이 나타나는 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 정신신경계 : 때때로 졸음, 권태감, 두통, 드물게 어지러움, 불면, 악몽, 마비감, 머리가 멍한 상태 등이 나타날 수 있다.
- 소화기계 : 때때로 구역, 위부불쾌감, 구갈, 복통 드물게 식욕부진, 구토, 위증감, 위제감, 설사, 변비, 구순건조감, 복부팽만감, 구내염 등이 나타날 수 있다.
- 간장 : AST, ALT,  $\gamma$ -GTP, ALP, LDH의 상승의 간기능장애, 황달 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상반응이 나타난 경우 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다. 간염 및 기존에 간손상이 있던 환자에서의 증상악화가 산발적으로 보고되었다.
- 신장 : 드물게 단백뇨가 나타날 수 있다.
- 비뇨기계 : 드물게 빈뇨, 혈뇨 등의 방광염양 증상, 요저류가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상반응이 나타난 경우 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
- 순환기계 : 때때로 심계항진이 나타날 수 있다.
- 호흡기계 : 드물게 호흡곤란, 거담곤란, 코막힘이 나타날 수 있다.
- 혈액계 : 빈도불명의 혈소판 감소, 드물게 백혈구 증가가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상반응이 나타난 경우 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
- 빈도불명의 여성형 유방, 유방종대, 드물게 월경이상, 화끈거림, 쓴맛, 미각저하, 가슴통증 등이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 이 약은 기관지 확장제, 스테로이드제 등과는 달리, 천식 발작의 증상을 신속히 경감시키는 약제가 아니므로 이런 환자에게는 충분한 설명을 해 줄 필요가 있다.
- 장기 스테로이드제 요법을 받고 있는 환자에서 이 약 투여에 의해 스테로이드제를 감량하게 되는 경우, 충분한 관리 하에 서서히 행한다.
- 운전능력에 대한 임상시험 결과, 이 약이 운전능력에 영향을 미치지는 않았다. 그럼에도 불구하고 약은 졸음을 초래할 수 있으므로 환자들에게 기게 조작 시나 자동차 운전시 주의하도록 권고해야 한다.
- 이 약의 사용에 의해 효과가 확인되지 않은 경우에는 장기투여하지 않도록 주의한다.
- 계절성 환자에게 투여하는 경우에는 호발계절을 고려하여 그 직전에서부터 투약을 시행하여 호발계절이 종료될 때까지 연속투여하는 것이 바람직하다.

5. 상호작용

- 전임상결과에 비추어 볼 때, 이 약이 수면제, 항히스타민제 또는 알코올의 진정작용을 강화시키지는 않을 것으로 보인다. 그러나 이러한 약물과 병용투여한 임상적 경험은 없다.
- 진정효과가 없는 다른 항히스타민제들과는 달리 이 약은 주로 비대사체로 배설된다. 이 약은 CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 와 상호작용을 전혀 하지 않거나 거의 하지 않는다. 따라서 CYP-450에 의존하여 배설되는 다른 약물들의 대사에 영향을 미치지 않을 것으로 기대된다.

☞ 뒷면으로 계속

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 임신 중의 투여에 관한 안전성은 확립되지 않았으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에 한하여 투여한다(임신전 또는 임신초기시험(랫트)에서는 수태율의 저하가 있었고, 기관형성기시험(토끼)에서는 태자치사작용은 모두 고용량에서 확인되었다.).
- 동물실험(랫트)에서 모유중으로 이행한다는 보고가 있으므로 수유중인 여성에게는 투여를 피하고 부득이하게 투여해야 하는 경우에는 수유를 중지한다.

7. 소아에 대한 투여

저체중아, 신생아, 영·유아 및 소아에 대한 안전성은 확립되지 않았다(사용경험이 적다.).

8. 고령자에 대한 투여

고령자에서는 간, 신기능이 저하된 경우가 많고 흡수된 이 약은 주로 신장에서 배설되므로 정기적으로 이상반응, 임상증상(발진, 구갈, 위부 불쾌감 등)의 관찰을 충분히 하고 이상반응이 나타난 경우 감량(10 mg/일) 또는 휴약하는 등의 적절한 처치를 한다.

9. 과량투여시의 처치

- 증상 : 이 약의 과량투여한 경험은 부족하다. 다른 H1-길항제와 마찬가지로 과량투여시 QT간격을 연장시킬 가능성을 배제할 수 없으며 따라서 잠재적으로 부정맥을 일으킬 수 있다. 이러한 증상이 이 약과 관련하여 보고된 적은 없지만 과량투여시 ECG를 모니터링 해야 한다.
- 처치 : 위세척 및/또는 배뇨를 유도한다. 대증치료를 실시한다.

10. 보관 및 취급상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

11. 기타

공복시 투여하는 경우에 식후투여보다 혈중농도가 높아진다는 보고가 있다(기관지천식 및 알레르기비염에 대해서는 취침전 투여, 두드러기, 습진, 피부염, 피부가려움, 가려움발진(痒疹), 가려움을 동반한 보통건선에 대해서는 식후 투여에서 유효성 및 안전성이 확인되었다.).

12. 의약품동등성시험 정보

시험약 에피나스틴염산염정 10mg(제일약품㈜)주1과 대조약 알레지온정10밀리그람(한국베림거인겔하임㈜)을 2×2 교차시험으로 각 2정씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 28명의 혈중 에피나스틴을 측정한 결과, 비교평가항목치(AUC<sub>t</sub>, C<sub>max</sub>)를 로그변환하여 통계처리 하였을 때, 평균치 차의 90%신뢰구간이 log 0.8 에서 log 1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

| 구분        | 비교평가항목                             |                             | 참고평가항목                |                       |           |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
|           | AUC <sub>0~24hr</sub> (ng · hr/mL) | C <sub>max</sub><br>(ng/mL) | T <sub>max</sub> (hr) | t <sub>1/2</sub> (hr) |           |
| 대조약       | 알레지온정10밀리그램<br>(한국베림거인겔하임㈜)        | 216,2±57.8                  | 24,55±7.13            | 3,00 (0,67~4,00)      | 7,68±1,22 |
| 시험약       | 에피나스틴염산염정 10mg<br>(제일약품㈜)          | 224,8±50.3                  | 26,34±6.92            | 2,00 (0,67~4,00)      | 7,38±1,52 |
| 90% 신뢰구간* | log 0.9862 ~ 1.1238                | log 0.9920 ~ 1.1850         | -                     | -                     |           |

(기준 : log 0.8 ~ log 1.25)

(AUC<sub>t</sub>, C<sub>max</sub>, t<sub>1/2</sub> ; 평균값 ± 표준편차, T<sub>max</sub> ; 중앙값(범위), n = 28)

AUC<sub>t</sub> : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적

C<sub>max</sub> : 최고혈중농도

T<sub>max</sub> : 최고혈중농도 도달시간

t<sub>1/2</sub> : 말단 소실 반감기

\* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간

주1) 이 약(10mg)은 제일약품(주) 에피나스틴염산염정 10mg과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전 공정을 제일약품(주)에 위탁 제조하였음. 끝.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 30정/병, 100정/병

[사용기간] 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 의약품을 구입하였을때는 구입처를 통하여 교환해드립니다.

※ 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품도서관 의약품검색의 정보를 참조하세요. (<http://drug.mfds.go.kr>)

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하여야 합니다.

DWG DATE 171120  
제품의 사용기한은 외부라벨 표기.  
DWG DATE와 사용기한은 무관합니다.

제조사  
제일약품(주)  
경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 7

제조의뢰자  
(주)디에이치피코리아  
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50

판매자  
(주)에스지메디언스  
부산광역시 사상구 학갈대로 238-32 4층(감전동)  
소비자상담번호 : 051-312-8848