

일반의약품 분류번호:233

복합소화효소제

나스타제정



【원료약품분량】 1정 중

- 유효성분: 디아스타제-프로테아제-셀룰라제2000IV(KP)~20mg(전분당화력(pH4.5) 278단위이상, 전분호정화력(pH4.5)640단위이상, 단백소화력(pH3.0)170단위이상, 섬유소당화력(pH4.5)2단위이상), 리파제III(KP)~20mg(지방소화력(pH6.0)120단위), 우르소데옥시콜산(KP)~10mg, 시메티론(KP)~30mg
- 첨가제(타르색소): 청색1호, 황색4호
- 첨가제(동물유래): 무수유당(동물기원: 소, 사용부위: 우유)
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 클로리드성아산화 규소, 크로스카르멜로오스나트륨, 톨크, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프록셀로오스

【성상】 녹색의 장방형 필름코팅정제

【효능·효과】

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 식체(체함)(위체), 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

【용법·용량】 성인 1회 1~2정, 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 만 7세 이하의 어린이
 - 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - 4) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.
- 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.상당시 이 첨부문서를 소지할 것.
2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제초일로부터 24개월

【포장단위】 100정, 1000정

【제조자】 (주)씨트리 / 경기도 남양주시 경강로 27

【제조외지사】 (주)한국파마 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 87

- ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 검색란을 참고하세요.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처(이지드럭 → 보고마당 → 안전성정보 → 의약품유해사례 보고)에 알리도록 합니다.
- ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나, 변질·변패 또는 오소된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품은 정부에서 고시한 소비자 피해보상규정에 의거 정당한 소비자의 피해에 대해 보상해 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.koreapharma.co.kr) 또는 ☎ 02-558-1277에서 확인할 수 있습니다.

건강한 미래 아름다운 동행

KP 한국파마
KOREA PHARMA
www.koreapharma.co.kr
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 87

제품문의처 02)558-1277(마케팅)
최종개정년월일 2017.10.31
NST-1701

4200001