

138 x 175 글자 제품명 28, 11pt , 표지 제품명 11, 8pt , 일반의약품 7pt, 유효성분 7pt, 내용 7pt, 제조자 7pt, 글간격 (0.5pt 이상), 최종검토일자(2025.05.14)

일반의약품
징코필정 80mg
80밀리그램 (은행엽건조엑스)

일반의약품

징코필정[®]

80밀리그램 (은행엽건조엑스)

【원료약품 및 그 분량 : 1정 중】

- 유효성분 : 은행엽건조엑스(EP) 80mg
- 첨가제(타르색소) : 적색 40호, 청색 1호, 황색 203호
- 첨가제(동물유래성분) : 유당(젖당)수화물(소-우유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이EZ클리어(253U190007), 오파드라이Q(녹색 (321A610008), 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 크로스포비돈

【성 상】

녹색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

- 1) 말초동맥순환장애(간헐성파행증(이따금 절뚝거림))의 치료
- 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
- 3) 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애의 치료

【용법·용량】

- 성인
- 1) 말초동맥순환장애, 어지러움, 이명(귀울림) : 은행엽건조엑스로서 1회 40mg 1일 3회 또는 1회 80mg 1일 2회 경구 투여한다.(먹는다, 복용한다.)
- 2) 기질성 뇌기능장애 : 은행엽건조엑스로서 1회 40~80mg 1일 3회 또는 1회 120mg 1일 2회 경구투여한다.(먹는다, 복용한다.)

○연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것
 - 1) 이 약에 과민증 환자
 - 2) 12세 이하의 소아(소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.)
 - 3) 임부 (동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.)
 - 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제(예: 펜프로쿠몬, 와파린)), 항혈소판제 (예:클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제))을 복용하고 있는 환자
- 2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중단하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것, 상담시 가능한 첨부문서를 소지할 것

- 1) 수술이 예정된 자
- 2) 복용 3개월 후 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우
- 3) 이상반응
 - ① 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
 - ② 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 어지러움
 - 가려움증
 - ③ 기타 : 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로써 해당성분과 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

4. 기타 이약의 복용(사용)시 주의할 사항

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭닫아, 단단히 마개로 막아) 보관한다.

【포장단위】 30정/병, 300정/병

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.
※ 사용(유효)기한이 경과되었거나, 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하셨을 때는 구입한 곳을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통해 확인하실 수 있습니다.
※ 의약품 부작용 발생 시 한국약품안전관리원(1644-6223) 또는 의약품 피해구제 전용번호(14-3330)를 통해 부작용 피해구제를 신청하실 수 있습니다.

개정연월일 : 2025년 05월 14일

제 조 자

 **풍림무약주식회사**

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 120