

엘씨비탐미

MULTI ACTIVE VITAMIN [정]

美

기미, 잡티 개선+피로 회복

【원료약품 및 그 분량】1정 중

유효성분 :

아스코르브산(KP) 500mg

L-시스테인(JP) 60mg

유비데카렌(KP) 5mg

기타 첨가제 : 콜로이드성아산화규소, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스,
 히드록시프로필셀룰로오스, 크로스카르멜로오스나트륨, 스테아르산마그네슘,
 히프로멜로오스, 에틸셀룰로오스, 폴리에틸렌글리콜6000, 산화티탄, 적색산화철,
 바나나향 AG-F-0583, 카르나우바납

【성상】

분홍색의 장방형 필름코팅정제

【효능·효과】

▶ 다음 경우의 비타민 C의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

*햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화 *잇몸출혈·비출혈(코피) 예방

【용법·용량】

만 12세 이상 청소년 및 성인 : 1회 1정을 1일 2회 복용

【사용상의 주의사항】

1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

(1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

(2) 만 3개월 미만의 젖먹이

2) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

(1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

(2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살염이 배설되는 상태)

(3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

(4) 동풍환자 또는 신장결석이 있는 환자

3) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

구역, 구토, 설사

(2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.

(3) 우발적으로 과량복용 한 경우

(4) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.

(2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.

5) 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.

(3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】기밀용기, 실온(1~30℃)보관

*장제를 개봉 후에는 뚜껑을 꼭 닫아주십시오. (본 제품은 습기가 많은 곳에서는 보관 중 인습(흡습)되어 변색될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.)

【포장단위】60정/병

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)
 →「의약품 검색」을 참조하시기 바랍니다.※ 최신의 정보 확인 방법 : 이 첨부문서 작성일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.guju.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나
 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 대표전화 : (02)2672-1122 ※제품문의: 080-655-1414

※ 제조자: 구주제약(주) 경기도 화성시 정남면 덕절제길 5

설명서 문안 최종개정년월일 : 2017. 10. 27

(I-1701)