

1일 1회 투여 세뎡계 항생제

일성세프트리악손주 500mg

(세프트리악손나트륨수화물)

■원료약품 및 분량: 1바이알 중

- 유효성분: 세프트리악손나트륨수화물(KP) ··· 500mg(약가)

■성상·색상·열은 황색의 결정성가루가 충전된 바이알제

■효능 효과

○ 주요효과

황색포도구균(메니실라나계 생성균 포함), 피피도구균, 폐렴연쇄구균, 스트렙토кок스 피오제네스(그룹A 베타용혈성), 스트렙토кок스 아갈락티에(그룹B), 스트렙토кок스 비리단스, 연쇄구균, 에로모나스, 알칼리게네스, 모락셀라 카타릴리스, 시트로박테리, 엔테로벡터(일부군주나선), 대장균, 연쇄상구균, 인플루엔자균(인피실린 내성균 포함), 파라인플루엔자균, 클레브시엘라(폐렴균 등), 모락셀라, 모르가넬라 모르가니, 프로테우스 불가리스, 프로비덴시아, 안균(메니실라나계 생성균 포함), 수막염균, 클레지오나스 시겔로이디즈, 녹농균(일부 군주 내성), 살모넬라(장티푸스균 포함), 세라티아(영균포함), 시겔라, 예르시니아(예르시니아 엔테로콜리타 포함), 바κτη로이디스(바크로이디즈 프리라지스 일부군주 포함), 클로스트리듐(클로스트리듐 디피테리제), 푸소박테리움(푸소박테리움 모르티페룸, 푸소박테리움 바움 제이), 펠도구균, 펠도넙색구균

○ 작용중

- 폐렴, 기관지염 등 호흡기계 감염증 ··· 비인후과 감염증 ··· 신장 및 요로감염증, 인질 등 생식기 감염증 ··· 폐혈종 ··· 수술 전 · 후 감염예방
- 골 및 관절 감염증 ··· 피부, 상처 및 연조직감염증 ··· 복막염, 담낭염, 담관염 등 위장관감염증 ··· 면역기능저하 환자의 감염증 ··· 수막염

■용법 · 용량

- 성인 및 12세 이상 소아: 세프트리악손으로서 1일 1회 1~2g(약가)을 정맥 또는 근육주사한다.
중증질환 또는 중증도의 감수성을 나타내는 병원균에 의한 감염증에는 1일 1회 4g(약가)까지 정맥할 수 있다.
- 신생아: 신생아생후 14일 이내의 경우 체중 20g 20~50mg(약가)을 1일 1회 투여하며 체중 20g 50mg(약가)을 초과하지 않는다.
미숙아와 정상아를 구분하여 투여할 필요는 없다.
- 신생 · 유아 및 소아생후 15일~12세: 체중 25g 20~80mg(약가)을 1일 1회 투여한다. 50Kg 이상인 소아에는 성인의 상용량을 투여하여야 하며, 체중 50kg 50mg(약가)이상을 정맥투여하는는 최소 30분 동안 점적 정맥주사한다.
- 고령자·성인의 용법 · 용량: 용량 변경시킬 필요 없이 그대로 따른다.
- 수막염, 유아 및 소아의 세균성 수막염의 경우 초기용량은 체중 25g 100mg(약가)을 1일 1회 투여한다[1일 총 4g(약가)을 초과하지 않는다].
병원균 및 그에 따른 감수성이 밝혀지는 즉시 그에 따라서 용량을 줄일 수 있다. 다음 치료기간이 효과적인 것으로 밝혀졌다.
· 수막염균: 4일 · 인플루엔자균: 6일 · 폐렴연쇄구균: 7일
- 임질: 메니실린 감수성균 및 내성균에 의한 임질치료 시에는 250mg(약가) 단위 근육주사가 권장된다.
- 수술 전 · 후 감염증예방: 오염되었거나 오염될 수 있는 외과수술 시 수술 감염을 방지하기 위해 감염 위험도에 따라서 1~2g(약가)을 수술 30~90분 전까지 투여하는 것이 바람직하다. 골장직장수술 시 이 약과 5-니트로이미다졸(예: 오르니다졸)을 각각 별도로 동시에 투여하는 것이 효과적이다.
- 신장 및 간기능 장애: 신기능장애 환자에서 간기능이 정상인 경우라도 용량을 감소시킬 필요가 없으나 크레아티닌청소율이 10mL/min 이하인 신부전증의 경우 1일 2g(약가)을 초과하지 않는다.
간장 및 황의 경우 신기능이 정상인 경우라도 용량을 감소시킬 필요가 없다. 중증 신장 및 간부전증에 있는 경우에는 정기적으로 이 약의 혈중농도를 측정해야 한다. 투석환자의 경우 투석 후 추가투여는 필요 없으나, 투석환자의 배설속도가 감소될 수 있으므로 용량조절이 필요 여부를 결정하기 위해 혈중농도를 측정하여야 한다.

<치료기간>

치료기간은 질병 치유상태에 따라 다르며 대체로 다른 항생물질 투여 시와 마찬가지로 배설이 소실되었거나 병원균 군집이 확인된 후에도 최소한 40~72시간을 더 투여해야 한다.

<이 약의 조제법>

1. 근육주사

이 약 0.25g 및 0.5g은 각각 1% 염산리도인양액 1.2mL에 1g은 1% 염산리도인양액 3.5mL에 녹여 등부에 근육이 주사한다. 한쪽 등부에 1g이상 투여하지 않는 것이 좋으며 리도인양액에 녹이지 않고 근육주사하면 통증이 나타난다. 다만, 리도카인 용액은 절대 정맥주사해서는 안 된다.

2. 정맥주사

이 약 0.25g 및 0.5g을 각각 주사용수 2.5mL, 5mL, 1g을 주사용수 10mL에 녹여 2~4분간 천천히 정맥주사한다. 정적 정맥주사는 30분 이상 지속해야 한다. 이 약 2g을 약 40mL의 칼륨을 함유하지 않은 다음 용액을 종의 한 가지에 녹인다: 살리나염주사액, 0.45% 염화나트륨주사액과 2.5% 포도당 주사액과 혼합액, 5% 포도당 주사액, 10% 포도당 주사액, 6% 덱스트란용액을 함유한 5% 포도당 주사액, 6~10% 히드록시메틸셀룰로스용액은 주사용수 등 이 약액 배합공기가 가능하므로 다른 환근 물질이 함유된 용액에는 살기용액 이외의 희석용액과 혼합하지 않는다.

■사용상의 주의사항

- 경고1) 이 약을 칼슘함유용액 또는 약물과 혼합해서는 안되며, 각각 분리된 주입구일지라도 동시에 투여해서는 안된다.2) 이 약을 투여한 후 48시간 이내에 칼슘함유용액 또는 약물을 투여해서는 안된다.3) 수액제 및 칼슘함유용액의 정맥투여가 요구되는(예생아)는 신생아(<28일)에 세프트리악손 칼슘 침전 위험이 있으므로, 이 약을 투여해서는 안 된다.4) 이 약과 칼슘함유용액을 투여 받은 신생아 또는 미숙아의 폐와 신장에 침전물체에 의한 치명적인 결과가 몇몇 사례에서 보고되었다. 이 중 일부의 경우 이 약과 칼슘 함유 용액을 동일한 정맥주입구로 투여한 경우였으며, 일부 정맥 주입구에서 침전물이 관찰되었다. 이 약을 칼슘함유용액의 주입구 및 필터시스템과 다르게 투여한 1명의 신생아에서 최소 1건의 치명적인 결과가 보고되었다; 이 경우 신생아 부검 시 침전물질은 관찰되지 않았다. 신생아 이외의 환자에서는 유사한 보고가 없었다(6. 상호작용 및 11. 적용상의 주의 항목 참조).

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 이 약 또는 그 부형제에 과민반응이 있는 환자
- 세팔로스포린계 항생물질에 과민반응 환자
- 폐나 혈관계 항생물질에 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자
- 리도카인 등의 아밀로이드계 국소마취제에 과민반응 환자(근육주사에 한함)
- 리도카인을 함유한 이 약을 정맥으로 투여해서는 안된다.
- 미숙아: 이 약은 미숙아의 경우 정맥 후 연경 41주 미체(체기간+출생주수)까지 금기이다.
- 항혈전이 있거나 자발부위혈종, 산종이 있는 신생아 또는 미숙아의 폐와 신장에 침전물체에 의한 치명적인 결과가 몇몇 사례에서 보고되었다. 이 중 일부의 경우 이 약과 칼슘 함유 용액을 동일한 정맥주입구로 투여한 경우였으며, 일부 정맥 주입구에서 침전물이 관찰되었다. 이 약을 칼슘함유용액의 주입구 및 필터시스템과 다르게 투여한 1명의 신생아에서 최소 1건의 치명적인 결과가 보고되었다; 이 경우 신생아 부검 시 침전물질은 관찰되지 않았다. 신생아 이외의 환자에서는 유사한 보고가 없었다(6. 상호작용 및 11. 적용상의 주의 항목 참조).
- 칼슘 함유 용액 또는 약물을 투여 받고 있는 신생아(세프트리악손 칼슘염 침전 발생의 위험이 있다.)

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 이 약 또는 세뎡계 항생물질에 과민반응의 병력이 있는 환자에는 투여하지 않는 것을 원칙으로 하되 부득이 투여할 경우에는 신중히 투여한다.
- 약물 알레르기 병력이 있는 환자
- 본인 또는 부모 형제가 기관지천식, 발진, 두드러기 등의 알레르기증상을 일으키기 쉬운 체질인 환자
- 중증도의 신장애 환자(혈중농도가 장시간 지속되므로 투여량을 감소하거나 투여간격을 두고 투여한다.)
- 경구섭취가 용이하지 않은 환자 또는 비경구영양 환자, 고령자, 전신상태가 나쁜 환자(비타민 K 결핍증상이 나타날 수 있으므로 프로트롬빈 시간을 측정하거나 필요하면 비타민 K를 투여해야 한다.)

4. 이상반응

이 약에서 가장 흔하게 보고된 이상반응은 호산구증가증, 백혈구감소증, 혈소판감소증, 설사, 발진, 간효소 증가이다. 임상시험의 결과로 이 약의 이상반응의 빈도가 결정되었다. 매우 흔하게(>1/10), 흔하게(>1/10, <1/10), 흔하지 않게(> 1/1,000, <1/100), 드물게(>1/10,000, <1/1,000), 매우 드물게(<1/10,000)로 빈도를 분류하였다.

표 1. 이상반응표

신체기관	흔하게	흔하지 않게	드물게
감염 및 침습		생식기진균감염	위막성대장염
혈액 및 림프계 이상	호산구증가증, 백혈구감소증, 혈소판감소증	과립구감소증, 빈혈, 고농병	
신경계 이상		두통, 어지러움	
호흡기계, 흉부, 종격 이상			기관지천막
위장관계 이상	설사, 묽은변	오심, 구토	
간담도계 이상	간효소증가		
피부 및 피하조직 이상	발진	가려움증	두드러기
신장 및 비뇨기계 이상			혈뇨, 당뇨
전신 이상 및 투여부위 상태		정맥염, 주사부위통증, 발열	부종, 오한
조사(investigation)		혈중크레아티닌 증가	

- 1) 속: 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 충분히 관찰하고 불쾌감, 구내이상감, 천명, 어지러움, 변의, 이명, 발한 등의 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 2) 과민반응: 발진, 두드러기, 홍반, 발적, 가려움, 오한, 발열, 알레르기성 피부반응, 부종, 다형성홍반, 아나필락시스 또는 아나필락시양 반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 3) 소화기계: 드물게 위막성대장염 등의 혈변을 수반하는 중증의 대장염이 나타날 수 있다. 복통, 빈번한 설사가 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다. 또한 때때로 구역, 구토, 묽은 변, 설사, 마그네슘 드물게 부종, 식욕부진, 복부팽만감, 소화불량 등이 나타날 수 있다. 이와 예 해장염의 발병이 드물게 나타날 수 있는데, 이들 환자 대부분은 담즙정체나, 담즙찌꺼기를 유발할 수 있는 위염인자(예: 중증의 질병, 비경구적영양 등)를 가지고 있었다.

- 4) 호흡기계: 다른 세뎡계 항생물질 투여 시 드물게 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X선 이상, 호산구 증가 등을 수반하는 간질성 폐렴, 호산구증 폐렴 등 이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 코르티코이드 투여 등 적절한 처치를 한다.
- 5) 혈액계: 호산구 증가, 혈소판 증가, 백혈구 감소, 무립구증 드물게 빈혈, 용혈성 빈혈, 과립구 감소, 림프구 감소, 혈소판 감소, 프로트롬빈 시간의 연장, 혈청병 등이 나타날 수 있다.
- 6) 중추신경계: 때때로 두통, 어지러움 드물게 좌하운동불능, 감각이상 이 발생할 수 있다.
- 7) 피부: 드물게 중증의 피부 이상반응으로 다형성 홍반, 스티븐스 · 존슨증후군, 독성피피과사용해가 나타날 수 있다.
- 8) 간장: 때때로 AST, ALT, ALP의 상승, 담낭 중의 세프트리악손 칼슘염 침전으로 인한 증상, 드물게 빌리루빈, y-GTP의 상승 이 나타날 수 있다.
- 9) 신장: 드물게 급성 비부전 등의 증상의 신장애가 나타나는 보고가 있으므로 정기적으로 감사를 실시하는 등 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 또한 당뇨, 혈뇨, 빈뇨(빈뇨)가 생길 수 있다. 요소에서 이 약의 침전이 보고되었으며, 대개 고용량(예, 80mg/kg/day) 또는 총 용량 10g 초과)으로 치료된 소아와 다른 위염요인(예, 탈수 또는 누워서만 생활하는 등)을 가지고 있는 환자에서 보고되었다. 이 침전은 무증후상이거나 증후상이 있을 있으며 요도배설이나 신수상 급성신부전으로 이어질 수도 있으나 투여를 중지하면 회복된다.
- 10) 군교대증: 드물게 구내염, 칸디다증이 나타날 수 있다.
- 11) 비타민결핍증: 드물게 비타민 K 결핍증상(자프로트롬빈혈증, 출혈경향 등), 비타민B군 결핍증상(설염, 구내염, 식욕부진, 신경병 등)이 나타날 수 있다.
- 12) 기타: 부종, 심상성 기와수종, 혈중 크레아티닌치의 상승, 생식기의 진균증, 발한, 홍조, 삼개항진, 코피 등이 나타날 수 있다.
- 13) 국내 유해사례 보고자료(1989~2010년)를 검토 분석한 결과 다른 의약품에서 발생한 유해사례 보다 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해사례는 다음과 같다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 유해사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

· 위장관계: 클로스트리듐 디피실리시스 · 심혈관계: 저혈압

14) 이 약의 시판 후 사용 중 다음과 같은 이상반응이 확인되었다. 이 반응들은 불확실한 크기의 모집단에서 보고되었으며 이상반응의 빈도를 확립하거나 이 약과의 연관성을 확인하는 것이 항상 가능하지 않다.

- 위장관계 증상: 해장병, 구내염, 설염 ··· 혈액학적 변화- 무립구증(<500/mm³) 이 10일 이상 치료 후 총 투여용량 이 20g일 때 보고되었다.
- 피부반응: 급성전신발진농포증(AGEP)과 중증피부이상반응(다형성홍반, 스티븐스 · 존슨증후군 또는 Lyell증후군/독성피피과사용해)가 보고되었다.
- 신장기능 이상: 경련 ··· 감염 및 침습: 군교대증 · 기타 드문 이상반응: 담낭내 세프트리악손칼슘염 증후성침전, 핵황달, 핏뇨, 아나필락시스 및 아나필락시스양 반응.

5. 임상적 주의

- 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료에 필요한 최소기간만 투여해야 한다.
- 속도의 반응을 예측하기 위해 충분히 모니터링하고 사전에 피부반응 시험을 실시하는 것이 바람직하다.
- 속발성에 대하여 구입처(지나)에 필릭시성 속 발생 시 우선 에피네프린을 정맥주사한 후 글루코르티코이드를 주사한다) 준비를 해두어 투여 후에도 환자를 안정한 상태에서 충분히 관찰한다.
- 투여 중 정기적으로 임상징상(간기능, 신기능, 혈액 등)을 실시하는 것이 바람직하다.
- 이 약을 투여 하려면 1g이상 투여받은 환자에서 담낭의 초음파 검사 시 세프트리악손칼슘염침전에 관찰되었다. 이러한 침전물은 소아환자에서 나타날 가능성이 높다. 이 약 투여 중지 후 침전물은 사라지고 증상이 거의 없다. 증상을 수반하는 경우 비조작인 비 수술요법이 권장되지만 환자의 위약성·위험성 평가를 근거로 한 의사의 판단에 따라 투여중단 여부를 결정한다.
- 과립구에서 시 혈액특성 또는 발발투여에 의해 약의 농도가 감소되지 않는다. 투명한 혈액체는 없고 대조요법을 실시해야 한다.
- 이 약으로 치료 시 운전이나 기계작동 능력에 영향을 끼칠 수 있는 바람직하지 않은 효과(예, 항기동)등이 발생할 수 있으므로, 운전 또는 기계작동 시 주의하여야 한다.
- 이 약을 투여하면 환자에서 담도내에 유발가능성이 있는 핵장염이 드물게 보고되었다. 대부분 신형 주사방법, 중증 질환, 완전 비경구영양법(TPN) 등 담즙 정체, 담즙 슬러지(sludge) 생성 위험이 있는 환자였다. 이 약이 담즙 침전 유발인자 및 보조인자로 작용한다는 점을 배제할 수 있다.
- 이 약의 권장 용법·용량 범위 내에서 신생아, 유아 및 소아환자에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있으며, 이 약은 다른 세팔로스포린계 약물과 마찬가지로 혈청 일부면으로부터 빌리루빈을 치환시킬 수 있다.
- 이 약은 빌리루빈 농증종의 위험이 있는 신생아(특히 미숙아)에 사용해서는 안 된다.
- 모든 배터락탐계 항생제와 같이 중대하고 가끔 치명적 과민반응이 보고 되었다. 중증 과민반응의 경우, 이 약의 치료는 즉시 중단되어야 하며 적절한 응급처치가 시작되어야 한다. 치료 시작 전에 환자가 이 약 또는 다른 세팔로스포린계제, 다른 개질된 배터락탐계 항생제에 과민반응력이 있는지를 확인해야 한다. 다른 배터락탐계 항생제에 과민반응력이 있는 환자를 치료할 때 주의를 기울여야 한다.
- 이 약을 포함한 세팔로스포린계 항생제를 투여 받은 환자에서 면역 매개성 용혈성 빈혈이 보고되었다. 성인 및 소아의 치료기간 중에 중증 용혈성 빈혈이 보고되었으며, 일부는 치명적이었다. 이 약 치료기간 중 빈혈이 발생한 경우에는 세팔로스포린계 면역 반응을 고려해야 하며, 원인이 밝혀질 때까지 이 약의 투여를 중단해야 한다.
- 이 약을 포함한 기타 모든 항생제에서 Clostridium difficile 관련 설사(CDAD)가 보고되었으며, 그 정도는 경미한 설사에서부터 치명적인 대장염에 이르기까지 다양했다. 항생제 치료는 결장의 정상세균총을 변화시켜 Clostridium difficile의 과도한 증식을 일으킨다. Clostridium difficile은 CDAD를 유발할 수 있는 A독소 및 B독소를 발생시킨다. 이러한 감염은 항균치료에 불응하거나 잘 치료할 필요가 있으므로, Clostridium difficile 군주에 의해 과생성된 독소는 이환을 및 사망률을 증가시킨다. 항생제 투여 후 설사가 나타난 모든 환자는 CDAD를 의심해야 한다. CDAD는 항생제 투여 후 2개월 이상 지난 이후에도 보고되었으므로, 환자의 병력을 주의 깊게 확인해야 한다. CDAD가 의심되거나 확인된 경우에는 Clostridium difficile에 직접적으로 작용하지 않는 항생제는 투여를 중단해야 한다. 임상적 증상에 따라 적절한 수분 및 전해질 관리, 단백질 보충, Clostridium difficile에 대한 항생제 치료, 수술적 행위를 고려해야 한다.

6. 상호작용

- 유사작용물(다른 세뎡계 항생물질)과 푸로세미드 등의 이뇨제와 병용투여 시 신장애가 증가될 수 있으므로 신중히 투여한다.
- 아미노글리코사이드계 항생물질과 병용투여에 대한 그림용상관과의 실험 연구결과 상가 또는 상승작용이 나타나므로 이 사실은 녹농균과 같은 병원균에 의한 중증 또는 생명을 위협하는 감염증에서 특히 중요하다. 이들 두 약물은 배합공기미으로 권장량 범위 내에서 따로 투여하여야 한다. 세팔로스포린과 함께 투여시, 아미노글리코사이드계 항생제에 의한 신장독성이 잠재적으로 증가하는데 더하여서는 상반된 증가가 있다. 임상적용시 아미노글리코사이드 수준과 신기능을 충분히 모니터링하는 것이 중요하다.
- 프로베나이드는 이 약의 배설에 영향을 미치지 않는다.
- 이 약은 일부 다른 세팔로스포린계 항생물질과 투여 시 나타나는 에텐올에 대한 불내성 및 출혈과 관계되는 N-메틸티오테트라졸기를 갖고 있지 않아 알콜과 병용투여 시 시드피럼 유사효과는 나타나지 않았다.
- 시험관내 시험에서 콜로이드·콜 및 세프트리악손의 병용투여 시 길항효과가 관찰되었다.
- 경구제는 이 약의 살균효과를 약화시킬 수 있다.
- 칼슘과의 상호작용: 성인 혈장 및 신생아 제제혈장을 이용한 *in vitro* 시험에서, 세프트리악손과 칼슘의 상호작용을 평가하였다. 최대 1mM 농도의 세프트리악손(*in vivo* 시험에서 세프트리악손 2g을 30분간 주입 시 도달하는 혈중 농도를 초과하는 수치)을 최대 12mM(48mg/dL) 농도의 칼슘과 혼합하였다. 칼슘 농도 6mM(24mg/dL) 이상 성인 혈장과 4mM(16mg/dL) 이상 신생아 혈장에서 세프트리악손의 회수율이 감소하였다. 이러한 현상은 세프트리악손-칼슘 침전제에 기인한 것으로 보이며, 신생아는 세프트리악손 칼슘 침전의 위험이 더 높을 것으로 생각된다(1. 경고 및 11. 적용상의 주의 항목 참조).
- 이 약과 비타민 K 길항제 병용 시 출혈 위험이 증가할 수 있다. 응고 인자를 자주 모니터링해야 하며, 이 약 치료 도중 및 치료 후 응고인자의 용량을 적절히 조절해야 한다.
- 이 약과 알카리성, 락타마시, 플루카노졸을 정맥 투여시 화학적 배합공기가 관찰되었다.

7. 임부 및 수유에 대한 투여

- 이 약은 태반관통을 통과한다.
- 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료 상의 위약성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 모유로의 이행이 보고되어 있으므로 수유부에는 신중히 투여한다.

8. 소아에 대한 투여

- 신생아 및 미숙아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.
- 연구에 의하면 이 약은 다른 세팔로스포린계 항생물질과 같이 빌리루빈을 혈청부분으로부터 유리시킬 수 있으므로 과빌리루빈혈증이 있는 신생아, 특히 미숙아에게 투여할 때는 빌리 루빈농증 발생 위험 때문에 투여하지 않는다.

9. 고령자에 대한 투여

고령자인 경우에는 다음과 같은 점에 주의하여 용량 및 투여간격에 주의하는 등 환자의 상태를 관찰하고 신중히 투여한다.

- 일반적으로 살리기 기능이 저하되어 있어 이상반응이 발생할 수 있다.

2) 비타민 K 결핍으로 출혈경향이 나타날 수 있다.

10. 임상검사치의 영향

- 테스트에프 반응을 제외한 메테티사약, 펠릭시약, 클리나티드에 의한 요당감사에서 위양성이 나타날 수 있으므로 주의한다. 비효소적 요당감사에서 위양성이 나타날 수 있으므로 이 약으로 치료 시 요당감사는 효소적 방법을 써야 한다.
- 이 약은 혈당 모니터링 중 혈당 수치 측정값을 낮출 수 있다. 따라서 각 모니터링 시스템의 사용설명서를 따라야 하며 필요한대체 검사방법을 볼 수 있다.
- 직접 콜레스테롤이 나타날 수 있으므로 주의한다.
- 다른 항생물질과 같이 갈락토스혈증 시험에서 위양성이 나타날 수 있다.
- 적응상의 주의1) 혈액내 대량투여에 의해 드물게 혈관통, 혈전성 정맥염, 혈관괴림, 구역, 구토를 일으킬 수 있으므로 주사액의 조성, 주사부위, 주사방법 등에 대하여 충분히 주의하고 주사속도는 가능한 천천히 한다(정맥주사에 한함).2) 용해 후 신속히 투여한다. 특히 글루타치온제제, 고농도의 아미노산류의 보액에 녹여 투여하는 경우에는 주의해야 한다. 정적 주사의 경우는 주사용수를 사용하지 않는다(동정액이 아닌).3) 삼전물에 형성될 수 있으므로, 희석 시 용기벽 또는 하트면 등 칼슘 함유 용액을 사용해서는 안 된다. 이 약과 칼슘 함유 용액을 동일한 주입구로 투여한 경우, 세프트리악손-칼슘 침전이 발생할 수 있다. Y-site를 통한 비경구 영양액 등 정맥투여용 칼슘 함유 용액과 이 약을 동시에 투여해서는 안 된다. (1. 경고 및 6. 상호작용 항목 참조)4) 아미노-글리코사이드계 항생물질과 병용투여 시 같은 주사기 내에서 혼합투여하지 않는다.
- 2) 보관 및 취급상의 주의사항조제된 용액은 실온에서 6시간 또는 5°C에서 24시간동안 물리적 및 화학적으로 안정하다, 일반적으로 2제지주 즉시 사용해야 한다. 조제된 용액의 색은 농도 및 보존기간에 따라 담황색, 황갈색이며, 이러한 세프트리악손의 특성은 이 약의 약화나 내약성에 아무런 문제가 되지 않는다.

■포장단위: 500mg/바이알×10바이알/박스

■저장방법: 밀봉용기, 실온(1~30°C)보관

■제조/회자/판매처: 일성신약, 경기도 안산시 단원구 신단로 349

■제조자: 국제약품(주), 경기도 안산시 단원구 신단로 47

※ 의약품은 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

※ 첨부문서에 기재되어 있지 않은 부작용이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 알려십시오.

※ 사용(유용)하지 않을 때 적절한 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 본 의약품은 KGMPI(의약품 제조 및 품질관리기준)에 의하여 엄격한 관리를 할한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유용)하지 않은 경우와 다르게 변질·오염되거나 손상된 의약품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성 연월일 이후 변경된 내용은 www.ilsung-ph.co.kr이나 소비자상담실(수신자부담) 080-221-0003을 통해 확인할 수 있습니다.