

[원료약품 및 분량] 1정 중

- 유효성분 : 푸르셀티아민(KP) 50 mg
리보플라빈(KP) 50 mg
니코틴산아미드(KP) 50 mg
판토텐산칼슘(KP) 50 mg
피리독신염산염(KP) 50 mg
시아노코발라민(KP) 0.25 mg
d-비오틴(USP) 0.25 mg
폴산(KP) 0.25 mg
이노시톨(KP) 50 mg
콜린타르타르산염(USP) 50 mg
직타용아스코르브산97%(별규) 60 mg
(아스코르브산으로서 58.2 mg)
산화아연(KP) 20 mg
(아연으로서 16 mg)
콜레칼시페롤농축물(분말형)(EP) 5 mg
(비타민D로서 500 I.U)
셀레늄함유건조효모(KP) 46.3 mg
(셀레늄으로서 25 µg)
산화마그네슘(KP) 25 mg
(마그네슘으로서 15 mg)

- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 크로스포비돈, 전분글리콜산나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스, 경질무수구산, 스테아르산마그네슘, 폴리에틸렌글리콜6000, 산화티탄, 히프로멜로오스, 톨크, 오파드 라이레드(amb II 88A650018)

[성상] 적갈색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C, D의 보급

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 발육기, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
· 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
· 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방, 각기, 눈의 피로

2. 아연의 보급

[용법·용량] 만 12세 이상 청소년 및 성인 : 1회 1정, 1일 2회 복용 또는 1회 2정, 1일 1회 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
(2)이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
(3)만 12개월 미만의 젖먹이
(4)신장결석 환자
(5)심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
(2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
(2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
(3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
(4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
(5) 심장·순환기계기능 장애 환자
(6) 신장장애 환자
(7) 저단백혈증 환자
(8)통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
(9) 신장결석 병력이 있는 환자
(10) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오, 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구내염(입안염), 구역, 구토, 붉은 변, 설사, 붉은 반점, 부전수축(심장박동 정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
(2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
(3) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
(4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
(5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(요산과다증)(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
(6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
(7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
(8) 우발적으로 과량복용 한 경우
(9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
(2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
(3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
(4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
(2) 직사광선을 피하고 뭉 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
(3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1 ~ 30℃)보관 [포장단위] 120정(60정×2) [문안작성일] 2018. 02. 02 (Rev. 0)

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과하였거나 변질 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, “소비자 피해보상규정”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
※ 작성일자 이후 변경된 내용은 온라인 의약도서관(drug.mfds.go.kr)의약품정보 또는 031)314-0329(소비자상담실)에서 확인할 수 있습니다.

[제조의뢰 및 판매자] (주)CMG제약 / 경기도 시흥시 공단1대로27번길 27

[제 조 자] 미래제약(주) / 경기도 안성시 공단2로 104