



조 제 용	
일반의약품	
분류번호	313

폴비정

원료약품 및 그 분량 1정 중

- 유효성분 : 피리독신염산염(KP) 50mg
시아노코발라민(KP) 500μg
폴산(KP) 250μg
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)
- 기타 첨가제 : 옥수수전분, 미결정셀룰로오스, 포비돈, 스테아르산마그네슘

성상

분홍색의 원형 정제

효능·효과

- 다음 경우의 비타민 B₆의 보급 :
 - 임신 · 수유기, 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
 - 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

용법·용량

만 8세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 1정 복용하십시오.

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 3개월 미만의 젖먹이
 - 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스불내성(galactose intolerance) Lapp 유당(젖당)분해효소결핍증(Laplactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 만 1세 미만의 젖먹이
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 피리독신 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계)의 기능적 장애 또는 병적변화) 이 나타날 수 있습니다.
- 2) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 3) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 4) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

200정

취급상의 주의사항

- ※ 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.
- ※ 이 첨부문서 개정일자(2017년 11월 16일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr/>)의 '의약품검색' 에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ☎ 소비자상담실 (02)561-4011

첨부문서 최종 개정연월일 : 2017. 11. 16
1711-00

APROGEN

에이프로젠제약(주)

경기도 화성시 양감면 두머리길 16

제조외뢰자 : 에이프로젠제약(주)-경기도 화성시 양감면 두머리길 16
제조사 : 조아제약(주)-경상남도 함안군 함안면 광정로 318