

분류번호 : 238 (하제, 완장제)

비사콜장용정

정상적인 배변은 건강의 척도가 되며 섭취하는 음식물, 운동, 배변습관과 정신적 요인 등의 여러인자에 의해 영향을 받게 됩니다. 변비는 그 자체가 병이 아닐지라도 변비의 장기화로 인한 각종증상(식욕부진, 복부팽만, 장내의 이상발효, 치질 등)들은 일상생활에 많은 지장을 초래하게 됩니다.

변비의 원인은 불규칙한 생활, 식사와 섬유식물 부족, 변의의 무시, 운동부족, 스트레스등이며 이와 같은 원인으로 대장운동이 둔화되고 변의 수분을 빼앗겨 이완성 변비가 되는 것으로 격무에 시달리는 직장인, 어린이, 수험생, 노인층, 다이어트중인 여성에게 많이 나타나는 증상입니다. 변비의 치료는 본인에게 알맞은 약을 선택하여 복용하면서 규칙적인 생활습관과 균형잡힌 식사, 적당한 운동을 하면 치료효과가 좋습니다.

비사콜장용정은 대장내 점막에 직접 작용하여 배변효과를 나타내는 비사코딜과 단단한 변을 부드럽고 쉽게 배출되도록 도와주는 계면활성제인 도큐세이트나트륨의 복합제제로 이루어졌습니다.

■ [원료약품 및 그 분량] 1정 중

[유효성분] 비사코딜(EF) 5.0 mg
도큐세이트나트륨(USP) 16.75 mg

[첨가제-동물유래] 유당수화물(소의 우유에서 유래)

[첨가제-타르색소] 식약처인정타르색소(황색4호, 황색5호)

[기타첨가제] 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 셀라세페이트, 스테아르산마그네슘, 크로스카멜로오스나트륨, 폴리소르베이트80, 폴리에틸렌글리콜400, 폴리에틸렌글리콜6000, 피마자유, 히드록시프로필셀룰로오스

■ **성상** : 황색의 원형 장용성필름코팅정

■ 효능효과

- 변비
- 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

■ 용법용량

- 만 15세 이상 및 성인 : 1회 2정
- 만 8세 이상 ~ 만 15세 미만 : 1회 1정
- 1일 1회 취침시 (공복(빈속시)에 복용한다.
- 다만, 초화는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는 감량(줄임) 한다.

■ 사용상의주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자.
 - 2) 장폐색(창자막힘) 환자.
 - 3) 만 7세 이하의 어린이.
 - 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 액식품을 복용하지 말 것.
제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자.
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성.
 - 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람.
 - 4) 나트륨 제한식이를 하고 있는 사람
 - 5) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람.
 - 6) 이 약은 황색소(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
 - 7) 이 약은 황색소(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약을 복용함으로써 발진 · 충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우.
 - 2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우.
 - 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우.
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것.
 - 3) 반드시 필요한 경우 이외에는 만 10세 이하의 어린이는 복용을 피하는 것이 바람직하다.
 - 4) 복용 시 정제를 씹지 말 것
 - 5) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주 일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
 - 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

■ **저장방법** : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■ **포장단위** : 20정 (10정/PTP×2)

■ **사용기한** : 제조일로부터 36개월

■ **제조회사** : 안국약품(주) / 경기도 화성시 향남읍 제약공단길 40

■ **제조사** : 영풍제약(주) / 인천광역시 남동구 함박외로 333

AG171114

■ 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자분쟁해결기준에 의거 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다. 유통도중 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 교환하여 드리오니 담당사원을 통하여 폐사로 송부하여 주시기 바랍니다. 안국약품(주) • 소비자 상담실 : 080-001-4125

- ※ 이 첨부문서 작성일자(2017년 11월 14일)이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.ahn-gook.com)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 자세한 품목 허가 또는 신고사항은 온라인의약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)참조
- ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재 (용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.
- ※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의약품을 사용하는 동안에는 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.



• 본사 : 서울특별시 영등포구 시흥대로 613(대림동) • 공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단길 40