

프리미엄미네코다정 (PremiumMinecoda Tab.)

[성분·함량] 1정 중

유효성분 :

클레칼시페롤(분말형)(비타민D로서 500IU)(EP).....	5.00mg
시트르산칼슘수화물(칼슘으로서 80.1mg)(USP).....	380.00mg
락트산마그네슘수화물(마그네슘으로서 47.9mg)(EP).....	470.00mg
셀레늄함유건조효모(셀레늄으로서 50.0ug)(KP).....	33.33mg
황산아연수화물(아연으로서 7.5mg)(KP).....	33.00mg

첨가제(동물유래성분) : 유당(젓당)수화물(기원 : 소, 부위 : 우유)
기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이한색(03B28796),
저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 적색산화철, 전분글리콜산나트륨, 폴리디드시아산화규소,
황색산화철, 히드록시프로필셀룰로오스

[상징] 열은 분홍색의 장항형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 D의 보급
 - 임신·수유기 - 발육기 - 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 뼈, 이의 발육불량 - 구루병의 예방

[용법·용량]

만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

[사용상 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장(콩팥)결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자
- 6) 이 약은 유당(젓당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젓당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)을 일으킬 수 있다.
- 3) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
- 4) 신장·순환기계기능 장애 환자
- 5) 신장(콩팥)장애 환자
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 감심배당체를 투여 중인 환자
- 8) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
- 9) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 :

- 1) 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동 정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배 부분) 통증, 폐부종(부기)
- 2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 및 결석증이 나타날 수 있다.
- 4) 항암도스테로네, 테라암테렌과 병용(함께 복용(시용))투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 5) 우발적으로 과량복용 한 경우.
- 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우.

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 녹차, 홍차 등 탄산을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 120정/병

[소비자상담실] 063-241-9321



[제조자] ㈜씨티씨비이오 경기도 안산시 단원구 강촌로 228-16

[판매원] (유)주영약품, 전라북도 전주시 덕진구 인후5길 6-35

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- * 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
- * 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- * 설명서 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

최종개정연월일 : 2017.11.20

Ver. 000