



# 생약성분함유 변비치료제 굿모닝에이스정

【원료약품 및 그 분량】 1정(350mg) 중

■ 우유성분:

도큐세이트나트륨(USP)···10.0mg, 비사코딜(KP)···3.0mg, 센나열매가루(BP)···75.0mg, 감초엑스신(생규)(감초로서 0.28g)···75.0mg, 작약엑스신(생규)(작약으로서 0.19g)···50.0mg

■ 첨가제(동물유래성분): 유당(젓당)수화물(소, 우유)

■ 첨가제(타르색소): 청색2호일루미노레이크, 청색2호일루미노레이크, 황색203호일루미노레이크

■ 기타첨가제: 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 아크릴아이드93041049그린, 오파드라아03K19229클리어, 크로스카멜로오스나트륨, 폴리메틸렌글리콜6000

【성상】 녹색의 장용성 필름코팅정

【효능·효과】 · 변비

· 변비에 따른 다음 증상의 완화: 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

【용법·용량】 · 변비에 따른 다음 증상의 완화: 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

1일 1회 취침 시(공복 시)에 다음과 같은 양을 복용합니다.

— 만 15세 이상: 1회 1~3정

— 만 11세 이상 ~ 만 15세 미만: 1회 1~2정

— 만 7세 이상 ~ 만 11세 미만: 1회 1정

다만, 최초(처음)는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량

(양을 늘림) 또는 감량(줄임)합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 급성 복부(배부)팽만(중수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자

2) 장폐색(창자막힘) 환자

3) 만 7세 이하의 어린이

4) 이 약은 유당(젓당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젓당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.

제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 심한 복통(배앓) 또는 구역, 구토 환자

2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

4) 나트륨 제한식이를 하고 있는 사람

5) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람

6) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약을 복용함으로써 발진 · 충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배앓), 설사, 구토 등이 나타날 경우

2) 이 약을 복용함으로써 복부(배부)부종, 경련이 일어날 경우

3) 주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것.

3) 반드시 필요한 경우 이외에는 만 10세 이하의 어린이는 복용을 피하는 것이 바람직하다.

4) 복용 시 정제를 씹지 말 것.

5) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.

3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

“감소 함유 의약품” 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.

1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자(노인)

2) 심장 또는 신장(콩팥)에 장애가 있는 환자

3) 부종(부기)이 있는 환자

4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

1) 본제의 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈가물이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.

2) 위일도스테론증: 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기 연용(계속 복용)할 경우 자갈혈증, 혈안상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 쌍임), 부종(부기), 체중증가 등의 위일도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관혈혈청 칼륨치의 측정을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.

3) 근병증(근육병증): 자갈혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관혈을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.

3. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것.

칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프제 이뇨제(푸로세미드, 에타크리산) 또는 차이치드제 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용(함께 복용) 시 위일도스테론증이나 자갈혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 10정(10정/PTP), 20정(10정/PTP x 2)

【제품문의처】 (유)한풍제약 소비자상담실: 02-521-2618

【제조판매원】 (유)한풍제약 / 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301 1~3층, 5층, 봉동로 705

※ 본 의약품은 “우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)”에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.

※ 의약품용 사용시 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어와 하여, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오. 본 첨부문서 작성일자(2021년 01월 06일) 이후에 변경된 내용은 소비자 상담실번호(02-521-2618)에서 확인하십시오.

※ 본 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약물안전관(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

※ 제품 개봉시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입힐 수 있으니 주의하십시오.

제 조 판매원 **한풍제약**

전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 301, 봉동로 705

www.hanpoong.co.kr 소비자상담실 02.521.2618

고객상담실 02.521.2618

www.hanpoong.co.kr