

키로민정 80밀리그램

(은행엽엑스)

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정 중

- 유효성분 : 은행엽엑스(생규).....80mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 첨가제(타르색소) : 황색203호 알루미늄레이크, 청색1호 알루미늄레이크
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 전분글리콜산나트륨, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 amb II 88A610016녹색

[성상] 녹색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 주요능 효과

- ① 말초동맥순환장애(간헐성파행증)의 치료
- ② 어지러움, 혈관성 및 퇴행성이명(귀울림)
- ③ 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움등의 치매성증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

[용법·용량]

* 성인

- ① 말초동맥순환장애, 어지러움, 이명(귀울림) : 은행엽엑스로서 1회 40밀리그램 1일 3회 또는 1회 80밀리그램 1일 2회 경구투여한다.(먹는다, 복용한다)
 - ② 기질성 뇌기능장애 : 은행엽엑스로서 1회 40-80밀리그램 1일 3회 또는 1회 120밀리그램 1일 2회 경구투여한다.(먹는다, 복용한다)
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 부작용

- 1) 드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
- 2) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 어지러움
 - 가려움증

3. 일반적 주의

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

이나연/516004/서울사무소|서울신규사옥|개발팀/172211553/20180208140754

023281518066906



4. 임부에 대한 투여

동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신 중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.

5. 소아에 대한 투여

소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 30정, 500정

[고객문의] 02)2176-7700

[제조사] 콜마파마(주) 충청북도 제천시 바이오밸리2로 93

- ※ 본 의약품은 우수의약품제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 자세한 의약품 정보는 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품 검색'란 을 통해 확인하실 수 있습니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관 하여 주십시오.

최종개정연월일 : 2018.01.30



콜마파마(주)

충북 제천시 바이오밸리2로 93
www.kolmarpharma.com

023281518066950

