

전문의약품 | 분류번호 222

레보콜 정 60 mg

(레보드로프로핀)

[원료약품의 분량] 이 약 1정 (252mg) 중

유효성분 : 레보드로프로핀(BP) 60mg

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)(KP) 110mg

스테아르산마그네슘(소, 우유)(KP) 2.5mg

기타첨가제 : 딸기향코팅, 미결정셀룰로오스, 수크랄로오스, 옥수수전분, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 코포비돈, 클로이드성아산화규소, 탭크, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 백색의 원형 정제

[효능·효과] 다음 질환에서의 기침 : 급만성기관지염

[용법·용량] 성인 : 레보드로프로핀으로서 1회 60 mg을 1일 3회 적어도 6시간 간격을 두고 경구투여한다. 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자

2) 기관지 점액 분비 증가 환자

3) 점액성모기능이상(카르타게너증후군, 섬모이상운동증) 환자

4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부

5) 중증의 간장애 환자

6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 중증 심부전 및 중증 신장부전 환자

2) 고령자

3) 만 2세 미만의 영아

3. 이상반응

1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토

2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움

3) 순환기계 : 심계항진

4) 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응

4. 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작 시 주의하며, 특히 알코올과 병용 시 작용이 증대 될 수 있다.

5. 상호작용

예민한 환자에게 진정제와 병용투여 시 주의한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는다.

7. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 주의한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 30정/병, 300정/병

* 유효(사용)기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 의약품 등은 구입하신 곳에서 당사 담당 영업 사원을 통하여 교환하여 드립니다.

* 이 설명서의 개정일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지(www.boryungbio.co.kr) 또는 소비자상담실(02-708-8085)에서 확인할 수 있습니다.

* 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보를 참조하시기 바랍니다.

* 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 또는 약사와 상담하십시오

제조외의사 : (주)보령바이오파마 충청북도 진천군 광혜원면 사동길 2

제조자 : 코오롱제약(주) 대전광역시 대덕구 문명서로18번길 45

작성연월일 : 2018.01.02