

칼맥포르테

CALMAG FORTE Soft caps.

1일 1회, 마그네슘, 흡수율을 높이는 비타민D 함유 칼슘제

일반의약품

일반의약품 정보

[유효성분]	1캡슐(1,800 mg) 중
■ 글루콘산칼슘수화물(JP)(칼슘으로서 14.3 mg).....	160 mg
■ 인산수소칼슘수화물(USP)(칼슘으로서 137.41 mg, 인으로서 106.19 mg).....	590 mg
■ 농축클레칼시페롤(유상)(BP)(비타민D로서 1,000 IU).....	1 mg
■ 산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 12.06 mg).....	20 mg

[효능 · 효과]
■ 다음 경우의 비타민 D 의 보급
- 임신 · 수유기, 발육기, 노년기
■ 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
- 뼈, 이의 발육발랑
- 구루병의 예방

[첨 가 제]
■ 착색제(타르색소) : 적색40호, 황색5호, 청색1호
■ 공기름, 아자강화유, 황산, 레시틴, 폴라소르베이트80, 젤라틴, 농글리세린, 비결정성소르비톨액, 산화티탄

[용법 · 용량] 12세 이상 및 성인 1일 1회, 1회 1캡슐 복용

[성 상] 유백색의 유상 내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

[포 장 단 위] 60캡슐(10캡슐/PTP × 6), 120캡슐(10캡슐/PTP × 12)

[저 장 방 법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[사 용 기 간] 제조일로부터 24개월

[제 조 원] 코스맥스바이오(주) (충청북도 제천시 바이오밸리3로 30)

[판 매 원] 동화약품(주) (서울시 중구 추암로98, 10층)

[소비자 상담실] 031-8018-0364 (반품 및 교환처 : 구입처)

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 신장결석 환자
 - 심한 증상의 신부전 환자
 - 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
 - 심장 · 순환기계가 장애 환자
 - 신장장애 환자
 - 저단백혈증 환자
 - 감심배당체를 투여 중인 환자
 - 신장결석 병력이 있는 환자
 - 임부
 - 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 해장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
 - 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
: 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동 정지), 중추신경계 기능저하
- 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
- 우발적으로 과량복용 한 경우
- 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
- 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여드립니다.
 - 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
 - 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
 - 설명서 작성일자(2018년 01월)이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

작성일 : 2018년 01월