CDFNI-001



【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

■유효성분 : 아세트아미노펜(KP)……180mg 숙신에페드린염산염(USP)……15mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)……12.5mg 덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)…8mg
트리프롤리딘염산염수화물(BP)…0.66mg

■ 첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(소-가죽)

■ 기타 첨가제 : 실함색소, 소르비톨 소르비탄액, 정제수, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜400, 프로필렌글리콜

【성 상】 미황색 내지 황색의 투명한 액이 든 황색의 투명한 타원형 연질캡슐

【효능·효과】 감기의 제증상(머리중상/콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법·용량】 만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐 식후30분에 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고 : 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
 3) 만3개월 미만의 영아(갓난아기)
 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 경련조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주이내의 사람
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염코염용 경구제, 멀미약, 알레르기용약)
4. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것
 1) 이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.
5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.
 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이 (구역이나 구토를 수반하는 뇌염의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 잠재된 레이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.)
 2) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영아(갓난아기), 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영아(갓난아기), 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터해야 한다.
 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람

콜드펜 노즈
연질캡슐
액상이라 효과 빠른 코 감기약

 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 5) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 눔)곤란 등이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람 (당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
 9) 다음과 같은 기침이 있는 사람 – 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열발진저이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 상담 시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 발진발적(홍반)두드러짐(피부염), 가려움, 구역구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 배뇨(소변을 눔)곤란, 목마름(지속적 이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림, 불면
 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타난 경우
 ① 쇽(아나필락시(과민성)쇼크) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
 ② 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사용해(리엘증후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적(홍반)과 물집(수포)이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수있다.
 ③ 천식
 ④ 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띠게 됨)등이 나타날 수 있다.
 ⑤ 간질성폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다.
 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
 3) 복용시에는 음주하지 말 것.
 4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
 5) 바르비탈계 약물, 살한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.
8. 저장상의 주의사항
 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 10캡슐 **【저장방법】** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.
만약, 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.
※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
※ 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식약처온라인의약도서관(http://drug.mfds.go.kr) 또는 당사 홈페이지(http://www.dkpharm.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
※ 제품에 관한 의문사항은 동국제약㈜ 소비자상담실(☎080-777-5678: 수신자 요금 부담)로 문의주십시오.

제조자 **코스맥스바이오(주)** 충청북도 제천시 바이오밸리2로 30

설명서 최종 개정 연월일 : 2017.12.15

제조의뢰자 **동국제약** Dongkook Pharmaceutical
충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33-19