

알레르기질환 치료제

알티온정

(아젤라스틴염산염)

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1정 중

- 유효성분 : 아젤라스틴염산염(EF) 1mg
- 첨가제(타르색소) : 황색5호 알루미늄레이크, 황색203호 알루미늄레이크
- 첨가제(동물유래) : 우당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)
- 기타첨가제 : 옥수수전분, 이라비이고루, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 노란색(03F620038)

【성상】

밝은 황색의 원형필름코팅정제

【효능·효과】

기관지 천식, 알레르기성비염, 두드러기, 습진, 피부염, 아토피성 피부염, 피부소양 증, 가려움

【용법·용량】

아젤라스틴염산염으로서 1회 1mg, 기관지 천식인 경우에는 1회 2mg을 1일 2회 아침식사후 및 취침 전에 경구투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 6세 이하의 유아
 - 2) 이 약은 우유를 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 이는 황색5호(산세텔로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 이상반응
 - 1) 정신장애 : 졸음, 때때로 관대함, 수족마비, 드물게 비틀거림 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 소화기 : 때때로 구갈, 구역, 구토, 입안의 가림, 드물게 식욕부진, 복통, 변비, 설사, 위부불쾌감 등이 나타날 수 있다.
 - 3) 순환기계 : 드물게 얼굴이 달아오름, 숨가쁨 등이 나타날 수 있다.
 - 4) 호흡기계 : 비진조가 나타날 수 있다.
 - 5) 간장 : 때때로 트랜스아미나제의 활성을 상승시키는 수가 있다. 드물게 AST, ALT, A-P의 상승이 나타날 수 있다.
 - 6) 과민증 : 때로는 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
 - 7) 비뇨기계 : 배뇨곤란, 혈뇨, 드물게 빈뇨가 나타날 수 있다.
 - 8) 혈액계 : 드물게 백혈구 증가가 나타날 수 있다.
 - 9) 기타 : 부종, 혈청이상 등이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
 - 1) 졸음을 유발할 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험한 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
 - 2) 장기 스테로이드 요법을 받고 있는 환자에서 이 약 투여에 의해 스테로이드를 감량하고자 하는 경우에는 충분한 관리 하에 천천히 한다.
 - 3) 기관지 천식에 사용하는 경우, 이 약은 이미 일어나고 있는 발작을 빠르게 경감시키는 약물이 아님을 환자에게 충분히 설명할 필요가 있다.
 - 4) 이 약을 제1정 환자에서 투여하고자할 때에는 호발계절을 고려하여 그전에 투여를 시작하고 호발 계절의 종료 시기까지 계속하여 투여하는 것이 바람직하다.
5. 상호작용

알코올의 섭취에 의해 진정 작용이 증강될 수 있으며 시메티딘과 병용투여 시에도 주의한다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 동물 실험에서 대량투여(임상 용량의 370배 이상)에 의해 기형발생이 보고되고 있으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
 - 2) 동물실험(랫드)에서 우유 중에 이행하는 것이 보고되어 있으므로 수유중의 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직하나 부득이 투여할 경우에는 수유를 중단한다.
7. 소아에 대한 투여

미숙아, 신생아, 영아 및 유아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험

이 적다).

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

9. 적응상의 주의

약을 제체의 맛인 쓴맛이 나타날 수 있다.

10. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

3) 오용을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

11. 의약품등등성시험 정보[※]

시험약 아젤라스틴염산염정1밀리그램(주)일화)과 대조약 부광아젤틴정(아젤라스틴염산염(부광약품(주))을 2×2 교차시험으로 각 4정씩 건강한 성인에게 공복 시 단면 경구투여하여 14일의 혈중 아젤라스틴염산염을 측정한 결과, 아젤라스틴염산염(AUC, C_{max})을 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90% 신뢰구간이 log₁₀0.8에서 log₁₀1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-12h} (ng · hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	부광아젤라틴정 (부광약품(주))	97.95 ±42.38	3.636 ±0.785	5.00 (4.00~6.00)	42.75 ±20.72
시험약	아젤라스틴염산염정 1밀리그램(주)일화)	96.62 ±36.70	3.344 ±0.836	5.00 (4.00~6.00)	47.13 ±15.16
90% 신뢰구간* (기준 : log 0.8 ~ log 1.25)		log0.8535 ~1.1796	log0.8525 ~0.9916		

(AUC, C_{max}, t_{1/2} ; 평균값±표준편차, T_{max} ; 중앙값(범위), n=14)

AUC : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 17까지의 혈중농도-시간곡선하면적

C_{max} : 최고혈중농도

T_{max} : 최고혈중농도 도달시간

t_{1/2} : 말단 소실 반감기

* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간

※ 이 약은 (주)일화 아젤라스틴염산염정1밀리그램과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전 공정을 (주)일화에 위탁 제조하였음.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정/병, 300정/병

【제조외파지】 한국코러스(주) / 총괄 제천시 강제로 30

【제조지】 (주)일화 / 강원도 춘천시 동내면 거두단지2길 55

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변태 또는 오염되거나 손상된 제품일 경우에는 구입처 및 본사에서 교환해드립니다.

※ 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 온라인 의사도서관

(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 검색을 참고하여 주세요.

※ 의약품을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

작성년월일 : 2018.02.05

PK-62288-001