

K G M P

일반의약품

어깨결림, 요통, 관절통 · 근육통의 증상 완화

바이코민® 정

Vicomin Tab.

분류번호 : 312

[성분 · 함량] 1정 중

- 유효성분 : 비스벤티아민(별규).....33,33mg(티아민염산염으로서 29,16mg)
피리독신염산염(KP).....33,33mg
시아노코발라민(KP).....500μg
토코페롤숙시네이트칼슘(KP).....34,53mg(호박산-dl-α-토코페롤로서 33,33mg)
니코틴산아미드(KP).....20,00mg
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(소, 우유), 젤라틴(소, 내피)
- 첨가제(타르색소) : 황색203호
- 기타 첨가제 : 경질무수구산, 리보플라빈, 미결정셀룰로오스, 백당, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 아라비아고무, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 침강탄산칼슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 폴로이드성아산화규소, 말크, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 노랑색의 원형 당의정

[효능 · 효과]

- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림, 오십견 등), 손발의 저림, 눈의 피로
- 다음 경우의 비타민 B1, B6, B12의 보급 : 육체피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후의 체력저하

[용법 · 용량]

- 15세 이상 어린이 및 성인 : 1회 2~3정,
- 11~14세 어린이 : 1회 1~2정,
- 5~10세 어린이 : 1회 1정을
- 1일 1회 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분과의 과민반응 환자
- 2) 5세 미만의 어린이
- 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

레보도파

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 · 수유부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움
- 2) 구역 · 구토, 위부불쾌감, 식욕부진, 복부팽만감
- 3) 묽은 변, 설사, 변비와 같은 증상이 지속되거나 심해질 경우
- 4) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 5) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전혈관 막힘성 소인이 있는 환자가

비타민 D를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)의 위험이 증가될 수 있습니다.

- 6) 피리독신을 1일 50mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 7) 임신이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 8) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력장애), 고요산혈증(요산과다증)(hyperuricemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 투여하십시오.
- 3) 개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의하여 복용하십시오.
- 4) 이 약을 물 묻은 손으로 만지지 말 것. 물 묻은 손으로 만질 경우 당의가 변색할 수 있습니다.
- 5) 병 중의 패킹은 수송 중에 정제의 파손을 방지하기 위한 것이므로 개봉 후에는 필요가 없으므로 버리십시오.
- 6) 사용기한이 경과된 제품은 복용하지 마십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 오 · 남용(잘못 사용함)을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 90정

제조회사 : (주)메디카코리아 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 96
제 조 자 : (주)한국파비스제약 경기도 안산시 단원구 산단로83번길 127
판 매 자 : (주)대산팜 부산광역시 동래구 아시아대로 225번길 9

저희 메디카코리아 제품은 KGMP에 적합하게 철저한 품질관리를 통해서 제조됩니다. 혹시 사용 기간이 경과되었거나, 유통과정 중 변질 · 훼손된 제품은 구입 경로를 통하여 교환해 드립니다.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

※ 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 방문하시면 첨부문서 작성(개정) 일 이후의 최신 제품정보를 확인하실 수 있습니다. 제품문의 및 상담은 메디카코리아(02-585-7799)로 문의바랍니다.

작성일자 : 2017.12.15
MK17121501-IN