

순수생약 항염증제

삼성은교산 캡슐

편도염 / 인후염 / 기관지염

SAMSUNG PHARM

삼성제약주 Since 1929

10캡슐

일반의약품 정보(계속됨)

【소비자 상담실】080-777-8285 / www.sspharm.co.kr

【저장방법】 기밀봉기, 실온(1~30℃)보관

【제조(의)회사】 삼성제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 35

【사용기한】 용기 상단 표시일까지

【제조사】 경진제약사 경기도 이천시 읍면 일생로 406번길 6

일반의약품 정보

【원료약품의 분량】

1캡슐 중

유효성분 : 금은화(KP) 710mg, 연교(KP) 710mg, 두시(생규) 356mg, 우병자(KP) 356mg, 박하(KP) 426mg, 길경(KP) 426mg, 감초(KP) 426mg, 담죽엽(생규) 284mg, 향개(KP) 284mg, 영양학(생규) 22mg(기원 : 영양 사용 : 풀) 이상 건조엑스로서 500mg
 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원 : 소, 사용 : 우유) 첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색5호, 기타첨가제 : 스테아르산마그네슘, 캡슐, 콜로이드성아산화규소

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 5세 미만의 영(젖먹이)·유아 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 1) 고혈압 환자 2) 심장 또는 신장(신장장애) 환자 3) 부종(부기) 환자 4) 몸이 허약한 환자(체력이 쇠약해진 환자, 몸이 약한 환자) 5) 위장이 허약한 환자 6) 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자 7) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자) 8) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성) 9) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.) 10) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를

함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이케이스를 소지할 것. 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

(1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 저액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.) (2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것. (3) 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등 (4) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역 등 2) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시킬 것. 4) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로로메타이드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것. 5) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 성약의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.). 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

일반의약품 정보(계속됨)

【용법·용량】

【성상】 갈색의 분말이 충전된 상부 갈색, 하부 흰색의 경질캡슐제

보통 성인 1회 2캡슐, 7~14세 1캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간에 복용한다.

【효능·효과】 감기로 인한 목구멍 통증, 목마름, 기침, 두통