



고기능성 비타민
B군 10종

비타민 C·D·E

아연

우르소데옥시콜산

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

■ 유효성분

사이노코발라민1000배산(KP)(사이노코발라민으로서100,0ug)	100mg
피파아스코르브산(복규)(아스코르브산으로서 100mg)	103.1mg
신하아연(KP)(아연으로서15,0mg)	18.68mg
벤포타이민(KP)(타이민염산염으로서 36,15mg)	50mg
토코페롤아세테이트 2배산(KP)(비타민E로서 10,0IU)	20mg
콜레칼시페롤(복규)(동물유래성분-양, 양모)(비타민D로서 500IU)	5mg
리보플라빈(KP)	100mg
파리독신염산염(KP)	100mg
판토텐산칼슘(KP)	100mg
콜린타르타르산염(USP)	100mg
우르소데옥시콜산(KP)	5mg
폴산(KP)	0.1mg
니코틴산아미드(KP)	100mg
비오틴(USP)	100ug
아사나톨(KP)	100mg
γ-오르티지놀(KP)	10mg

■ 함유제

경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파라이드(셀룰로오스200F650003),
전분글리콜산, 나트륨, 크로스카멜로오스, 나트륨, 폴리비닐피롤리돈6000, 하드록시프로필셀룰로오스

[성상] 직각형의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

■ 다음경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C, D, E의 보급

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 발육기, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절염(요통, 어깨관절 등), 구각염(입꼬리염),
근조영(안검염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기 · 눈의 피로 · 뼈, 이의 발육불량 · 구루병의 예방

■ 아연의 보급

[용법·용량]

12세 이상 어린이 및 성인 : 1일 1회 1정을 식후 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- (1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia) : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태(환자, 유육종증(sarcoidosis) : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환, 신장질환 환자
- (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (3) 신장결석 환자

2) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린제 제제, 제산제
- (2) 레보도파

3) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- (3) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
- (4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 마취약, 우아
(비타민 D는 모유로 분비되어 산생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.)
- (5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- (6) 신장장애 환자
- (7) 자전색혈증 환자
- (8) 통풍 환자 또는 신장결석에 있는 환자
- (9) 신장결석 병력이 있는 환자

4) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 붉은 번, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 자혈암, 폐부종.
- (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨리거나 나중이 정지되었을 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- (3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임약을 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- (4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- (5) 파리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- (6) 폴산이 부족한 환자(예 비타민 B₁₂를 1일 10ug 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응)이 나타날 수 있다.
- (7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태, 간손상을 일으킬 수 있다.
- (8) 대변투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고열, 탈수, 울혈성부전, 무중(무기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- (9) 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- (10) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것
- (3) 각종 요검사에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- (4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상감사(尿)에 영향을 줄 수 있다.
- (4) 녹차, 홍차 등 탄산을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피할 것.

6) 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 60정/병 [저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)에서 보관하세요

- ※ 본 약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품이며 공장이 배워원(한국소비자안전센터)에 의해 보살핌을 수 있습니다.
만약, 구입시 사용(유효기간)이 경과되었거나 변질(변색 또는 오손)된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 우편물과 함께 보관하십시오.
- ※ 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 한국약품안전관리원(http://drug.mfds.go.kr) 또는 당사 홈페이지(http://www.dkpharm.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 제품에 관한 문의사항은 동국제약(주) 소비자상담실 ☎080-777-5678, 수시 24시간 상담을 받으실 수 있습니다.
- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

● 제조사 (유)한홍제약 본사: 전북군 봉동읍 안천산로 6로 301 3층, 3층, 3층, 봉동로 705

제조의뢰자

동국제약



충청북도 진천군 광혜면 용소2길 33-19

설명서 최종 개정 연월일: 2018. 3. 16