

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어아하며, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

첨부문서 작성일자 : 2018년 2월 22일

일반의약품

분류번호(03190)
기타의 비타민제

고함량 활성비타민 센비백^정

[원료 약품 및 그 분량] 1정(1,207mg) 중

유효성분

벤토포아민(비타민B ₁)(K _P).....	100.0 mg
(타이아민염산염으로서 72.31mg)	
리보플라빈(비타민B ₂)(K _P).....	100.0 mg
니코틴아미드(비타민B ₃)(K _P).....	100.0 mg
판토텐산칼슘(비타민B ₅)(K _P).....	100.0 mg
피리독신염산염(비타민B ₆)(K _P).....	100.0 mg
시아노코발라민1000배산(비타민B ₁₂)(K _P).....	100.0 mg
(시아노코발라민으로서 100μg)	
이노시톨(K _P).....	30.0 mg
클린타르타르산염(DAB).....	30.0 mg
비오틴(USP).....	0.1 mg
폴산(엽산)(K _P).....	0.1 mg
(아연으로서 20.0mg)	
토코페롤아세테이트2배산(K _P).....	20.0 mg
(비타민D로서 10IU)	
셀레늄함유건조효모(K _P).....	20.0 mg
(셀레늄으로서 10.8μg)	
콜레칼시페롤농축물(본알형)(EP).....	10.0 mg
(비타민D로서 1000IU)	
산화마그네슘(K _P).....	50.0 mg
(마그네슘으로서 30mg)	
감마오리자놀(K _P).....	5.0 mg
첨가제(타르색소) : 청색2호	
첨가제(동물용색소) : 유당수화물,소,우유, 콜레칼시페롤농축물(본알형)(양, 양모),	
기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 유당수화물, 저지화도히드록시프로필셀	
룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 경질무수구산,	
스테아르산마그네슘, 히프롬멜로오스, 폴리메틸렌글리콜6000, 탕크, 산화티탄,	
바닐라리민, 오파드라이트라색소(03B62869)	

[성상] 연한 주황색 장방형 필름코팅정제

[효능·효과]

1. 다증경우의 비타민 D, E, B₁, B₂, B₆의 보급

- 육체피로, 임신, 수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력
저하시, 발육기, 노년기

2. 1에 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

- 뼈, 의 발육발달, 구루병의 예방, 각기, 눈의 피로, 다음 증상의 완화: 신경통,
근육통, 관절염(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염
(구안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

3. 아연의 보급

[용법·용량] 만 8세 이상 및 성인: 1회 1정, 1일 1회 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자,
유훈증증(hypercoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분과 과민반응이 있는 환자
- (3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- (4) 신장질환 환자
- (5) 심한 중상의 신부전 환자
- (6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance),
Lapp 유당불해소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스
흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자
에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- (2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아: 비타민
D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
- (4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- (5) 심장-순환기계기능 장애 환자
- (6) 신장장애 환자
- (7) 저단백혈증 환자
- (8) 신장결석 병력이 있는 환자
- (9) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하시기 바랍니다.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 설사, 물변, 변비, 위부
불쾌감, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 발진, 발적, 붉은 반점,부전수축(손가락등
정지), 중추신경계기능저하, 피부염, 담-호흡시 악화, 탈모, 근경직, 저혈압, 폐부종
- (2) 이 약의 투여에 의하여 생기가 예정보다 빨리자거나 양이 점점 많아질 수 있으며,
출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- (3) 예스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈정성 소인이 있는 환자가
비타민D를 복용할 경우 혈정증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- (4) 피리독신을 일 500mg-2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적
증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- (5) 칼슘이 함유한 환자에 비타민 D를 일 10μ 이상 투여할 경우 알칼리성 아연반응이 나타날 수 있습니다.
- (6) 고혈당 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance
impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애, 고요산혈증(hyperursemia, 혈액중에
요산이 과잉으로 존재하는 상태, 간산성을 일으킬 수 있습니다.
- (7) 대변으로 인해 구역, 구토의 위장장애, 고트루혈증, 유훈발진, 부종(기)등의 증상이 나타날 수 있다.
- (8) 고혈당으로 인해, 당뇨병과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- (9) 알코올적으로 과량복용 한 경우
- (10) 개별 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오.
- (3) 용수를 투여하여 고열이 일어났을 때에 영향을 줄 수 있습니다.
- (4) 녹차, 홍차 등 티닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- (2) 직사광선을 피하고 빛을 투신 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관합니다.
- (3) 오염(잘못 사용)을 막고 품질의 보증을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관 [사용기간] 제조일로부터 36개월
[포장단위] 60정/병, 120정(60정/병 x 2)

※ 만약 구입 당시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염되거나 손상된 제품은
구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자
분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. ※ 본 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 한국
코러스 인터넷 홈페이지(www.koruspharm.co.kr)나 소비자상담실에서 확인할 수 있습니다.
※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도사전(drug.mfds.go.kr)을 참조
하시기 바랍니다. ※ 본 약제 투약 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원
(1644-6223)으로 연락 및 보고하여 주시기 바랍니다. ※ 사용(유효)기한이 경과한 제품은 사용
하지 마시기 바랍니다. ※ 약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

소비자상담실 수신자부담전화 : 080-708-8255

BORYUNG
Consumer

HANKOOK KORUS
PHARM. CO., LTD

[판매원] (주)보령커뮤니티 서울특별시 중구 창경궁로 136(원문동, 보령빌딩)

[제조원] 한국코러스(주) 충청북도 제천시 강서로 30