

치스민캡슐의 디오스민은 혈관보호효과를 통해 정맥 혈관을 강화시키고 모세혈관 순환 개선 증상을 억제하는 작용기전으로 치질과 다양한 정맥질환에 사용되고 있습니다.

치질

일반적으로 '치질'이라는 단어로 많이 쓰이고 있으나, 올바른 용어는 '치핵'입니다. 항문연의 혈관 주위 조직이 약화되어 돌출되거나 출혈을 일으키는 현상으로 나타납니다.

[원인]

- 완연은 복합적인 항문혈관용 확장시키는 자체나 생활태도가 주요 원인입니다.
- 음주와 인위적인 항문 확장
 - 임신, 출산 후 항문조직이 약해지는 경우
 - 변비로 인해 복압이 증가하는 경우
 - 화장실에 오래 앉아있는 경우

[단계]

- 1기: 산도되었으나 탈출이 없는 상태
2기: 배변 시 탈출이 되나 곧 다시 들어가는 상태
3기: 배변 시 탈출이 되어 손으로 밀어 넣어 들어가는 상태
4기: 배변 시 탈출된 것이 손으로 밀어 넣어 들어가지 않거나 금방 나오는 상태
- ※ 탈출: 항문 및 직장이 항문 밖으로 빠져나와 재빨리 들어가지 않는 상태

[치료]

적절한 치료법으로 치료하면 완치가 가능하나 증상과 정도에 따라 방법이 달라질 수 있습니다.

- 약물치료: 1기, 2기
- 수술요법: 3기, 4기
- 보존적 요법
 - 통증치료
 - 식이요법
 - 배변 후 온수 좌욕을 통해 항문 청결유지
 - 배변시 혈관이 확장되는 습관이나 자세 교정

정맥류 및 정맥부전

[정맥류 및 정맥부전]

다리가 무겁고 아프고 자주 붓는 증상은 정맥질환에 의해 발생할 수 있는 증상입니다. 주요 원인으로는 정맥 일부가 확장되는 정맥류 및 정맥 내 판막이 약해져 발생하는 정맥부전을 들 수 있습니다.

※ 판막: 혈액이 심장 방향으로 순환하는데 도움을 주는 역할

[원인]

- 나이가 들수록 나타날 확률이 높음
- 임신, 생리전, 폐경기의 호르몬의 변화로 남성보다 여성에게 정맥류가 더 많이 발생
- 담배나 고지방에 의한 혈액순환 장애
- 장시간 동안 앉아 있거나 서 있는 자세

[증상]

- 하지의 피로감
- 무겁고 자린 느낌
- 경련성 통증

[치료]

심하지 않은 경우에는 특별한 치료 없이 다리를 심장보다 높게 올려 놓으면 증상이 완화됩니다. 하지만 다른 증상이 있거나 합병증이 발생되는 약물요법, 수술 등의 적절한 치료를 필요로 합니다.

치스민캡슐 (디오스민)

본 약을 사용하기 전에 본 첨부문서를 주의깊게 읽어아하며, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품 및 본품] 1캡슐(475mg) 중

- 유효성분: 디오스민(DP) 300.00mg
- 기타첨가제: 유당수화물, 옥수수전분, 전분, 글리콜산나트륨, 스테아르산나트륨, 산성, 상부 흰색캡슐, 하부 흰색캡슐

[성상] 황색색 내지 황색의 분말 또는 분말상의 과립이 든 상하 흰색의 경질캡슐제

[효능·효과]

1. 치질
2. 다발 질환에 의한 여러 증상 (하지(다)종양, 동통(통증), 부종(부기) 등)의 개선: 정맥류, 정맥부전 (임신시 포함), 정맥류후증후군
3. 모세혈관 허약증에 의한 출혈증상: 자연치주색 반점증

[용법·용량]

성인: 디오스민으로 시 1회 300mg 1일 2회 (점심, 저녁 식사 시) 경구투여 한다(복용한다). 치질의 재발이나 악화 시에는 1일 1,200~1,800mg까지 투여할 수 있다. 연령, 증상 등에 따라 적절히 증감 한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약에 과민증 환자
2. 이상반응
위장장애, 과민성 피부발진, 심계항진(두근거림), 어지러움, 두통, 코 입의 건조감 등이 나타날 수 있다.
3. 임부에 대한 투여
임신 초기 3개월 이내에는 투여하지 않는다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30°C) 보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 60캡슐(10정/PTP×6)

※ 부작용 보고 한국약물안전관리원(1644-6223)

본 제품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드려며, 공정거래위원회 고시 "불복불환 소비자 분쟁 해결기준"에 의거 장단한 피해는 보상하여 드립니다.

DS-1801-00

첨부문서 최초 작성일 2018. 01. 04

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 동성제약 홈페이지(www.dongsung-pharm.com) 및 식품의약품안전처 홈페이지 온라인의약품도서관(http://drug.mfds.go.kr)의 해당 제품정보에서 확인할 수 있습니다.

제2회 판매자
동성제약주식회사

경 남 동남 아산시 둔포면 관대안길 45
소재지: 050-001-0521
사이트: www.dongsung.com