

먹는 아미노산 영양제

아미푸렉스골드정

■ 원료약품의 분량 : 이 약 1정 중

· 유효성분	
L-리신염산염(KP)	18.75mg
L-류신(KP)	17mg
L-메티오닌(KP)	15mg
L-발린(KP)	15mg
L-이소류신(KP)	15mg
L-아르기닌염산염(KP)	10mg
L-페닐알라닌(KP)	10mg
L-트레오닌(KP)	10mg
L-트립토판(KP)	5mg
니코틴산아미드(KP)	15mg
피리독신염산염(KP)	7.5mg
티아민질산염(KP)	5mg
토코페롤속시네이트칼슘(KP)	2.5mg
리보플라빈(KP)	2mg

· 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소의 우유), 스테아르산마그네슘(소의 기름)

· 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 오파드라이발간색(200F650003)

■ 성상

적갈색의 타원형 필름코팅정제

■ 효능·효과

자양강장, 허약체질, 육체피로, 병중병후(병을 앓는 동안이나 회복 후), 위장장애, 영양장애, 발열성소모성질환, 임신수유기 등의 경우의 영양보급

■ 용법·용량

15세 이상 청소년 및 성인 : 1회 2정, 1일 1~2회 복용

소아(7세~14세) : 1회 1정, 1일 1~2회 복용

■ 사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 심한 증상의 신부전환자
 - 7세 미만 소아
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.(복용 전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 임부·수유부
- 부작용
 - 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.- 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변
 - 이 약 투여에 의하여 설리가 예정보다 빨리 나타나거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
 - 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘) 등의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 고용량투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성)손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperursemia : 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 일반적 주의
 - 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 투여하십시오.
 - 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 상호작용
 - 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용(사용))투여하지 마십시오.
 - 레보도파
- 임상 검사치에의 영향
 - 요를 황색으로 변하게 하여 임상 검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 무장을 꼭 닫아 보관하십시오.
 - 오용(잘못 사용) : 남용을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 무장을 꼭 닫아 보관하십시오.
 - 사용기한을 넘긴 제품은 복용하지 마십시오 또한 사용기한 내에 있더라도 개봉 후 6개월 이내에 복용하십시오(품질유지를 위함)
 - 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 (사용기간 : 제조일로부터 36개월)

■ 포장단위 : 120정/병, 240정(120정/병×2)

■ 첨부문서 최종 개정일 : 2018년 1월 22일

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.
※ 기타 문의사항은 약사와의 상의하거나 당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오.
※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은 <http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.



고려제약주식회사
경기도 아천시 신둔면 원로초 69-10