

고함량 항산화 비타민E, γ-오리자놀, 고함량 비타민B군 7종 함유

아로나민[®]이맥스 플러스정

다음과 같은 경우에 좋습니다.



신경통, 근육통, 관절통, 육체피로에-

신경비타민(B₁, B₆, B₁₂)은 신경의 재생과 신경전달물질 생성에 도움을 주고 신진대사를 원활하게 해주는 작용을 합니다. 아로나민 이맥스플러스정은 비타민 B군(B₁, B₂, B₃, B₅, B₆, B₉, B₁₂), 특히 활성형 비타민B₁인 푸르설티아민을 함유하여 신경의 통증을 유발하는 피로물질을 배출시키고, 에너지 대사를 원활하게 하여 신경, 근육, 관절의 통증을 완화하고 육체피로를 회복시킵니다.



말초혈행장애, 어깨·목 결림, 수족저림에-

아로나민 이맥스플러스정에 함유되어 있는 비타민E와 γ-오리자놀의 항산화작용으로 세포막을 건강하게 유지하고, 적혈구의 파괴를 막아 말초혈행개선으로 어깨·목결림 등과, 말초혈관 확장 작용을 통해 손발저림, 수족냉증(손발이 차가움) 등의 증상 개선에도 효과적입니다.



구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염에-

피부, 점막의 염증은 비타민B와 니코틴산아미드 등의 부족으로 많이 나타납니다. 아로나민 이맥스플러스정의 고함량 활성 비타민B군과 니코틴산아미드가 피부세포의 재생과 회복을 도와 구강 및 피부질환 치료에 도움을 줍니다.

원료약품 및 분량 (1정중)

■ 유효성분 :

푸르설티아민염산염(푸르설티아민으로서 50mg)(KP)	54.57mg
니코틴산아미드(KP)	20.0mg
피리독신염산염(KP)	50.0mg
시아노코발라민100배산(시아노코발라민으로서 500ug)(별규)	50.0mg
토코페롤아세테이트2배산(토코페롤아세테이트로서 100IU)(KP)	200.0mg
리보플라빈(KP)	5.0mg
폴산(USP)	0.25mg
판토텐산칼슘(KP)	15.0mg
γ-오리자놀(KP)	5.0mg

■ 기타 첨가제 : D-소르비톨, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 흰색(OY-S-7223), 오파드라이AMBB분홍색(88A640030), 오파드라이III 클리어(85F19250), 콜로이드성이산화규소, 푸마르산스테아릴나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스

성상 어두운 분홍색의 타원형 필름코팅정

Aro a

효능·효과

▶ 다음 경우의 비타민 E, B₁, B₂, B₆의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시
- 노년기

▶ 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

- 말초혈행장애 및 갱년기 시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기
- 눈의 피로

용법·용량

만 8세 이상 어린이·청소년 및 성인 :
1정 1일 1~2회 또는 1~2정 1일 1회 복용합니다

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 만 3개월 미만의 젖먹이
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 만 1세 미만의 젖먹이
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은변, 구내염(입안염)
 - 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
 - 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10ug 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - 고함량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
 - 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
 - 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

※ 개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나 직사광선이 닿는 곳에는 보관하지 마십시오.

※ 습기, 열, 빛은 약의 효과와 안정성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의 바랍니다.

저장 방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장 단위

60정/병, 120정(60정/병 X 2)

- 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- 이 설명서는 2019년 2월 15일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.
- 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

ILDONG 일동제약주식회사

본사 : 서울특별시 서초구 바우로27길 2

공장 : 경기도 안성시 공단1로 25

소비자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)