

조제용

위염, 위·십이지장궤양 치료제

마겐정

Almagate (알마게이트) 500mg

일반의약품
분류번호 234

500정

- 성분·함량 : 1정 중 유효성분 : 알마게이트(별규)..... 500mg
- 첨가제 : 마그네슘하이드록시드, 스테아르산마그네슘, 전분, 글리콜산나트륨, 폴리에틸렌옥사이드
- 성상 : 흰색의 장방형 정제
- 효능·효과 : 다음 질환의 증상 완화 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다, 속쓰림, 구역, 구토, 위통, 심트림
- 용법·용량 : 성인 및 12세 이상의 소아 : 알마게이트 1회 1g을 1일 3회, 식후 30분~1시간에 씹어서 경구 복용한다. 필요시 취침 전에 1회 더 복용할 수 있다.
- 사용상의 주의사항 : 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 이 약 또는 이 약의 구성 성분에 대해서 과민반응이 있는 환자

(주)시어스제약

- 2) 알츠하이머병 환자
- 3) 치질 환자
- 4) 혈액 저류(부기) 환자
- 5) 임신 중독증 환자
- 6) 설사 환자
- 7) 진단되지 않은 소화 기관 출혈 환자
- 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
테트라사이클린계 항생물질(함께 복용시 흡수를 억제할 수 있음)
- 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 : 이 약의 복합작용 또는 소화관내 체액의 pH 상승에 의해 함께 복용하는 약물의 흡수배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 복용한다.
 - (1) 비스테로이드소염진통제 (NSAID), 궤양 치료제, 디기탈리스 제제, 클로르프로마진, 란소프라졸, 프레드니솔론, 페니실린, 퀴놀론, 철(Fe)염 제제 : 흡수를 감소시킬 수 있으므로 2-3시간 간격을 두고 복용한다.
 - (2) 살리실산염 : 신장의 배설을 증가시킨다.
- 2) 신장에 환자 : 마그네슘 또는 알루미늄이 오랜 기간 동안에 걸쳐 콩팥에 축적될 수 있다. 심한 신장에 환자에게는 권고되지 않는다.
- 3) 신체 허약자, 인 함량이 낮은 식이 요법 실시자, 소화 흡수 장애가 있는 사람 : 이 약의 알루미늄이 인 흡수를 감소시키므로 장기간 복용할 경우, 혈중 인산염 함량 감소 및 뼈의 무기질 침착장애를 야기할 수 있음
- 4) 고령자
- 5) 혈액구토 또는 흑색 대변 등과 같은 소화 기관 출혈 증상이 있는 환자
- 6) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
- 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
상당시 가능한 한 이 침부문서를 소지할 것
 - 1) 소화기계 : 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사
 - 2) 2주 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것
- 6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것
 - 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것

- 제조자 : 한국코러스(주) / 충청북도 제천시 강저로 30
- 제조·외화자 : (주)시어스제약 / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 22, 3F (070-8822-7755)
- 포장단위 : 500정/병
- 저장방법 : 밀폐용기, 실온보관(1~30℃) ■ 사용기간 : 제조일로부터 36개월
- ※ 올바른 복용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우는 의사·약사와 상담하십시오.
- ※ 본 의약품은 "우수의약품제조관리기준(KGMP)"에 따라 엄격하게 품질관리를 실시한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태, 오염 또는 손상된 제품은 구입한 장소에서 교환하여 드립니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 본 라벨을 주의깊게 읽어주십시오.
- ※ 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관합니다.
- ※ 작성(개정)일 이후 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품 정보 정보는 온라인 의약품 도서관(drug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.

작성일자: 20018.10.29. (Ver.00)



제조번호 :
사용기한 :

50x20mm