

급 · 만성 기관지염
레드로프 정 60mg
(레보드로프로피진)

【원료약품의 분량】 1정 중

■ 유효성분 : 레보드로프로피진(EP) 60mg

■ 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물:소,사용부위:우유)

■ 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜 산나트륨, 콜로이드성이산화규소

【성상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】 다음 질환에서의 기침 : 급 · 만성기관지염

【용법·용량】 성인 : 레보드로프로피진으로서 1회 60mg을 1일 3회 적어도 6시간 간격을 두고 경구투여한다. 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 기관지 점액 분비 증가 환자
- 3) 점액섬모기능이상(카르타게너증후군, 섬모이상운동증) 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 5) 중증의 간장애 환자
- 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 중증 심부전 및 중증 신장부전 환자
- 2) 고령자
- 3) 만 2세 미만의 영아

3. 이상반응

- 1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
- 2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움
- 3) 순환기계 : 심계항진
- 4) 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응

4. 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작 시 주의하며, 특히 알코올과 병용 시 작용이 증대 될 수 있다.

5. 상호작용

예민한 환자에게 진정제와 병용투여 시 주의한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는다.

7. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질유지면에 서 바람직하지 않으므로 주의한다.

【저장방법 및 사용기한】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정, 300정

【제 조 자】 대한뉴팜(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 66

【제조외주자】 한국넬슨제약(주) 충북 음성군 금왕읍 금일로 271-8

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 반드시 설명서를 읽은 후 사용(복용)하시고, 설명서는 약과 함께 보관하십시오.

※ 이 첨부 문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 (02)588-0941에서 확인할 수 있습니다.

※ 제품의 유효기간은 외부용기에 표시되어 있습니다.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사 · 약사 또는 식품의약품안전처 (이지드럭 → 보고마당 → 안전성정보 → 의약품 유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 온라인 의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

최종개정일자 : 2018. 01. 30

판매원

NIELSON 한국넬슨제약

충북 음성군 금왕읍 금일로 271-8

소비자 상담실 (02)588-0941