

정코엠정 40mg 80mg

(은행염엑스)

일반의약품

분류번호: 219

기타의 순환계용약

[원료약품 및 그 분량]

정코엠정40mg 1정 중

- 유효성분 : 은행염엑스(생규) 40.0mg
- 첨가제(타르색소) : 청색 1호, 황색 203호
- 동물유래성분 : 유당수화물(소의 우유)
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이녹색 (85G41016), 크로스카르멜로오스나트륨, 탈크

정코엠정80mg 1정 중

- 유효성분 : 은행염엑스(생규) 80.0mg
- 첨가제(타르색소) : 청색 1호, 황색 203호
- 동물유래성분 : 유당수화물(소의 우유)
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이녹색 (85G41016), 크로스카르멜로오스나트륨, 탈크

[성상]

40mg : 연녹색의 장방형 필름코팅정제

80mg : 녹색의 장방형 필름코팅정제

[효능·효과]

1. 말초동맥순환장애(간헐성파행증(이따금 절뚝거림))의 치료
2. 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
3. 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애의 치료

[용법·용량]

성인

- 1) 말초동맥순환장애, 어지러움, 이명(귀울림): 은행염엑스로서 1회 40밀리그램 1일 3회 또는 1회 80밀리그램, 1일 2회 경구투여한다.(먹는다, 복용한다)
 - 2) 기질성 뇌기능장애 : 은행염엑스로서 1회 40mg-80mg 1일 3회 또는 1회 120mg 1일 2회 경구투여한다.(먹는다, 복용한다)
- 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 부작용

- 1) 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
- 2) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 어지러움
 - 가려움증

3. 일반적 주의

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다

4. 임부에 대한 투여

동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.

5. 소아에 대한 투여

소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 300정/병, 30정/병

[제조외국] 하나제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약단지 13-39

[제조자] (주)한국파마 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 87

※ 의약품용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 소손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 소비자 상담전화 : 080-577-8004(수신자 요금부담서비스)

작성 연월일 : 2018. 02. 06. <A01>



하니제약주식회사
하길공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약단지 13-39