프레빅스듀오캡슐

전문의약품

분류번호 : 218

【성분·함량】 1캡슐 중

- 유효성분 : 클로피도그렐황산염(클로피도그렐로서 75mg)(USP) 97.875mg
  아스피린장용캡슐(아스피린으로서 100mg)(NF) 122.0mg

【성 상】

환색 또는 미황색의 과립 및 상온고형인 캡슐을 함유하는 성, 취부 주형제의 공정성을

【효능·효과】

다음 질환이 있는 성인 환자에서 클로피도그렐과 아스피린을 동시에 투여하여야 하는 환자에만 사용한다.

- 급성관상동맥증후군(불안정형 협심증 또는 비Q파 심근경색 포함)에 있어서 : 최근 경상동맥스텐트(Stent) 시술을 하거나 시행치 않은 경우 및 관상동맥우회수술(CABG)을 받았거나 받을 환자에 포함되는 환자에서 혈전성 경색성 심장사망률의 감소를 인한 사망, 심근경색, 뇌졸중 또는 불량성 예후의 개선
- 한가지 이상의 혈전성 위험인자를 가지고 있고, 비타민 K 길항제(INR 투약가 적절하지 않으며, 출혈 위험이 낮은 생명시에 환자에서 뇌졸중을 포함한 죽상경화성 및 혈전색전증의 위험성 감소.

【용법·용량】

1일 1회 1캡슐 투여한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

① 이 약을 투여시 출혈의 위험이 더 걸리는 사건이 보통의 경우보다 오래 소요될 수 있으을 한자에게 알려주고, 출혈의심증상이 있는 지에는 자세히 알아보고 이를 주시하여 보고하도록 지도한다. 한자는 수술 계획 또는 새로운 약물을 처방하기 전에 이 약을 복용하고 있음을 의사에 지시하여야 알려야 한다.

② 혈전성 혈소판감소증 지연(TTP) : 클로피도그렐 사용 후에 드물게 TTP가 보고되었으며, 대부분 단기간 사용(2주 이내), 후에도 보고되었다. TTP는 특징적인 증상을 동반하는 혈소판 응집 및 혈전 형성을 특징으로 하는 심각한 질환이다. 혈소판감소증, 신기능 및 간기능 이상, 신경학적 증상, 발열 등 다양한 임상 증상이 나타나며 일시적 또는 영구적 신기능 부전이 나타나기도 한다. 치료는 혈장교환술, 혈소판 농축물 수혈 등 적절한 치료를 즉시 시행하여야 하며 이 질환은 치명적일 수 있으므로 즉시 중단하고 적절한 치료를 받도록 한다. 혈소판 농축물 수혈은 이 질환의 원인이 될 수 있으므로 금기이다. 이 약을 투여하기 전에 TTP의 기왕력 유무를 확인하고 이 질환이 있는 환자에게는 이 약을 투여하지 않는다.

③ 출혈 위험 : 클로피도그렐 사용 후에 출혈 위험이 증가되었으며 이 약을 투여하는 환자에서 출혈의 징후 및 증상을 주의하여 관찰하도록 한다. 이 약을 투여하는 환자에서 혈소판 기능 검사 또는 다른 약물 투여 시 출혈 위험이 높은 것을 의미하는 것일 수 있다. 수술 전 그리고 다른 항응고제 또는 다른 혈소판 응집 억제제를 투여하는 환자에서 출혈의 위험이 증가되는 것을 의미하는 것일 수 있다. 이 약을