규격	120x418	접지	미접지
종이	45모조	삼진기획	

전문의약품

휴로린타정 60밀리그램, 90밀리그램

(티카그렐러)

HT-210729

Hurorinta Tab. 60mg, 90mg

【원료약품 및 분량】 1정 중 60mg : 유효성분 : 티카그렐러(별규) -60mg / 기타첨가제 : D 만니톨, 무수인산수소칼슘, 오파드라이 분홍색 03B64000호, 인산수소칼슘수화물, 클로이드성이산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 폴리소르베이트80, 푸마르산스테아릴나트륨, 히프로멜로오스 / 90mg : 유효성분 : 티카그렐러(별규) -90mg / 기타첨가제 : D 만니톨, 무수인산수소칼슘, 오파드라이노란색03B62004호, 인산수소칼슘수화물, 클로이드성이산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 폴리소르베이트80, 푸마르산스테아릴나트륨, 히프로멜로오스 **【성 상】** 60mg : 분홍색의 원면이 볼록한 원형의 필름코팅정 / 90mg : 노란색의 원면이 볼록한 원형의 필름코팅정 **【효능 · 효과】** 다음의 성인 환자에서 아스피린과 병용하여, 혈전성 심혈관 사건(심혈관 사망으로 인한 사망, 심근경색 노출증의 발생률 감소 • 급성관상동맥증후군 • 심근경색의 병력(최소한 1년 이상 이전에 발생)이 있는 혈전성 심혈관 사건의 발생 위험이 높은 환자 **【용법 · 용량】** 이 약을 복용하는 환자는 특별한 금기가 없는 한 아스피린 유지용량(75~150mg)을 병용 투여하여야 한다. 이 약은 다른 ADP 수용체 저해제(클로피티린, 클로피도그렐, 프라수그렐)의 병용하지 않는다. • 급성관상동맥증후군 : 1회 180mg을 초회 투여하고, 이후에 1일 2회, 1회 90mg을 투여한다. 이 약의 투여 중단이 임상적으로 필요하지 않는 한 12개월간 투여를 권장한다. • 심근경색의 병력(최소 1년 이상 이전에 발생)이 있고 혈전성 심혈관 사건의 발생 위험이 높은 환자 : 1일 2회, 1회 60mg을 투여한다. 심근 경색 발생 후 초기 1년간 이 약 90mg 또는 다른 ADP 수용체 저해제(티클로피딘, 클로피도그렐, 프라수그렐)으로 투여를 계속할 수 있다. 이 약은 심근경색 후 2년 이내 또는 이전 ADP 수용체 저해제(티클로피딘, 클로피도그렐, 프라수그렐)를 중단한지 1년 이내의 환자에게도 투여를 시작할 수 있다. 이 약의 안전성 · 유효성은 추적관찰 3년 시점에서 평가되었다. / 투여방법 : 이 약은 경구 투여하며 식사와 관계없이 투여할 수 있다. • 정제를 삼키기 어려운 환자는 이 약을 고운 가루로 분쇄하고 물 반 컵에 분산시켜 그대로 마시고, 복용한 컵을 물 반 컵으로 행구어 다시 마신다. 이 혼합액은 코위관(CH9 이상)을 통해서도 투여할 수 있는데, 투여 후 물을 흘려 코위관을 행구어 주는 것이 중요하다. • 다른 항혈소판제제에 이 약으로 전환하고자 하는 경우, 이전 약물을 마지막으로 투여하고 24시간 후에 이 약의 투여를 시작해야 한다. • 이 복용을 놓친 경우는 다음 예정된 복용 시간에 1정만큼을 복용 용량을 복용하여야 한다. / 신장애 환자 : 신장애 환자에서 용량 조절은 필요하지 않다. 신장 투석 환자에서 이 약 투여에 대한 정보는 없으므로, 이러한 환자에서 이 약 투여는 권장되지 않는다. / 간장애 환자 : 경증의 간장애 환자에서 용량 조절은 필요하지 않다. 이 약은 중증의 간장애 환자에서 연구되지 않았으며, 중등증의 간장애 환자에게는 제한적인 투여 경험이 있다. / 소아 : 18세 미만의 소아 환자에 대한 안전성 · 유효성이 확립되어 있지 않다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고 : 티카그렐러는 다른 항혈전제들과 마찬가지로 유의하고, 때때로 치명적인 출혈을 유발할 수 있다; 빙리학적 활동성 출혈이 있는 환자나 두개내 출혈 병력이 있는 환자에게 이 약을 투여해서는 안 된다; 가능한 한 모든 수술 전 적어도 7일 전에 티카그렐러의 투여를 중단한다; 최근에 관상동맥조영술, 경피적 관상중재시술(PCI), 관상동맥로로우회술(CABG), 기타 외과적 수술을 받은 환자로, 이 약 투여시 저혈압 증상이 나타나면 출혈을 의심해야 한다; 가능하면 이 약의 투여를 중단하지 않고 출혈을 치료하도록 한다; 티카그렐러의 투여 중단 시, 심혈관 사건에 대한 위험이 증가한다;

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것 ① 이 약의 성분에 과민증이 있는 환자 ② 투약 당시 병적인 출혈에 소화성궤양, 두개내 출혈이 있는 환자 ③ 두개내 출혈의 병력이 있는 환자 ④ 중증 간장애 환자 5) 강한 CYP3A4 억제제에 케토코나졸, 클래리스로마이신, 네파조돈, 리토나비르, 아타자나비르를 투여 중인 환자(병용투여 시 티카그렐러의 과도한 노출 증가를 초래할 수 있다.) **3. 다음 환자에는 신중하게 투여할 것** ① 출혈 위험 증가 환자 : 출혈의 위험이 증가된 환자에서 이 약의 사용은 혈전성 심혈관 사건의 발생률 감소 이점과의 균형을 고려해야 한다. 임상적으로 다음에 해당하는 환자에게는 이 약을 신중하게 투여해야 한다. • 출혈 경향(예 최근의 외상, 최근의 수술, 응고장애, 위장관 출혈) 현재 있거나 최근 있었던 경우의 있는 환자. 병리학적 출혈이 있는 환자, 두개내 출혈의 병력이 있는 환자 및 중증의 간장애가 있는 환자에서 이 약 투여는 금기이다. • 출혈의 위험을 증가시킬 수 있는 약물을 병용하고 있는 환자(예: 이 약 투여 24시간 이내의 비스테로이드성 항염증 약물(NSAIDs), 경구 항응고제 및/또는 섬유소용해제, 고용량 아스피린) 외과적 치료 : 이 약을 투여하는 중 외과적술을 투여해야 하는 환자는 출혈 경향이 증가할 수 있으므로 주의해야 한다. 외과관과의 약물상호작용에 대한 연구가 수행되지 않았다. 혈소판 수혈의 지혈 작용상의 이점에 대한 이 약의 자료는 없다. 혈중의 이 약은 수혈된 혈소판을 저해할 수 있다. 데스모프레신과 이 약의 병용투여가 템플릿 출혈 시간을 감소시키지 않았기 때문에, 데스모프레신은 임상적 출혈 사례를 효과적으로 치유하지 못할 것으로 보인다. 항섬유소용해제 요법(아미노카프로산 또는 트라넥사민산) 및/또는 제조합 VIIa 혈액응고인자는 지혈을 증가시킬 수 있다. 이 약은 출혈의 원인이 확인 및 조절된 후 다시 투여를 시작할 수 있다. 2) 수술이 예정되어 있는 환자 : 수술이 예정되어 있거나 새로운 약물을 복용하기 전에 이 약을 복용하고 있는 환자는 의사 및 치과의사에게 알리도록 해야 한다. PLATO 연구에서 관상동맥회로우회술(CABG)이 예정된 환자에서 이 약은 수술 전 1일 이내에 중단될 경우 클로피도그렐보다 출혈의 증가하나 수술 전 2일 이상 중단될 경우에는 클로피도그렐과 비교하여 주요한 출혈에 있어 유사한 비율을 보였다. 수술이 예정되어 있으며 혈혈소판 효과를 기대하지 않는 경우에는 이 약의 투여는 수술 7일 전 중단되어야 한다. 3) 사혈성 증상의 위험이 있는 환자 : 초기 임상시험에서 주로 증상이 없는 심실 휴지기 관찰도렸기 때문에, 사혈성 증상의 위험이 증가된 환자에 동기능부전증후군 제도도 제도 방실 차단 혹은 사맥 관련 실신 환자 중 적절조율기가 없는 환자는 이 약의 안전성과 유효성을 평가하는 주요 시험에서 제외되었다. 따라서 이러한 환자들에서 임상적 경험이 제한적이므로 주의가 요구된다. 또한, 이 약과 사맥을 유발하는 것으로 알려진 다른 약물을 병용하는 경우에 주의해야 한다. 그러나 PLATO 연구에서 사맥을 유발하는 하나 이상의 약물(에 98% 베타차단제, 33% 칼슘채널길항제인 딜티아젬, 베라파밀, 4% 디곡신)과 병용 투여 후 임상적으로 유의한 이상반응이 관찰되었다는 증거는 없다. 4) 호흡곤란의 위험이 있는 환자 : 호흡곤란이 이 약 투여 환자에서 보고되었다. 증도는 일반적으로 경증~중등증이었으며 보통 치료 중단의 필요 없이 해결되었다. 천식/만성폐쇄성폐질환(COPD) 환자는 티카그렐러로 인한 호흡곤란을 나타낼 잠재적 위험이 높을 것으로 예상되므로 천식/COPD의 병력이 있는 환자는 이 약 투여 시 주의하여야 한다. 호흡곤란을 일으키는 원인은 명확히 밝혀져 있지 않다. 호흡곤란이 새롭게 발생하거나 호흡곤란이 있는 환자에서 연장 또는 악화가 보고되는 경우 이를 조사하여야 하며, 호흡곤란에 대한 내약성이 없는 경우에 이 약의 치료는 중단되어야 한다. 5) 혀혈성 노출증 환자 : 혀혈성 노출증을 경험한 급성관상동맥환자에게 이 약을 12개월 동안 투여할 수 있다. PEGASUS 연구에서는 혀혈성 노출증을 경험한 심근경색 병력을 가진 환자는 제외되어 사용경험이 없으므로, 1년 경과 후 이러한 환자에서의 사용은 권장되지 않는다. 6) 75세 이상 고령자, 중등증 및 중증 신장애 환자, 인지오틴신 II 수용체 저해제를 투여 중인 환자 : 크레아티닌은 이 약 투여 중 증가할 수 있다. 원인은 명확히 밝혀져 있지 않다. 투여 1개월 후에 신기능 검사를 하고 이후에는 일상적인 진료에 따라 수행하도록 하며, 특히 75세 이상 환자, 중등증 및 중증 신장애 환자, ARB와 병용하는 환자에서는 유의하도록 한다. 7) 고요산혈증 또는 통풍성 관절염의 병력이 있는 환자 : PLATO 연구에서 이 약 복용 환자는 클로피도그렐 복용 환자보다 고요산혈증의 위험이 높은 것으로 나타났다. 고요산혈증 또는 통풍성 관절염의 병력이 있는 환자는 이 약 투여 시 주의하도록 한다. 예방적 처치로서 요산강하병증이 있는 환자에서 이 약은 투여하지 않도록 한다. 8) 강한 CYP3A4 유도제 (예 리팜피신 페니토인, 카르바마제핀, 페노바르비탈)를 투여 중인 환자 : 병용 시 이 약의 노출 및 유효성에 감소를 초래할 수 있으므로 병용하지 않도록 한다. 9) 다곡신을 투여 중인 환자 : 이 약과 병용 시에는 면밀한 임상적 및 실험실적 모니터링이 권장된다. **4. 이상반응** 1) 안전성 프로파일 요약 : 이 약의 안전성 프로파일은 39,000명 이상의 환자가 참여한 대규모 3상 연구(PLATO와 PEGASUS)에서 평가되었다. PLATO 연구에서 급성관상동맥증후군 (불안정성 협심증, ST 분절 비상승 심근경색(NSTEMI) 또는 ST 분절 상승 심근경색(STEMI))의 환자에게 티카그렐러 투여 시 이상반응으로 인한 중단률(5.7%)가 클로피도그렐 투여 시(4.6%)보다 높았다. PEGASUS 연구에서 심근경색의 병력(최소 1년 이상 이전에 발생)과 혈전성 심혈관 사건을 발전시킬 높은 위험이 있는 환자에게 티카그렐러와 아스피린 병용 시 이상반응으로 인한 중단 빈도(티카그렐러 60밀리그램 투여 시 16.1%)가 아스피린 단독 투여 시(8.5%)보다 높았다. 이 약을 투여한 환자에서 가장 흔하게 보고된 이상반응은 출혈 및 호흡곤란이었다. 2) 이상 반응 요약표 : 티카그렐러 임상연구에서 확인된 이상반응은 MedDRA 기관계 분류에 따라 분류하였고, 발현빈도는 다음과 같이 분류하였다 : 매우 흔하게(≥1/10), 흔하게(≥1/100, 1/10), 흔하지 않게(≥1/1000, 1/100), 드물게(≥1/10,000, 1/1,000), 매우 드물게(<1/10,000), 빈도불명(현재의 자료로부터 예측할 수 없음) 다음의 이상반응이 이 약 투여 임상시험에서 관찰되었다(표 1).

표 1 – 임상연구에서 관찰된 이상반응의 발현빈도와 기관계별 목록

기관계	매우 흔하게	흔하게	흔하지 않게
양성, 악성 신생물 및 기타(낭종과 폴립 포함)			종양출혈[a]
혈액 및 림프계	혈액질환출혈[a]		
대사 및 영양	고요산혈증[c]	통풍	
정신			혼돈
신경계		어지러움(dizziness), 실신, 두통	두개내출혈
눈			안구출혈[a]
귀 및 내이		현기증(vertigo)	귀출혈
혈관계		저혈압	
호흡기계, 흉부 및 종격계	호흡곤란	호흡기계출혈[a]	
위장관계		위장관계출혈, 설사, 구역, 소화불량, 변비	후복막출혈
피부 및 피하조직		피하 또는 피부출혈[a], 발진, 가려움증	
근골격계 및 결합조직			근육출혈[a]
신장 및 비뇨기계		요로출혈	
생식기계			생식기계출혈
실험실적 수치		혈중크레아티닌상승[c]	
상처, 중독 및 시술 합병증		시술후출혈, 외상출혈	

[a] 예: 방광암, 위암, 직장암에서의 출혈 / [b] 예: 멍 경향 증가, 지발성 혈종, 출혈성 체질 / [c] 실험실 관찰 결과요소이 증가하여 정상 범위를 초과한 경우, 크레아티닌이 기저 대비 50%를 초과하여 증가한 경우로부터 추산 / [d] 예: 결막, 망막 수정체 출혈 / [e] 예: 비출혈, 객혈 / [f] 예: 잇몸 출혈, 직장 출혈, 위궤양 출혈 / [g] 예: 반상출혈, 피부 출혈, 정상출혈 / [h] 예: 혈뇨, 출혈성방광염 / [i] 예: 질 출혈, 혈정액증, 폐경 후 출혈 / [j] 예: 타박상, 외상 혈종, 외상 출혈 / 시판 후 경험 : 이 약의 시판 후 다음의 이상반응이 확인되었다. 이는 불특정 인구로부터 자발적으로 보고된 것이므로 신뢰성 있는 빈도를 예측하기는 어렵다. 면역계 : 혈관부종을 포함한 과민증 3 특정 이상반응 상세 기술 (i) 출혈 : PLATO 연구 결과 : PLATO 연구에서 출혈 사례의 전체 결과가 표 2에 제시되어 있다.

표 2 PLATO 연구의 전체 출혈 사례를 분석하여 Kaplan Meier 법으로 예측한 치료 시작 후 12개월에서의 출혈 발생률

	티카그렐러 90mg 1일 2회 KM% N=9235	클로피도그렐 75mg 1일 1회 KM% N=9186	P
PLATO 기준 전체 출혈	11.6	11.2	0.4336
PLATO 기준 주요한 치명적/생명을 위협하는 출혈	5.8	5.8	0.9388
PLATO 기준 CABG와 무관한 주요한 출혈	4.5	3.8	0.0264
PLATO 기준 시술과 무관한 주요한 출혈	3.1	2.3	0.0058
PLATO 기준 전체 주요한 + 경미한 출혈	16.1	14.6	0.0084
PLATO 기준 시술과 무관한 주요한 + 경미한 출혈	5.9	4.3	<0.0001
TIMI 기준 주요한 출혈	7.9	7.7	0.5669
TIMI 기준 주요한 + 경미한 출혈	11.4	10.9	0.3272

출혈 분류의 정의 : 주요한 치명적/생명을 위협하는 출혈 : 헤모글로빈이 50g/L 이상 감소 또는 4unit 이상의 적혈구 수혈이 필요한 출혈 또는 치명적 출혈 또는 두개내 출혈 또는 심장눌림증이 있는 심장막내 출혈 또는 혈액량감소 쇼크 또는 혈압상승제 또는 수술이 필요한 중증의 저혈압이 있는 출혈 / 기타의 주요한 출혈 : 헤모글로빈이 30~50g/L 감소, 또는 2~3unit의 적혈구 수혈이 필요한 출혈 또는 유의한 장애를 일으킬 수 있는 출혈 / 경미한 출혈 : 출혈로 치명 또는 치료하기 위한 의학적 처치가 필요한 출혈 / TIMI 기준 주요한 출혈 : 헤모글로빈이 50g/L 이상 감소하는 출혈 또는 두개내 출혈 / TIMI 기준 경미한 출혈 : 헤모글로빈이 30~50g/L 감소하는 출혈

티카그렐러와 클로피도그렐은 PLATO 기준 주요한 치명적/생명을 위협하는 출혈 PLATO 기준 전체 주요한 출혈 TIMI 기준 주요한 출혈 또는 TIM 기준 경미한 출혈표 2)의 비율에 있어 다르지 않았다. 그러나 클로피도그렐과 비교시 이 약에서 PLATO 기준 주요한 + 경미한 출혈이 더 많았다. PLATO 연구에서 치명적 출혈은 기의 없었다 : 티카그렐러 20명(0.2%) 및 클로피도그렐 23명(0.3%) / CABG 관련 출혈 : PLATO 연구에서 관상동맥회로우회술을 받은 1584명(코호트의 17%) 중에서 42%가 PLATO 기준 주요한 치명적/생명을 위협하는 출혈을 경험하였으며, 치료군 간의 차이는 없었다. 치명적 CABG 관련 출혈은 각 치료군에서 6명씩 발생하였다. / CABG와 무관한 출혈 및 시술과 무관한 출혈 : 티카그렐러과 클로피도그렐은 PLATO 기준 CABG와 무관한 주요한 치명적/생명을 위협하는 출혈에 있어 차이가 없었다. 그러나 PLATO 기준 전체 주요한 출혈, TIM 기준 주요한 출혈 및 TIM 기준 주요한 + 경미한 출혈은 티카그렐러에서 더 많았다. 이와 유사하게 또한 시술 관련 출혈을 제외하면 티카그렐러에서 클로피도그렐보다 출혈이 더 많았다(표 2). 시술과 무관한 출혈로 인한 사망률의 중단은 클로피도그렐(1.2% p<0.001)보다 이 약(2.9%)에서 더 많았다. / 두개내 출혈 : 티카그렐러(36명의 피험자)에서 27건(0.3%)에서 클로피도그렐(14 건, 0.2%)보다 시술과 무관한 두개내 출혈이 더 많았으며, 그 중, 이 약에서 11건의 출혈 사례 및 클로피도그렐에서 12건의 출혈 사례는 치명적이었다. 전체 치명적 출혈에 있어서 차이는 없었다. 나이, 성별, 체중, 인종, 지리학적 지역, 동반 질환 병용 요법 및 기존의 노출증 또는 일시적 허혈성 발작을 포함하는 병력은 전체 또는 PLATO 기준 시술과 무관한 주요한 출혈의 예측인자가 아니었다. 따라서 출혈에 대해서 위험이 높은 특정 집단은 없다. / PEGASUS 연구 결과 : PEGASUS 연구에서 출혈 사례의 전체 결과가 표 3에 제시되어 있다.

표 3 PEGASUS 연구의 전체 출혈 사례를 분석하여 Kaplan Meier 법으로 예측한 치료 시작 후 36개월에서의 출혈 발생률

	티카그렐러 60mg 1일 2회, (아스피린과 병용) KM% N=6959	위약 (아스피린 단독) KM% N=6996	P
TIM 기준 주요한 출혈	2.3	1.1	<0.0001
치명적 출혈	0.3	0.3	1.0000
두개내출혈	0.6	0.5	0.3130
TIM 기준 기타 주요한 출혈	1.6	0.5	<0.0001
TIM 기준 주요한 + 경미한 출혈	3.4	1.4	<0.0001
TIM 기준 주요한 + 경미한 + 의학적 주의가 요구되는 출혈	16.6	7.0	<0.0001
PLATO 기준 주요한 출혈	3.5	1.4	<0.0001
치명적/생명을 위협하는 출혈	2.4	1.1	<0.0001
PLATO 기준 기타 주요한 출혈	1.1	0.3	<0.0001
PLATO 기준 주요한 + 경미한 출혈	15.2	6.2	<0.0001

출혈 분류의 정의 : TIM 기준 주요한 출혈 : 치명적 출혈 또는 두개내출혈 또는 헤모글로빈 감소량 >50g/L이 동반된 임상적으로 명백한 출혈 또는 헤모글로빈 지료가 없는 경우 헤마토크릿 감소량 15% 이상 / 치명적출혈 : 7일 이내 사망을 직접적으로 유도하는 출혈 / 기타 TIM 기준 주요한 출혈 : 치명적출혈 및 두개내출혈을 제외한 TIM 기준 주요한 출혈 / TIM 기준 경미한 출혈 : 헤모글로빈 감소량이 30~50g/L으로서 임상적으로 확실한 출혈 / PLATO 기준 주요한 치명적/생명을 위협하는 출혈 : 헤모글로빈이 50g/L 이상 감소 또는 4unit 이상의 적혈구 수혈이 필요한 출혈 또는 치명적 출혈 또는 두개내 출혈 또는 심장눌림증이 있는 심장막내 출혈 또는 혈액량감소 쇼크 또는 혈압상승제 또는 수술이 필요한 중증의 저혈압이 있는 출혈 / PLATO 기준 기타 주요한 출혈 : 헤모글로빈이 30~50g/L 감소, 또는 2~3unit의 적혈구 수혈이 필요한 출혈 또는 유의한 장애를 일으킬 수 있는 출혈 / PLATO 기준 경미한 출혈 : 출혈을 멈추거나 치료하기 위해 의학적 시술이 요구되는 출혈

PEGASUS 연구에서 티카그렐러 60mg 1일 2회 병용 시 아스피린만 단독 투여했을 때보다 TIM 기준 주요한 출혈이 많았고, 치명적 출혈의 위험은 증가하지 않았으며 두개내출혈은 경미하게 증가한 것으로 나타났다. 연구 중 치명적 출혈은 티카그렐러 60mg 병용 군에서 11건(0.3%), 아스피린 단독 투여군에서 12건(0.3%)으로 많지 않았다. 티카그렐러 60mg 병용 군에서 TIM 기준 주요한 출혈의 위험이 증가한 것은 위장관계 시건 때문에 기타 주요한 출혈의 빈도가 높아진 것이 주원인이었다. 출혈 경향이 증가하는 상생은 TIM 기준 주요한 출혈, TIM 기준 주요한 또는 경미한 출혈 PLATO 기준 주요한 출혈 및 PLATO 기준 경미한 출혈에서 유사했다(표 3). 출혈로 인한 투약 중단은 티카그렐러 60mg 병용군(6.2%)에서 아스피린 단독 투여군(1.5%)보다 더 빈도가 높았으며, 이들 출혈의 대부분은 중증도가 낮은TIM 기준 의학적 주의가 요구되는 출혈로 분류) 비출혈, 멍, 혈종 등이었다. 티카그렐러 60mg의 출혈 프로파일은 TIM 기준 주요한 출혈 TIM 기준 주요한 출혈 또는 경미한 출혈 및 PLATO 기준 주요 출혈 사건에 대해에, 사전 정의된 여러 하위군에 있어 유사한 비율을 보였다. 수술이 예정되어 있으며 혈혈소판 효과를 기대하지 않는 경우에는 이 약의 투여는 수술 7일 전 중단되어야 한다. 3) 사혈성 증상의 위험이 있는 환자 : 초기 임상시험에서 주로 증상이 없는 심실 휴지기 관찰도렸기 때문에, 사혈성 증상의 위험이 증가된 환자에 동기능부전증후군 제도도 제도 방실 차단 혹은 사맥 관련 실신 환자 중 적절조율기가 없는 환자는 이 약의 안전성과 유효성을 평가하는 주요 시험에서 제외되었다. 따라서 이러한 환자들에서 임상적 경험이 제한적이므로 주의가 요구된다. 또한, 이 약과 사맥을 유발하는 것으로 알려진 다른 약물을 병용하는 경우에 주의해야 한다. 그러나 PLATO 연구에서 사맥을 유발하는 하나 이상의 약물(에 98% 베타차단제, 33% 칼슘채널길항제인 딜티아젬, 베라파밀, 4% 디곡신)과 병용 투여 후 임상적으로 유의한 이상반응이 관찰되었다는 증거는 없다. 4) 호흡곤란의 위험이 있는 환자 : 호흡곤란이 이 약 투여 환자에서 보고되었다. 증도는 일반적으로 경증~중등증이었으며 보통 치료 중단의 필요 없이 해결되었다. 천식/만성폐쇄성폐질환(COPD) 환자는 티카그렐러로 인한 호흡곤란을 나타낼 잠재적 위험이 높을 것으로 예상되므로 천식/COPD의 병력이 있는 환자는 이 약 투여 시 주의하여야 한다. 호흡곤란을 일으키는 원인은 명확히 밝혀져 있지 않다. 호흡곤란이 새롭게 발생하거나 호흡곤란이 있는 환자에서 연장 또는 악화가 보고되는 경우 이를 조사하여야 하며, 호흡곤란에 대한 내약성이 없는 경우에 이 약의 치료는 중단되어야 한다. 5) 혀혈성 노출증 환자 : 혀혈성 노출증을 경험한 급성관상동맥환자에게 이 약을 12개월 동안 투여할 수 있다. PEGASUS 연구에서는 혀혈성 노출증을 경험한 심근경색 병력을 가진 환자는 제외되어 사용경험이 없으므로, 1년 경과 후 이러한 환자에서의 사용은 권장되지 않는다. 6) 75세 이상 고령자, 중등증 및 중증 신장애 환자, 인지오틴신 II 수용체 저해제를 투여 중인 환자 : 크레아티닌은 이 약 투여 중 증가할 수 있다. 원인은 명확히 밝혀져 있지 않다. 투여 1개월 후에 신기능 검사를 하고 이후에는 일상적인 진료에 따라 수행하도록 하며, 특히 75세 이상 환자, 중등증 및 중증 신장애 환자, ARB와 병용하는 환자에서는 유의하도록 한다. 7) 고요산혈증 또는 통풍성 관절염의 병력이 있는 환자 : PLATO 연구에서 이 약 복용 환자는 클로피도그렐 복용 환자보다 고요산혈증의 위험이 높은 것으로 나타났다. 고요산혈증 또는 통풍성 관절염의 병력이 있는 환자는 이 약 투여 시 주의하도록 한다. 예방적 처치로서 요산강하병증이 있는 환자에서 이 약은 투여하지 않도록 한다. 8) 강한 CYP3A4 유도제 (예 리팜피신 페니토인, 카르바마제핀, 페노바르비탈)를 투여 중인 환자 : 병용 시 이 약의 노출 및 유효성에 감소를 초래할 수 있으므로 병용하지 않도록 한다. 9) 다곡신을 투여 중인 환자 : 이 약과 병용 시에는 면밀한 임상적 및 실험실적 모니터링이 권장된다. **4. 이상반응** 1) 안전성 프로파일 요약 : 이 약의 안전성 프로파일은 39,000명 이상의 환자가 참여한 대규모 3상 연구(PLATO와 PEGASUS)에서 평가되었다. PLATO 연구에서 급성관상동맥증후군 (불안정성 협심증, ST 분절 비상승 심근경색(NSTEMI) 또는 ST 분절 상승 심근경색(STEMI))의 환자에게 티카그렐러 투여 시 이상반응으로 인한 중단빈도(7.4%)가 클로피도그렐 투여 시(6.4%)보다 높았다. PEGASUS 연구에서 심근경색의 병력(최소 1년 이상 이전에 발생)과 혈전성 심혈관 사건을 발전시킬 높은 위험이 있는 환자에게 티카그렐러와 아스피린 병용 시 이상반응으로 인한 중단 빈도(티카그렐러 60밀리그램 투여 시 16.1%)가 아스피린 단독 투여 시(8.5%)보다 높았다. 이 약을 투여한 환자에서 가장 흔하게 보고된 이상반응은 출혈 및 호흡곤란이었다. 2) 이상 반응 요약표 : 티카그렐러 임상연구에서 확인된 이상반응은 MedDRA 기관계 분류에 따라 분류하였고, 발현빈도는 다음과 같이 분류하였다 : 매우 흔하게(≥1/10), 흔하게(≥1/100, 1/10), 흔하지 않게(≥1/1000, 1/100), 드물게(≥1/10,000, 1/1,000), 매우 드물게(<1/10,000), 빈도불명(현재의 자료로부터 예측할 수 없음) 다음의 이상반응이 이 약 투여 임상시험에서 관찰되었다(표 1).

기관계	매우 흔하게	흔하게	흔하지 않게
양성, 악성 신생물 및 기타(낭종과 폴립 포함)			종양출혈[a]
혈액 및 림프계	혈액질환출혈[a]		
대사 및 영양	고요산혈증[c]	통풍	
정신			혼돈
신경계		어지러움(dizziness), 실신, 두통	두개내출혈
눈			안구출혈[a]
귀 및 내이		현기증(vertigo)	귀출혈
혈관계		저혈압	
호흡기계, 흉부 및 종격계	호흡곤란	호흡기계출혈[a]	
위장관계		위장관계출혈, 설사, 구역, 소화불량, 변비	후복막출혈
피부 및 피하조직		피하 또는 피부출혈[a], 발진, 가려움증	
근골격계 및 결합조직			근육출혈[a]
신장 및 비뇨기계		요로출혈	
생식기계			생식기계출혈
실험실적 수치		혈중크레아티닌상승[c]	
상처, 중독 및 시술 합병증		시술후출혈, 외상출혈	

[a] 예: 방광암, 위암, 직장암에서의 출혈 / [b] 예: 멍 경향 증가, 지발성 혈종, 출혈성 체질 / [c] 실험실 관찰 결과요소이 증가하여 정상 범위를 초과한 경우, 크레아티닌이 기저 대비 50%를 초과하여 증가한 경우로부터 추산 / [d] 예: 결막, 망막 수정체 출혈 / [e] 예: 비출혈, 객혈 / [f] 예: 잇몸 출혈, 직장 출혈, 위궤양 출혈 / [g] 예: 반상출혈, 피부 출혈, 정상출혈 / [h] 예: 혈뇨, 출혈성방광염 / [i] 예: 질 출혈, 혈정액증, 폐경 후 출혈 / [j] 예: 타박상, 외상 혈종, 외상 출혈 / 시판 후 경험 : 이 약의 시판 후 다음의 이상반응이 확인되었다. 이는 불특정 인구로부터 자발적으로 보고된 것이므로 신뢰성 있는 빈도를 예측하기는 어렵다. 면역계 : 혈관부종을 포함한 과민증 3 특정 이상반응 상세 기술 (i) 출혈 : PLATO 연구 결과 : PLATO 연구에서 출혈 사례의 전체 결과가 표 2에 제시되어 있다.

표 2 PLATO 연구의 전체 출혈 사례를 분석하여 Kaplan Meier 법으로 예측한 치료 시작 후 12개월에서의 출혈 발생률

	티카그렐러 90mg 1일 2회 KM% N=9235	클로피도그렐 75mg 1일 1회 KM% N=9186	P
PLATO 기준 전체 출혈	11.6	11.2	0.4336
PLATO 기준 주요한 치명적/생명을 위협하는 출혈	5.8	5.8	0.9388
PLATO 기준 CABG와 무관한 주요한 출혈	4.5	3.8	0.0264
PLATO 기준 시술과 무관한 주요한 출혈	3.1	2.3	0.0058
PLATO 기준 전체 주요한 + 경미한 출혈	16.1	14.6	0.0084
PLATO 기준 시술과 무관한 주요한 + 경미한 출혈	5.9	4.3	<0.0001
TIMI 기준 주요한 출혈	7.9	7.7	0.5669
TIMI 기준 주요한 + 경미한 출혈	11.4	10.9	0.3272

출혈 분류의 정의 : 주요한 치명적/생명을 위협하는 출혈 : 헤모글로빈이 50g/L 이상 감소 또는 4unit 이상의 적혈구 수혈이 필요한 출혈 또는 치명적 출혈 또는 두개내 출혈 또는 심장눌림증이 있는 심장막내 출혈 또는 혈액량감소 쇼크 또는 혈압상승제 또는 수술이 필요한 중증의 저혈압이 있는 출혈 / 기타의 주요한 출혈 : 헤모글로빈이 30~50g/L 감소, 또는 2~3unit의 적혈구 수혈이 필요한 출혈 또는 유의한 장애를 일으킬 수 있는 출혈 / 경미한 출혈 : 출혈로 치명 또는 치료하기 위한 의학적 처치가 필요한 출혈 / TIMI 기준 주요한 출혈 : 헤모글로빈이 50g/L 이상 감소하는 출혈 또는 두개내 출혈 / TIMI 기준 경미한 출혈 : 헤모글로빈이 30~50g/L 감소하는 출혈

티카그렐러와 클로피도그렐은 PLATO 기준 주요한 치명적/생명을 위협하는 출혈 PLATO 기준 전체 주요한 출혈 TIMI 기준 주요한 출혈 또는 TIM 기준 경미한 출혈표 2)의 비율에 있어 다르지 않았다. 그러나 클로피도그렐과 비교시 이 약에서 PLATO 기준 주요한 + 경미한 출혈이 더 많았다. PLATO 연구에서 치명적 출혈은 기의 없었다 : 티카그렐러 20명(0.2%) 및 클로피도그렐 23명(0.3%) / CABG 관련 출혈 : PLATO 연구에서 관상동맥회로우회술을 받은 1584명(코호트의 17%) 중에서 42%가 PLATO 기준 주요한 치명적/생명을 위협하는 출혈을 경험하였으며, 치료군 간의 차이는 없었다. 치명적 CABG 관련 출혈은 각 치료군에서 6명씩 발생하였다. / CABG와 무관한 출혈 및 시술과 무관한 출혈 : 티카그렐러과 클로피도그렐은 PLATO 기준 CABG와 무관한 주요한 치명적/생명을 위협하는 출혈에 있어 차이가 없었다. 그러나 PLATO 기준 전체 주요한 출혈, TIM 기준 주요한 출혈 및 TIM 기준 주요한 + 경미한 출혈은 티카그렐러에서 더 많았다. 이와 유사하게 또한 시술 관련 출혈을 제외하면 티카그렐러에서 클로피도그렐보다 출혈이 더 많았다(표 2). 시술과 무관한 출혈로 인한 사망률의 중단은 클로피도그렐(1.2% p<0.001)보다 이 약(2.9%)에서 더 많았다. / 두개내 출혈 : 티카그렐러(36명의 피험자)에서 27건(0.3%)에서 클로피도그렐(14 건, 0.2%)보다 시술과 무관한 두개내 출혈이 더 많았으며, 그 중, 이 약에서 11건의 출혈 사례 및 클로피도그렐에서 12건의 출혈 사례는 치명적이었다. 전체 치명적 출혈에 있어서 차이는 없었다. 나이, 성별, 체중, 인종, 지리학적 지역, 동반 질환 병용 요법 및 기존의 노출증 또는 일시적 허혈성 발작을 포함하는 병력은 전체 또는 PLATO 기준 시술과 무관한 주요한 출혈의 예측인자가 아니었다. 따라서 출혈에 대해서 위험이 높은 특정 집단은 없다. / PEGASUS 연구 결과 : PEGASUS 연구에서 출혈 사례의 전체 결과가 표 3에 제시되어 있다.

표 3 PEGASUS 연구의 전체 출혈 사례를 분석하여 Kaplan Meier 법으로 예측한 치료 시작 후 36개월에서의 출혈 발생률

	티카그렐러 60mg 1일 2회, (아스피린과 병용) KM% N=6959	위약 (아스피린 단독) KM% N=6996	P
TIM 기준 주요한 출혈	2.3	1.1	<0.0001
치명적 출혈	0.3	0.3	1.0000
두개내출혈	0.6	0.5	0.3130
TIM 기준 기타 주요한 출혈	1.6	0.5	<0.0001
TIM 기준 주요한 + 경미한 출혈	3.4	1.4	<0.0001
TIM 기준 주요한 + 경미한 + 의학적 주의가