

일반 의약품
분류번호 : 322

위장장애가 적고 흡수율이 높은 빈혈치료제



(01)08806562049202

헐로큐 캡슐 ^{Fe}

[원료약품 및 분량] 1캡슐 중

- 유효성분 :
폴리사카리드철착염(KP) 326.1 mg (철(Fe)로서 150 mg)
시아노코발라민 1000배산(KP) 25 mg (시아노코발라민으로서 25 µg)
폴산(KP) 1 mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당(젓당)수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제 : 포비돈, 스테아르산마그네슘, 캡슐

[성상] 갈색의 가루가 든 상 · 하부 농갈색의 경질캡슐

[효능·효과] 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

[용법·용량] 성인 : 1일 1회, 1회 1캡슐을 복용

[사용상의 주의사항]

1. 경고

철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관한다. 만약 어린이가 사고로 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락한다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에는 과민반응 환자
- 12개월 미만의 영아
- 혈색소중(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증(조직장에는 일으키지 않으나 국소적 또는 전신적으로 조직의 (헤모시데린으로서의) 철 함유량이 증가한 상태) 환자
- 비철결핍성빈혈 (예 : 비타민 B₁₂ 결핍에 의한 거대적아구성 빈혈) 환자
- 이 약은 유당(젓당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 인산염, 칼슘염
- 경구용테트라사이클린계 제제
- 제산제

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차 및 우유 · 유제품은 복용 중, 복용후후에는 피할 것.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
- 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 신장예(신장장애) 환자
- 저빈혈증 환자
- 임부, 수유부
- 항알도스테론제, 트리암테렌과 함께 복용하는 사람(고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.)

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이 첨부 문서를 소지할 것.

- 때때로 흥분(붉은 반점), 피부질환, 가려움, 전신관대, 기관지에 의한 호흡 곤란 등의 알레르기 증상이 나타나는 경우
- 두드러기, 가려움, 햇빛에 의한 피부 과민반응
- 복부 · 위통증, 위 경련
- 구토, 설사
- 열, 혼수

- 구역, 식욕부진, 체중감소, 부종(부기), 복통(배아픔), 설사, 변비, 흑변, 위부 불쾌감
- 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
- 대량투여로 인해 복부 통증, 구토, 구역, 설사, 흑변, 토혈(혈액구토), 저혈압, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기), 빈맥(빠른맥), 대사성 산증, 고지혈증, 탈수, 졸음, 창백, 권태, 발작, 쇼크, 혼수

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
- 치료를 시작하기 전에 빈혈의 유형과 그 원인을 파악해야 한다. 빈혈은 혈액 손실과 같은 전신적인 장애에 의해 발생할 수 있으므로, 가능한 한 이러한 원인들이 먼저 치료되어야 한다.
- 이 약에 함유된 폴산은 악성빈혈이 있는 환자에 투여하면 혈액상태는 개선되지만 신경증상에 효과가 없으므로 악성빈혈의 환자에 투여하는 경우에는 비타민 B₁₂제제와 병용(함께복용(사용))한다. 다만, 진단이 확립되지 않은 악성빈혈이 있는 환자의 경우에 혈액상태의 개선에 의해 악성빈혈을 은폐하고 진단 및 치료에 영향을 주게 되므로 주의할 것.
- 아스코르브산(비타민 C) 200 mg 이상과 함께 복용하는 경우 철분의 흡수가 증가될 수 있다.

8. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관할 것.
- 오 · 남용(잘못사용 · 함부로 사용)을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

[포장단위] 60캡슐(10캡슐/PTP × 6), 120캡슐(60캡슐/BOX × 2)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[제조사] (주)레고켐제약 / 경기도 안성시 원곡면 원당로 354

- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

작성일 : 2019. 01. 07. (Rev.0)

(주)레고켐제약
LegoChemPharma