

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고요, 의약품과 함께보관하십시오.

전문의약품

분류번호 218

에이프록젠 로수바스타틴칼슘정 5밀리그램 (로수바스타틴칼슘)

원료약품 및 그 분량 1정 중

《에이프록젠로수바스타틴칼슘정5밀리그램》

■ 유효성분: 로수바스타틴칼슘(별규) 5.2mg (로수바스타틴으로서 5mg)

■ 첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물: 소, 사육부위: 우유)
■ 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 무수인산수소칼슘, 크로스보든, 스테아르산마그네슘, 오파드라이노라색(03B62323)

《에이프록젠로수바스타틴칼슘정10밀리그램》

■ 유효성분: 로수바스타틴칼슘(별규) 10.4mg (로수바스타틴으로서 10mg)

■ 첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물: 소, 사육부위: 우유)
■ 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 무수인산수소칼슘, 크로스보든, 스테아르산마그네슘, 오파드라이분홍색(03B54445)

성상

《에이프록젠로수바스타틴칼슘정5밀리그램》 노란색의 원형 필름코팅정제

《에이프록젠로수바스타틴칼슘정10밀리그램》 분홍색의 원형 필름코팅정제

효능·효과

- 원발성 고콜레스테롤혈증(type IIa), 복합형 고지혈증(type IIb): 식이 및 운동으로 조절이 안 될 경우 식이요법의 보조제
- 동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증에 식이요법이나 다른 자질지하요법(예:LDL 분리흡출법)의 보조제
- 고콜레스테롤혈증 환자에서 총콜레스테롤과 LDL-콜레스테롤을 목표 수준으로 낮추어 죽상동맥경화증의 진행을 지연
- 원발성 이상베타리포프로테인혈증(type III) 환자의 식이요법 보조제
- 심혈관 질환에 대한 위험성 감소: 관상동맥 실질현에 대한 임상적 증거는 없으나, 만 50세 이상의 남성 및 만 60세 이상의 여성으로 고감도 C-반응단백(high sensitive C-reactive protein, hsCRP)이 2mg/L 이상이며, 적어도 하나 이상의 추가적인 심혈관질환 위험 인자(예: 고혈압, 낮은 HDL-콜레스테롤치, 흡연 또는 조기 관상동맥 실질현의 가족력 등)를 가진 환자의
 - 뇌졸중에 대한 위험성 감소
 - 심근경색에 대한 위험성 감소
 - 동맥 혈관재형술에 대한 위험성 감소

용법·용량

- 원발성 고콜레스테롤혈증(type IIa), 복합형 고지혈증(type IIb) 원발성 이상베타리포프로테인혈증(type III) 및 동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증 이 약을 투여전 및 투여중단 환자는 표준 콜레스테롤 저하식을 하여야 하며, 이를 치료기간 동안 지속하여야 합니다. 식사와 상관없이 하루 중 아무때나 이 약을 투약할 수 있습니다. 초이용량은 1일 1회 5밀리그램이며, 더 많은 LDL-콜레스테롤치가 필요한 경우 유지용량으로 조절하여 투여할 수 있습니다. 유지용량은 1일 1회 10밀리그램으로 대부분의 환자는 이 용량에서 조절됩니다. 유지용량은 4주 또는 그 이상의 간격을 두고 LDL-콜레스테롤 수치, 치료목표 및 환자의 반응에 따라 적절히 조절하여야 하며, 1일 최대 20밀리그램 까지 증량할 수 있습니다.
- 노인: 용량조절이 필요하지 않습니다.
- 신부전환자: 경증 및 중등도 신부전 환자의 경우 용량을 조절할 필요가 없습니다. 중증의 신부전 환자에는 투여하지 않습니다. 중등도 신부전 환자에게 이 약 20밀리그램 투여 시 각별히 주의해야 합니다.
- 간부전환자: Child-Pugh 점수가 7이하인 경우에는 로수바스타틴의 전신 노출 증가가 나타나지 않았으나, Child-Pugh 점수가 8 또는 9인 환자에서는 증가하였습니다. 이러한 환자에서는 신기능 검사가 고려되어야 합니다. Child-Pugh 점수가 9를 초과하는 환자에 대한 투여 경험은 없습니다. 활동성 간질환 환자에는 이 약을 투여하지 않습니다.
- 인종: 아시아계 환자에게 이 약의 전신노출이 증가하기 때문에, 권장 초기 용량은 5밀리그램입니다. 40밀리그램 용량 투여는 금기입니다.
- 근병증에 걸리기 쉬운 환자: 근병증에 걸리기 쉬운 환자들의 권장 초기 용량은 5밀리그램입니다. 이러한 환자를 중 붓맞에게 이 약 40밀리그램 용량 투여는 금기입니다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 이 약의 구성성분에 과민증이 있는 환자
- 원인 불명의 지속적이나 불형 트랜스아미나제 상승 또는 정상 상한치의 3배를 초과하는 혈청트랜스아미나제 상승을 포함하는 활동성 간질환 환자
- 근경증환자
- 사이크로스포린 병용투여 환자
- 중증의 신부전의 신장제거 (creatinine clearance (CLcr)30mL/min)
- 임부 및 수유부: 적절한 피임 방법을 사용하지 않는 가임여성
 - 출산이 가능한 연령의 여성에 이 약을 투여시 임신하지 않을 가능성이 높은 경우와 태아에 대한 잠재적인 위험성에 대해 알려주었을 때만 투여합니다.
- 근병증/횡문근용해증에 걸리기 쉬운 환자들에게 이 약 40밀리그램 용량 투여는 금기입니다. 이러한 인자들은 아래와 같습니다.
 - 중등도의 신장예(크레아티닌 청소율 < 60mL/min) - 갑상선기능저하증
 - 유전적인 근질환 병력 또는 가족력이 있는 경우
 - 다른 HMG-CoA 전환효소 또는 피브레이트 계열 약물에 대한 근육 독성의 병력이 있는 경우
 - 알코올 중독 - 혈장 농도가 증가할 수 있는 상황
 - 아시아계 환자 - 피브레이트 계열 약물 병용투여
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로 이 약은 알코올을 과다 섭취하거나 간 질환의 병력이 있는 환자에 투여시 주의해야 합니다. 이 약 투여 시작 전 및 그 후 임상적 필요에 따라 반복하여 간효소 검사를 실시할 것을 권고합니다. 갑상선기능저하증이나 신증후군에 의한 2차적 고콜레스테롤혈증 환자는 이 약을 투여하기 전에 원인 질환을 치료해야 합니다.
- 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로 골격근에 대한 효과, 예를 들면, 근육통 및 근병증, 드물게 횡문근용해증이 이 약을 투여받은 환자에서 보고되었습니다. 이 약을

포함하여 스타틴을 복용 중이거나 중단한 환자에서, 면역매개성과사성근병증이 보고되었습니다. 면역매개성 근병증은 임상적 특징으로 근육 약화 및 혈중 CK(Creatine kinase)의 증가를 나타내며, 투여중지 이후에도 그 증상이 지속됩니다. 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로 근병증/횡문근용해증에 걸리기 쉬운 요인을 갖고 있는 다음의 환자에서는 치료의 위험성과 유익성이 고려되어야 하며, 임상 모니터링이 권장됩니다. 치료전에 CK(Creatine kinase)값이 기저수준에서 유의성있게 증가(정상 상한치의 5배 이상 증가)되어 있는 경우 치료를 시작해서는 안됩니다. - 신장애환자 - 갑상선기능저하증 - 유전적인 근질환의 병력 또는 가족력이 있는 경우 - 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제 또는 피브레이트에 대한 근육 독성의 병력이 있는경우 - 알코올 남용 - 70세 이상의 노인 - 혈장 농도가 증가할 수 있는 상황 - 피브레이트 계열 약물 병용투여

- 치료 중에는 특히 권태감이나 열과 관련이 있을 경우, 다른 이유로 설명되지 않는 근육 통이나 근육약화, 경련을 즉시 보고해야 합니다. 이러한 환자에서 CK치를 측정해야 하고이때 CK치가 현저히 상승되거나(정상 상한치의 5배 이상 증가), CK치가 정상 상한의 5배 이하로 증가한다 할지라도 근육 증상이 심하고 일상의 불편함을 야기한다면 이 약의 투여를 중단해야 합니다. 증상이 해결되고 CK치가 정상으로 돌아가면 면밀한 모니터링과 함께 이 약 또는 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제를 최저 용량으로 재시작할 것을 고려해야 합니다. 무증상인 환자에서 일반적인 CK치의 모니터링은 필요하지 않습니다.

- 측정 결과의 해석을 어렵게 할 수 있으므로 격렬한 운동 후나 CK값을 증가시킬 수 있는 기타 원인이 있는 경우는 CK를 측정하지 않도록 합니다. CK값이 기저상태에서 유의성 있게 증가(정상 상한치의 5배 이상 증가)한 경우 5~7일 내에 확증시험이 수행되어야 합니다. 시험 반복시에도 기저상태의 CK값이 정상 상한치의 5배 이상 증가한 경우 이 약을 투여하지 않습니다.
- 근병증이나, 횡문근용해증에 부차적인 신부전으로 악화될 것을 암시하는 급성 중증 상태(예를 들면, 패혈증, 저혈압, 대수소, 창상, 중증의 대사성/내분비성/전해질성 질환, 조절되지 않는 간질발작)에서는 이 약의 투여를 중단해야 합니다.
- 임상시험에서 이 약과 다른 약을 병용 투여한 소수의 환자에서 골격근에 대한 효과가 증가된 증거는 없습니다. 그러나 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제들의 경우, 피브린산 유도체(겐피보로질 포함, 사이크로스포린, 니코틴산, azole계 항진균제, protease 저해제, macrolide 항생제 등을 함께 투여받은 환자에서 근병과 근병증의 빈도가 증가했습니다. 겐피보로질은 HMG-CoA 환원효소 저해제와 병용시 근병증의 위험을 증가시킵니다. 따라서 이 약과 겐피보로질의 병용은 추천되지 않습니다. 이 약을 피브레이트나 니아신과 병용투여시 유의성과 위험성을 주의 깊게 평가하여야 합니다. 피브레이트 계열 약물과 병용투여할 때 이 약 40밀리그램 용량은 금기입니다.
- 고용량 특히 40밀리그램 복용 환자에서, dipstick 테스트에 의해 검출되는 대부분이 세뇨관 기원인 단백뇨가 관찰되었습니다. 이것은 일반적으로 일시적이고 급성 또는 진행성 신부전의 예측 인자는 아닙니다. 40밀리그램 투여 환자의 추가기간동안에는 신기능 검사를 고려하여야 합니다.
- 약동학시험에 참여한 코카시아인과비교아시아인에서 전신노출의 증가(AUC 및 Cmax의 중앙값이 약2배 증가가 나타났으므로 아시아인에게 용량절정시 이러한 사항을 고려하여야 합니다.
- 만 10~만 17세의 소아환자: 로수바스타틴을 복용한 소아 환자에서 Tanner staging에 의한이차성징 및선형성장(기), 체중, BMI(body mass index)의 평가는 1년으로 제한적입니다.

3. 이상반응

- 보고된 이상반응은 일반적으로 경미하고 일시적이었습니다. 이상반응으로 연구를 중단한 환자는 이 약 투여군중 4% 미만이었습니다. 이상반응의 발현빈도는 다음과 같이 분류하였습니다: 흔하게 (>1/100, (<1/10); 흔하지 않게 (>1/1,000, (<1/100); 드물게 (>1/10,000, (<1/1,000); 매우 드물게 (<1/10,000). 알려지지 않음 (발생할 수 있는 자료로부터는 추정할 수 없습니다.)

발현부위	증상별 발현빈도		
	흔하게	흔하지 않게	드물게
면역계			혈관부종을 포함한 과민 반응
내분비계	당뇨*		
신경계	두통, 어지러움		
위장관계	변비, 구역, 복통		해장염
피부 및 피하조직		가려움증, 발진 및 두드러기	
근골격계 및 결합조직	근육통		근육병증 (근육염 포함) 횡문근용해증
전신	무력증		

주1: JUPITER 임상시험에서 공복시 혈당치가 5.6 ~ 6.9 mmol/L 환자에서 가장 많이 보고된 이상반응(로수바스타틴 투여군 2.8%, 위약군 2.3% 보고)
다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로 용량 증가에 따라 이상반응이 증가하는 경향이 나타났습니다.
2) 신장애에 미치는 영향: Dipstick 테스트에 의해 검출되는 대부분이 세뇨관 기원인 단백뇨가 관찰되었습니다. 노년백이 음성 또는 국소량에서 ++ 이상으로 전환되는 현상이 10, 20밀리그램에서는 1%이며, 40밀리그램에서는 약 3%에서 나타났습니다. 노년백이 음성 또는 국소량에서 +로 약간 증가하는 것도 20밀리그램 용량에서 관찰되었습니다. 단백뇨는 대부분의 경우 치료 도중 감소하거나 자발적으로 사라졌으며 급성 또는 진행성 신부전의 예측 인자는 아닙니다. 이 약을 투여한 환자 및 임상시험자로부터 혈뇨가 관찰되었으나, 발현빈도는 낮았습니다.
3) 근골격계에 미치는 영향: 급성 신부전과 함께 또는 급성 신부전 없이 근골격계에 미치는 영향예: 근육통, 근육병증(근육염 포함), 드물게 횡문근용해증 등이 이 약 모든 용량의 치료환자 (특히 20밀리그램 이상에서) 보고되었습니다. 로수바스타틴을 투여받은 환자군에서 creatinine kinase(CK) 수치가 용량 의존적으로 증가하였습니다. 대부분의 경우 경미하고 무증상이었으며 일시적이었습니다. creatinine kinase(CK) 수치가 현저히 증가(정상상한의 5배 이상 증가하는 경우) 일시적으로 보고되었습니다. 로수바스타틴을 투여한 환자에서 트랜스아미나제치가 용량 의존적으로 증가하였습니다. 대부분의 경우 소수이고 무증상이었으며 일시적이었습니다.
4) 간에 미치는 영향: 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로, 이 약을 투여받은 경우 간에 대한 투여경험은 다음과 같습니다.
5) 국외 시판 후 경험
위의 이상반응에 더하여 다음의 이상반응이 시판 후 조사동안 보고되었습니다.
- 신장애: 매우 드물게 다발성신경병증, 기역상실, 말초신경병증 (빈도불명)
- 호흡기계 및 흉부: 기침, 호흡곤란 (빈도 불명) - 위장관계: 설사(빈도 불명)
- 혈액학적 장애: 혈소판감소증(빈도 불명)
- 간담도계: 매우 드물게 황달, 간염, 드물게 트랜스아미나제 증가
- 피부 및 피하조직 장애: 스티븐스-존슨 증후군(빈도 불명)
- 근골격계: 매우 드물게 관절통, 면역매개성 과사성 근병증(빈도 불명)
- 신장: 매우 드물게 혈뇨 - 기타: 부종 (빈도 불명)
일부 스타틴계열 약물과 관련하여 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있습니다.

- 정신신경계: 우울증, 수면장애(불면 및 악몽 포함) (빈도 불명)
- 호흡기계: 특히 장기투여시 간질성 폐질환과 같은 예외적 사례
- 비노생식기계: 성적 기능이상, 여성형유방증(빈도 불명)
- 간담도계: 치명적 및 비치명적 간부전
- 스타틴 사용과 관련하여 시판 후 인지장애가 드물게 보고되었습니다. (예, 기억력감퇴, 건망증, 기역상실증, 기역장애, 혼돈) 이러한 인지장애는 모든 스타틴 계열 약물에서 보고되었습니다. 이러한 보고들은 일반적으로 심각하지 않고 약을 사용중단 후 가역적이며, 증상발생 시점(1일~수 년) 및 증상개선(중간값이 3주)은 편차가 있습니다.
- 국내 시판 후 조사 결과
국내에서 재발사를 위하여 6년 동안 3,081명을 대상으로 실시한 사용성적조사 결과 인과관계에 상관없이 유해사례 발현율은 10.06%(310명, 415건)로 주로 두통 0.78% (24명, 24건), 어지러움 0.75%(23명, 23건), ALT증가 0.58%(18명, 18건), 가슴통증, 기침, 근육통이 각각 0.49%(15명, 15건)등이 보고되었고, 이 중 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 약물유해반응은 2.92%(90명, 106건)입니다.
보고된 약물유해반응으로는 ALT증가가 0.55%(17명, 17건)로 가장 많았고 근육통 0.42%(13명, 13건), 두통 0.30%(12명, 12건), CK증가 0.29%(9명, 9건), 어지러움 0.26%(8명, 8건), 변비, AST증가가 각각 0.16%(5명, 5명), 무력증, 관절통증이 각각 0.13%(4명, 4건), 피로, 무감각이 각각 0.10%(3명, 3건), 감각이상, 가슴불편함, 구역, 복통, 설사, 식욕부진, 복부팽만, 가려움증, 간기능검사이상(이) 각각 0.06%(2명, 2건), 실신, 전신통증, 근육경련, 통풍, 발기부전이 각각 0.03%(1명, 1건) 순으로 나타났습니다.
이 중 1명에서 나타난 근육통, 관절통증은 중대한 약물유해반응이었으며, 시판 전에 나타나지 않았던 예상하지 못한 약물유해반응으로는 관절통증 0.13%(4명, 4건), 피로, 무감각이 각각 0.10%(3명, 3건), 감각이상, 가슴불편함, 식욕부진, 복부팽만, 간기능검사이상(이) 각각 0.06%(2명, 2건), 실신, 전신통증, 근육경련, 통풍, 발기부전이 각각 0.03%(1명, 1건)으로 나타났고, 중대한도 예상하지 못한 약물유해반응으로 관절통증이 1건 보고되었습니다.
재발사 기간 동안 자발적으로 보고된 유해사례가 98건이 있었으며, 이 중 중대한도 예상하지 못한 약물유해반응으로 급성신부전이 2건, 핏노, 혈소판감소증, 혈중크레아티닌증가가 각각 1건씩 보고되었습니다.
- 만 10 ~ 만 17세의 소아환자
만 10 ~ 만 17세의 소아환자를 대상으로 실시한 52주 동안의 임상시험에서 운동 및 증가된 신체 활동 후 정상 범위의 상한치 10배를 초과하는(10 x ULN) creatinine kinase 수치 상승이 성인 환자에 비해 좀 더 빈번하게 관찰되었습니다. 다른 상황에 대해 소아 환자의 안전성 프로파일은 성인과 유사하였습니다.

4. 일반적 주의

- 간질성 폐질환: 일부 스타틴계열 약물과 관련하여 특히 장기 투여시 간질성 폐질환과 같은 이례적인 사례가 보고된 바 있습니다. 발현되는 양상으로는 호흡곤란, 가래가 없는 기침 및 일반적인 건강과 악화(피로, 체중감소 및 발열)가 포함될 수 있습니다. 환자가 간질성 폐질환으로의 발진이 의심될 경우에는 스타틴 약물 치료를 중단하여야 합니다.
- 이 약을 포함하여 스타틴 계열 약물을 복용한 환자에서 치명적 및 비치명적 간부전 관련 시판후 사례들이 드물게 보고되었습니다. 이 약 투여 중 임상적 증상이 있는 심각한 간 손상 및/또는 고빌리루빈혈증 또는 황달이 발생한 경우 즉시 치료를 중단합니다. 다른 병인이 발견되지 않은 경우 이 약을 재투여하지 않습니다.
- 이 약을 포함한 HMG-CoA 환원효소 억제제 투여시 HbA1c 및 공복 혈당 수치 증가가 보고되었습니다.
- 당뇨병: 항후 당뇨병이 발병할 위험성이 있는 몇몇 환자들에게서 적절한 당뇨병 치료를 요하는 과혈당증이 유발될 수 있다는 몇 가지 증거가 제시되었습니다. 그러나 스타틴 제제의 혈관성 위험성 감소효과는 이러한 위험성을 상회하므로 스타틴 치료 중단의 사유가 될 수 없습니다. 위험성이 있는 환자(공복혈당 5.6~6.9 mmol/L, BMI)30kg/m², 중성지질수치 상승, 고혈압)들은 진료지침에 따라 임상적 및 실험실적 수치 모니터를 실시해야 합니다. JUPITER 연구에서 공복혈당이 5.6~6.9 mmol/L인 환자들에게서 보고된 당뇨병 발생 빈도도는 로수바스타틴투여군에서 2.8%, 위약군에서 2.3%이었습니다.
- 유전적다형성: SLCO1B1 c.521TT 및 ABCG2 c.421CC와 비교하여 SLCO1B1(OATP1B1) c. 521CC 또는 ABCG2(BCRP) c.421AA의 유전형이 로수바스타틴의 노출(AUC) 증가와 관련있는 것으로 보고되었습니다. 유전적다형성에 따른 이 약의 안전성 및 유효성이 확립되진 않았으나, 환자의 치료반응 및 내약성에 따라 용량을 조절할 필요가 있습니다.

5. 상호작용

1) 다른 약물이 이 약에 미치는 영향

시험관 내 및 생체 내 시험결과에 따르면 이 약은 사이토크롬 P450과 임상적으로 유의한 상호 작용을 보이지 (기질, 저해제 또는 유도제로서 작용하지) 않습니다. 이 약은 간 흡수 약물수송체 OATP1B1과 유출수송체 BCRP 등 일부 수송체 단백질의 기질이 되며, 이 수송체 단백질의 저해제와 이 약을 병용하는 경우 이 약의 혈중 농도가 증가하여 근병증의 위험을 높일 수 있습니다 (아래 표 참조).
(다른 약물이 로수바스타틴의 노출 (AUC)에 미치는 영향 (발표된 임상 결과에 근거))

병용한 약물 요법	로수바스타틴 요법	로수바스타틴 AUC의 변화
사이클로스포린 75-200mg 1일 2회, 6개월간	10mg 1일 1회, 10일간	7.1배 증가
아티라나비어 300mg/ 리토나비어 100mg 1일 1회, 8일간	10mg, 2회투여	3.1배 증가
로파나비어 400mg/ 리토나비어 100mg 1일 2회, 17일간	20mg 1일 1회, 7일간	2.1배 증가
클로피도그렐 부하용량 300mg 투여 후 24시간 뒤 75 mg 투여	20mg, 2회투여	2배 증가
겐피보로질 600mg 1일 2회, 7일간	80mg, 2회투여	1.9배 증가
엘트롬보카 75 mg 2회투여, 5일간	10mg, 2회투여	1.6배 증가
다루나비어 600mg/ 리토나비어 100mg 1일 2회, 7일간	10mg 1일 1회, 7일간	1.5배 증가
티프라나비어 500 mg/ 리토나비어 200mg 1일 2회, 11일간	10mg, 2회투여	1.4배 증가
드로나데론 400mg 1일 2회	10mg	1.4배 증가
이트라코나졸 200mg 1일 1회, 5일간	10mg, 2회투여	1.4배 증가
에페디마브 10mg 1일 1회, 14일간	10mg, 1일 1회, 14일간	1.2배 증가
포셀프테라비어 700mg/ 리토나비어 100mg 1일 2회, 8일간	10mg, 2회투여	유익한차이 없음
알레글라타자 0.3mg, 7일간	40mg, 7일간	유익한차이 없음
실라피렌 140mg 1일 3회, 5일간	10mg, 2회투여	유익한차이 없음
페노피브레이트 67mg 1일 3회, 7일간	10mg, 7일간	유익한차이 없음
리렘핀 450mg 1일 1회, 7일간	20mg, 2회투여	유익한차이 없음
케토코나졸 200mg 1일 2회, 7일간	80mg, 2회투여	유익한차이 없음
플루코나졸 200mg 1일 1회, 11일간	80mg, 2회투여	유익한차이 없음
에트리트라마진 500mg 1일 4회, 7일간	80mg, 2회투여	20% 감소
비리칼핀 50mg 1일 3회, 14일간	20mg, 2회투여	47% 감소

기타 약물의 영향

-제산제: 수산화알루미늄, 수산화마그네슘을 함유하는 제산제와 이약을 병용투여한결과, 로수

바스타틴의 혈장 농도가 약 50% 감소되었습니다. 그러나 이 효과는 제산제를 이 약투여 2시간 후에 투여했을 때에 완화되었습니다. 이 상호작용의 임상적 관련성은 연구되지 않았습니다.
-무시딘산: 로수바스타틴과 무시딘산의 상호작용 연구는 수행된바 없습니다. 다른 스타틴 계열 약물과 마찬가지로, 시판 후 사용경험에서 로수바스타틴과 무시딘산을 병용했을 때 횡문근용해증을 포함하여 근육 관련 이상반응들이 보고된 바 있습니다. 따라서 로수바스타틴과 무시딘산의 병용은 권장되지 않습니다. 기능하디면 로수바스타틴의 투여를 일시적으로 중단하는 것이 권장되며, 투여가 불가피하다면 면밀한 모니터링을 해야 합니다.

2) 이 약이 다른 약물에 미치는 영향

-오파린: 이 약과 병용 시 오파린은 약물동태학적으로 유의한 영향을 받지 않습니다. 그러나 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로 이 약과 오파린을 병용 투여하면 오파린 단독 투여 시에 비해 INRI이 증가될 수 있습니다. 비타민K 길항제(예오파린)를 투여받고 있는 환자에서 이 약의 시작, 중단 또는 용량 조절 시 INR 모니터링이 권장됩니다. -사이클로스포린: 이 약과 사이클로스포린의 병용투여는 사이크로스포린의 혈중농도에 영향을 미치지 않습니다. -페노피브레이트/피브린산 유도제: 페노피브레이트와 로수바스타틴의 약물동태학적 상호작용은 관찰되지 않았으나, 약물동력학적 상호작용은 발생할 수 있습니다. 겐피보로질, 페노피브레이트, 다른 피브레이트 계열 약물 및 지질지하용량(1일 1kg 이상)의 니코틴산은 단독 투여했을 때 근병증을 일으킬 수 있기 때문에, HMG-CoA 환원효소 저해제와 병용투여했을 때 근병증 위험성을 증가시킵니다. 피브레이트 계열 약물을 병용투여할때 이 약 40mg 용량 투여는 금기이며, 투여 초기 용량으로 5 mg을 투여해야 합니다. -경구용 피임제: 경구용 피임제와 병용투여시, ethinyl oestradiol or norgestrel의 AUC가 각각 26%, 34% 증가되었습니다. 경구용 피임제의 용량 선택시 이러한 혈장 농도의 증가를 고려하여야 합니다. 이 약과 HRT를 병용하는 환자의 약동학 자료가 없으므로 유사한 효과를 배제하여서는 안됩니다. 임상시험시 여성에서 병용 투여가 많았으며 내약성은 우수하였습니다. - 기타 약물에의 영향: 다국산 또는 에페디마브와는 임상적으로 유의한 상호작용을 나타내지 않았습니다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

임신 및 수유부에 대한 이 약의 안전성은 확립되지 않았으므로 임신 또는 수유중에 사용하면 안 됩니다. 임신 가능성이 있는 여성은 적절한 피임법을 사용해야 합니다. 콜레스테롤 및 콜레스테롤합성 산물이 태아의 발달에 있어 필수적이므로 HMG-CoA 환원효소를 저해하여 발생하는 잠재적 위험성이 임신 중 치료에야 얻게 되는 유익성을 상회합니다. 동물시험에 의하면 재탄생식독성의 증거가 있습니다. 이 약을 사용하는 동안 임신을 할 경우 즉시 복용을 중단해야 합니다. 로수바스타틴은 젖의 모유로 이행됩니다. 사람에서의 모유로의 이행에 대한 데이터는 없습니다.

7. 과량투여시의 처치

과량 투여시 특별한 처치 방법은 없습니다. 과량 투여 시에는 대증요법 및 보조 치료가 행해져야 합니다. 간기능 및 CK치를 모니터링 해야 합니다. 혈액 투석은 도움이 되지 않는 것으로 보입니다.

8. 작용상의 주의

이 약이 운전이나 기계작동능력에 영향에 대한 시험이 수행되지 않았으나 약력학적 특성에 근거할 때 영향을 미치는 것으로는 보이지 않습니다. 운전이나 기계작동시 이 약 투여로 인하여 어지러울 수 있음을 고려하여야 합니다.

9. 기타

- 일반약리시험, 반복투여독성시험, 유전독성시험, 발암성시험에 근거한 전임상 자료에 의하면 사람에 대한 특별한 위험은 없습니다. 각도의 출생 전후 발생시험에서, 동복자 크기 감소, 동복자 무게 감소, 자태대 생중 종 생식 독성이 나타났습니다. 이러한 효과는 치료 용량의 수배에 해당하는 용량을 모체에 전신 투여하였을 때 나타났습니다.
- 약동학 시험에 의하면 아시아인(일본, 중국, 필리핀, 베트남, 한국)에서 코카시아인과 비교시 AUC 및 Cmax증강량이 약 2배 증가하였습니다. 인구의 지역적 약동학 분석에 의하면 코카시아인과 흑인에게 임상적으로 의미있는 약동학 차이는 없었습니다.

10. 의약품동등성시험 정보 주

가. 시험약 로수바스타틴칼슘정20밀리그램(대원제약주)과 대조약 크레스토정20밀리그램(로수바스타틴칼슘)한국아스트라제네카주)를 2×2 교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 공복시 단회 경구투여하여 47명의 혈중 로수바스타틴을 측정한 결과, 비교평가항목치(AUC, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90 %신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였습니다.

구분	비교평가항목		참고평가항목	
	AUC _{0-72h} (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	크레스토정20밀리그램(로수바스타틴칼슘)한국아스트라제네카주)	183.0±70.1	18.27±7.73(0.50~6.00)	12.66±3.33
시험약	로수바스타틴칼슘정20밀리그램(대원제약주)	193.0±66.2	19.50±7.10(1.00~6.00)	12.34±3.38
90 % 신뢰구간* (기증: log 0.8 ~ log 1.25)	log 1.0175 ~ 1.1113	log 1.0205 ~ 1.1537	-	-

(AUC, C_{max}, t_{1/2}: 평균값 ± 표준편차, T_{max}: 중앙값(범위), n = 47)

AUC: 투약시간부위 총초혈중농도 정방시간1/2치의 혈중농도-시간곡선면적하

C_{max}: 최고혈중농도 T_{max}: 최고혈중농도 도달시간 t_{1/2}: 말단 소실 반감기

* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치차의 90 %신뢰구간

나. 의약품동등성시험기준제7조제2항에 따라, 시험약 로수바스타틴칼슘정5밀리그램(대원제약주)은 대조약 로수바스타틴칼슘정20밀리그램(대원제약주)과의 비교용시험자료를 제출하였으며, 대조약과 용출상상이 동등하였다. 이에 따라 해당 자료로서 생물학적동등성을 입증하였습니다.

주1. 이 약은 대원제약주) 로수바스타틴칼슘정5밀리그램과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전 공정을 대원제약주)에 위탁 제조하였습니다.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

28정

취급상의 주의사항

※ 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국 개설 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2018년 03월 06일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인약도서관(http://drug.mfds.go.kr/) 의 '의약품검색' 에서 확인할 수 있습니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
☎ 소비자 상담실 (02)561-4011

※ **본 제품을 흡습성으로 인한 변질 가능성이 있으므로 반드시 PTP(Alu-Alu)포장재료를 조제 및 보관하여 주십시오.**

첨부문서 최종 개정연월일: 2018.03.06
1803-00
APOGEN 에 이 프 로 젠 제 약 (주) 경기도 화성시 양감면 두마리길 16
제조/유통자 - 에이프로젠제약(주) / 경기도 화성시 양감면 두마리길 16
제조사 - 대원제약(주) / 경기도 화성시 향남읍 제곡리1길 24