[전문의약품]

빠른 쾌유를 빕니다

브릴러정 90밀리그램

(티카그렐러)

[원료약품 및 분량] 이 약 1정 중,
유효성분 : 티카그렐러(별규) ····· 90.0mg
기타첨가제 : 스테아르산마그네슘, 인산수소칼슘수화물, 오파드라이Ⅱ라벨색(03B32376), 크로스카멜로오스나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스, D-만니톨

[성상] 노란색의 양면이 볼록한 원형의 필름코팅정

[효능·효과] 다음의 성인 환자에서 아스피린과 병용하여, 혈전성 심혈관 사건(심혈관 이상으로 인한 사망, 심근경색, 뇌졸중)의 발생률 감소
· 급성관상동맥증후군
· 심근경색의 병력(최소 1년 이상 이전에 발생)이 있는 혈전성 심혈관 사건의 발생 위험이 높은 환자

[용법·용량] 이 약을 복용하는 환자는 특별한 금기가 없는 한 아스피린 유지용량(75~150mg)을 병용 투여하여야 합니다. 이 약은 다른 ADP 수용체 저해제(티클로피딘, 클로피도그렐, 프라수그렐)와 병용하지 않습니다.
· 급성관상동맥증후군 : 1회 180mg을 초회 투여하고, 이후에 1일 2회, 1회 90mg을 투여합니다. 이 약의 투여 중단이 임상적으로 필요하지 않는 한 12개월간 투여를 권장합니다.
· 심근경색의 병력(최소 1년 이상 이전에 발생)이 있고 혈전성 심혈관 사건의 발생 위험이 높은 환자 : 1일 2회, 1회 60mg을 투여합니다.
– 심근 경색 발생 후 초기 1년간 이 약 90mg 또는 다른 ADP 수용체 저해제(티클로피딘, 클로피도그렐, 프라수그렐)를 복용하던 환자는 이 약 60mg으로 투여를 계속할 수 있습니다.
– 이 약은 심근경색 후 2년 이내 또는 이전 ADP 수용체 저해제(티클로피딘, 클로피도그렐, 프라수그렐)를 중단한지 1년 이내의 환자에게도 투여를 시작할 수 있습니다.
– 이 약의 안전성 · 유효성은 추적관찰 3년 시점에서 평가되었습니다.
투여방법
이 약은 경구 투여하며 식사와 관계없이 투여할 수 있습니다.
· 정제를 삼키기 어려운 환자는 이 약을 고운 가루로 분쇄하고 물 반 컵에 분산시켜 그대로 마시고, 복용한 컵을 물 반 컵으로 헹구어 다시 마십니다. 이 혼합액은 코위관 (CH8 이상)을 통해서도 투여될 수 있는데, 투여 후 물을 흘려 코위관을 헹구어 주는 것이 중요합니다.
· 다른 항혈소판제에서 이 약으로 전환하고자 하는 경우, 이전 약물을 마지막으로 투여하고 24시간 후 이 약의 투여를 시작해야 합니다.
· 약 복용을 놓친 경우는 다음 예정된 복용 시간에 1정만 (다음 복용 용량) 복용하여야 합니다.
신장애 환자
신장애 환자에서 용량 조절은 필요하지 않습니다. 신장 투석 환자에서 이 약 투여에 대한 정보는 없으므로, 이러한 환자에서 이 약 투여는 권장되지 않습니다.
간장애 환자
경증의 간장애 환자에서 용량 조절은 필요하지 않습니다. 이 약은 중증의 간장애 환자에서 연구되지 않았으며, 중등증의 간장애 환자에게는 제한적인 투여 경험이 있습니다.
소아
18세 미만의 소아 환자에 대한 안전성 · 유효성이 확립되어 있지 않습니다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고
티카그렐러는 다른 항혈전제들과 마찬가지로 유의하고, 때때로 치명적인 출혈을 유발할 수 있습니다. 병리학적 활동성 출혈이 있는 환자나 두개내 출혈 병력이 있는 환자에게 이 약을 투여해서는 안 됩니다. 가능한 한 모든 수술 전 적어도 7일 전에 티카그렐러의 투여를 중단합니다.
최근에 관상동맥조영술, 경피적 관상중재시술(PCI), 관상동맥최우회술(CABG), 기타 외과적 수술을 받은 환자로, 이 약 투여시 저혈압 증상이 나타나면 출혈을 의심해야 합니다. 가능하면 이 약의 투여를 중단하지 않고 출혈을 치료하도록 합니다. 티카그렐러의 투여 중단 시, 심혈관 사건에 대한 위험이 증가합니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
1) 이 약의 성분에 과민증이 있는 환자
2) 투약 당시 병적인 출혈(예 : 소화성궤양, 두개내 출혈)이 있는 환자
3) 두개내 출혈의 병력이 있는 환자
4) 중증 간장애 환자
5) 강한 CYP3A4 억제제 (예 : 케토코나졸, 클래리스로마이신, 네파조돈, 리토나비르, 아타자나비르) 를 투여 중인 환자 (병용투여 시 티카그렐러의 과도한 노출 증가를 초래할 수 있습니다.)

3. 다음 환자에는 신중하게 투여하십시오.
1) 출혈 위험 증가 환자 : 출혈의 위험이 증가된 환자에서 이 약의 사용은 혈전성 심혈관 사건의 발생률 감소 이점과의 균형을 고려해야 합니다. 임상적으로 다음에 해당하는 환자에게는 이 약을 신중하게 투여해야 합니다.
· 출혈 경향(예 : 최근의 외상, 최근의 수술, 응고장애, 위장관 출혈이 현재 있거나 최근 있었던 경우)이 있는 환자. 병리학적 출혈이 있는 환자, 두개내 출혈의 병력이 있는 환자 및 중증의 간장애가 있는 환자에서 이 약 투여는 금기입니다.
· 출혈의 위험을 증가시킬 수 있는 약물을 병용하고 있는 환자. (예 : 이 약 투여 24시간 이내의 비스테로이드성 항염증 약물 (NSAIDs), 경구 항응고제 및/또는 섬유소용해제, 고용량 아스피린)
– 외과적 치료 : 이 약을 투여하는 중 외과적술을 투여해야 하는 환자는 출혈 경향이 증가할 수 있으므로 주의해야 합니다. 외과리고의 약물상호작용에 대한 연구가 수행되지 않았습니다.
혈소판 수혈의 지혈 작용상의 이점에 대한 이 약의 자료는 없습니다. 혈중의 이 약은 수혈된 혈소판을 저해할 수 있습니다. 데스모프레신과 이 약의 병용투여가 템플릿-출혈 시간을 감소시키지 않았기 때문에, 데스모프레신은 임상적 출혈 사례를 효과적으로 처치하지 못할 것으로 보입니다.
항섬유소용해제 요법 (아미노카프론산 또는 트라넥사민산) 및/또는 제조합 VIIa 혈액응고인자는 지혈을 증가시킬 수 있습니다. 이 약은 출혈의 원인이 확인 및 조절된 후 다시 투여를 시작할 수 있습니다.
2) 수술이 예정되어 있는 환자 : 수술이 예정되어 있거나 새로운 약물을 복용하기 전에 이 약을 복용하고 있는 환자는 의사 및 치과의사에게 알리도록 해야 합니다.
PLATO 연구에서 관상동맥최우회술 (CABG)이 예정된 환자에서 이 약은 수술 전 1일 이내에 중단될 경우 클로피도그렐보다 출혈이 증가하나 수술 전 2일 이상 중단될 경우에는 클로피도그렐과 비교하여 주요한 출혈에 있어 유사한 비율을 보였습니다. 수술이 예정되어 있으며 항혈소판 효과를 기대하지 않는 경우에는 이 약의 투여는 수술 7일 전 중단되어야 합니다.
3) 서맥성 증상의 위험이 있는 환자 : 초기 임상시험에서 주로 증상이 없는 심실 휴지가 관찰되었기 때문에, 서맥성 증상의 위험이 증가된 환자 (예 : 동기능부전증후군, 제2도 또는 제3도 방실 차단 혹은 서맥 관련 실신 환자 중 박동조율기가 없는 환자)는 이 약의 안전성과 유효성을 평가하는 주요 시험에서 제외되었습니다. 따라서 이러한 환자들에서 임상적 경험이 제한적이므로 주의가 요구됩니다.
또한, 이 약과 서맥을 유발하는 것으로 알려진 다른 약물을 병용하는 경우에 주의해야 합니다. 그러나 PLATO 연구에서 서맥을 유발하는 하나 이상의 약물 (예 : 96% 베타차단제, 33% 칼슘채널길항제인 딜티아젬, 베라파밀, 4% 디곡신)과 병용 투여 후 임상적으로 유의한 이상반응이 관찰되었다는 증거는 없습니다.
4) 호흡곤란의 위험이 있는 환자 :
호흡곤란이 이 약 투여 환자에서 보고되었습니다. 강도는 일반적으로 경증~중등증이었으며 보통 치료 중단의 필요 없이 해결되었습니다. 천식/만성폐쇄성폐질환(COPD) 환자는 티카그렐러로 인한 호흡곤란을 나타낼 절대적 위험이 높을 것으로 예상되므로 천식/COPD의 병력이 있는 환자는 이 약 투여 시 주의하여야 합니다. 호흡곤란을 일으키는 원인은 명확히 밝혀져 있지 않습니다. 호흡곤란이 새롭게 발생하거나 호흡곤란이 있는 환자에서 연장 또는 악화가 보고되는 경우 이를 조사하여야 하며, 호흡곤란에 대한 내약성이 없는 경우에 이 약의 치료는 중단되어야 합니다.
5) 혀혈성 뇌졸중 환자
혀혈성 뇌졸중을 경험한 급성관상동맥환자에게 이 약을 12개월 동안 투여할 수 있습니다. PEGASUS 연구에서는 혀혈성 뇌졸중을 경험한 심근경색 병력을 가진 환자는 제외되어 사용경험이 없으므로, 1년 경과 후 이러한 환자에서의 사용은 권장되지 않습니다.
6) 75세 이상 고령자, 중등증 및 중증 신장애 환자, 안지오텐신 II 수용체 저해제를 투여 중인 환자 : 크레아티닌은 이 약 투여 중 증가할 수 있습니다. 원인은 명확히 밝혀져 있지 않습니다. 투여 1개월 후에 신기능 검사를 하고 이후에는 일상적인 진료에 따라 수행하도록 하며, 특히 75세 이상 환자, 중등증 및 중증 신장애 환자, ARB와 병용하는 환자에서는 유의하도록 합니다.
7) 고요산혈증 또는 통풍성 관절염의 병력이 있는 환자 : PLATO 연구에서 이 약 복용 환자는 클로피도그렐 복용 환자보다 고요산혈증의 위험이 높은 것으로 나타났습니다. 고요산혈증 또는 통풍성 관절염의 병력이 있는 환자는 이 약 투여 시 주의하도록 합니다. 예방적 처치로서 요산산염증이 있는 환자에서 이 약은 투여하지 않도록 합니다.
8) 강한 CYP3A4 유도제 (예 : 리팜피신, 페니토인, 카르바마제핀, 페노바르비탈)를 투여 중인 환자 : 병용 시 이 약의 노출 및 유효성에 감소를 초래할 수 있으므로 병용하지 않도록 합니다.
9) 디곡신을 투여 중인 환자 : 이 약과 병용 시에는 면밀한 임상적 및 실험실적 모니터링이 권장됩니다.

4. 이상반응
1) 안전성 프로파일 요약
이 약의 안전성 프로파일은 39,000명 이상의 환자가 참여한 대규모 3상 연구 (PLATO와 PEGASUS)에서 평가되었습니다. PLATO 연구에서 급성관상동맥증후군 [불안정성 협심증, ST 분절 비상승 심근경색(NSTEMI) 또는 ST 분절 상승 심근경색(STEMI)]이 있는 환자에게 티카그렐러 투여 시, 이상반응으로 인한 중단빈도(7.4%)가 클로피도그렐 투여 시(5.4%)보다 높았습니다. PEGASUS 연구에서 심근경색의 병력(최소 1년 이상 이전에 발생)과 혈전성 심혈관 사건을 발전시킬 높은 위험이 있는 환자에게 티카그렐러와 아스피린 병용 시, 이상반응으로 인한 중단 빈도(티카그렐러 60밀리그램 투여 시 16.1%)가 아스피린 단독 투여 시(8.5%)보다 높았습니다.
이 약을 투여한 환자에서 가장 흔하게 보고된 이상반응은 출혈 및 호흡곤란이었습니다.
2) 이상 반응 요약표
티카그렐러 임상연구에서 확인된 이상반응은 MedDRA 기관계 분류에 따라 분류하였고, 발현빈도는 다음과 같이 분류하였습니다 : 매우 흔하게 (≥1/10), 흔하게 (≥1/100, 1/10), 흔하지 않게 (≥1/1000, 1/100), 드물게 (≥1/10,000, 1/1,000), 매우 드물게 (<1/10,000), 빈도불명(현재의 자료로부터 예측할 수 없음)
다음의 이상반응이 이 약 투여 임상시험에서 관찰되었습니다 (표 1).
표 1 - 임상연구에서 관찰된 이상반응의 발현빈도와 기관계별 목록

기관계	매우 흔하게	흔하게	흔하지 않게
양성, 악성 신생물 및 기타(낭종과 폴립 포함)			종양출혈[a]
혈액 및 림프계	혈액질환출혈[b]		
대사 및 영양	고요산혈증[c]	통풍	
정신			혼돈
신경계		어지러움(dizziness), 실신, 두통	두개내출혈
눈			안구출혈[d]
귀 및 내이		현기증(vertigo)	귀출혈
혈관계		저혈압	
호흡기계, 흉부 및 종격계	호흡곤란	호흡기계출혈[e]	
위장관계		위장관계출혈[f], 설사, 구역, 소화불량, 변비	후복막출혈
피부 및 피하조직		피하 또는 피부출혈[g], 발진, 가려움증	
근골격계 및 결합조직			근육출혈[h]
신장 및 비뇨기계		요로출혈	
생식기계			생식기계출혈
실험실적 수치		혈중크레아티닌상승[c]	
상처, 중독 및 시술 합병증		시술후출혈, 외상출혈[k]	

a 예 : 방광암, 위암, 직장암에서의 출혈
b 예 : 멍 경향 증가, 자발성 혈종, 출혈성 체질
c 실험실 관찰 결과 (요산이 증가하여 정상 범위를 초과한 경우, 크레아티닌이 기저 대비 50%를 초과하여 증가한 경우)로부터 추산
d 예 : 결막, 망막, 수정체 출혈
e 예 : 비출혈, 객혈
f 예 : 잇몸 출혈, 직장 출혈, 위궤양 출혈
g 예 : 반상출혈, 피부 출혈, 점상출혈
h 예 : 출혈관절증, 근육 출혈
i 예 : 혈뇨, 출혈방광염
j 예 : 질 출혈, 혈정액증, 폐경 후 출혈
k 예 : 타박상, 외상 혈종, 외상 출혈
시판 후 경험
이 약의 시판 후 다음의 이상반응이 확인되었습니다. 이는 불특정 인구로부터 자발적으로 보고된 것이므로 신뢰성 있는 빈도를 예측하기는 어렵습니다.
– 면역계 : 혈관부종을 포함한 과민증
3) 특정 이상반응 상세 기술
① 출혈
PLATO 연구 결과
PLATO 연구에서 출혈 사례의 전체 결과가 표 2에 제시되어 있습니다.
표 2 – PLATO 연구의 전체 출혈 사례를 분석하여 Kaplan–Meier 법으로 예측한 치료 시작 후 12개월에서의 출혈 발생률

	티카그렐러 90mg 1일 2회 KM% N=9235	클로피도그렐 75mg 1일 1회 KM% N=9186	P
PLATO 기준 전체 출혈	11.6	11.2	0.4336
PLATO 기준 주요한 치명적/생명을 위협하는 출혈	5.8	5.8	0.6988
PLATO 기준 CABG와 무관한 주요한 출혈	4.5	3.8	0.0264
PLATO 기준 시술과 무관한 주요한 출혈	3.1	2.3	0.0058
PLATO 기준 전체 주요한 + 경미한 출혈	16.1	14.6	0.0084
PLATO 기준 시술과 무관한 주요한 + 경미한 출혈	5.9	4.3	<0.0001
TIMI-기준 주요한 출혈	7.9	7.7	0.5669
TIMI-기준 주요한 + 경미한 출혈	11.4	10.9	0.3272

출혈 분류의 정의 :
주요한 치명적/생명을 위협하는 출혈 : 혜모글로빈이 50 g/L 이상 감소 또는 4 unit 이상의 적혈구 수혈이 필요한 출혈 또는 치명적 출혈 또는 두개내 출혈 또는 심장눌림증이 있는 심장막내 출혈 또는 혈액량감소 쇼크 또는 혈압상승제 또는 수술이 필요한 중증의 저혈압이 있는 출혈
기타의 주요한 출혈 : 혜모글로빈이 30–50 g/L 감소, 또는 2–3 unit의 적혈구 수혈이 필요한 출혈 또는 유의한 장애를 일으킬 수 있는 출혈
경미한 출혈 : 출혈을 지혈 또는 치료하기 위한 의학적 처치가 필요한 출혈
TIMI 기준 주요한 출혈 : 혜모글로빈이 50 g/L 이상 감소하는 출혈 또는 두개내 출혈
TIMI 기준 경미한 출혈 : 혜모글로빈이 30–50 g/L 감소하는 출혈

티카그렐러와 클로피도그렐은 PLATO 기준 주요한 치명적/생명을 위협하는 출혈, PLATO 기준 전체 주요한 출혈, TIMI 기준 주요한 출혈 또는 TIMI 기준 경미한 출혈 (표 2)의 비율에 있어 다르지 않았습니다. 그러나 클로피도그렐과 비교시 이 약에서 PLATO 기준 주요한 + 경미한 출혈이 더 많았습니다. PLATO 연구에서 치명적 출혈은 거의 없었습니다: 티카그렐러 20명 (0.2%) 및 클로피도그렐 23명 (0.3%).
CABG-관련 출혈 : PLATO 연구에서 관상동맥최우회술을 받은 1584명 (코호트의 12%) 중에서 42%가 PLATO 기준 주요한 치명적/생명을 위협하는 출혈을 경험하였으며, 치료군 간의 차이는 없었습니다. 치명적 CABG 관련 출혈은 각 치료군에서 6명씩 발생하였습니다.

CABG와 무관한 출혈 및 시술과 무관한 출혈 :
티카그렐러와 클로피도그렐은 PLATO 기준 CABG와 무관한 주요한 치명적/생명을 위협하는 출혈에 있어 차이가 없었습니다. 그러나 PLATO 기준 전체 주요한 출혈, TIMI 기준 주요한 출혈 및 TIMI 기준 주요한 + 경미한 출혈은 티카그렐러에서 더 많았습니다. 이와 유사하게, 모든 시술 관련 출혈을 제외한면 티카그렐러에서 클로피도그렐보다 출혈이 더 많았습니다 (표 2). 시술과 무관한 출혈로 인한 시혐약의 중단은 클로피도그렐(1.2% ; p<0.001)보다 이 약(2.9%) 에서 더 많았습니다.
두개내 출혈 : 티카그렐러(26명의 피험자에서 27건, 0.3%)에서 클로피도그렐 (14건, 0.2%)보다 시술과 무관한 두개내 출혈이 더 많았으며, 그 중, 이 약에서 11건의 출혈 사례 및 클로피도그렐에서 1건의 출혈 사례는 치명적이었습니다. 전체 치명적 출혈에 있어서 차이는 없었습니다.
나이, 성별, 체중, 인종, 지리학적 지역, 동반 질환, 병용 요법 및 기존의 뇌졸중 또는 일시적 허혈성 발작을 포함하는 병력은 전체 또는 PLATO 기준 시술과 무관한 주요한 출혈의 예측인자가 아니었습니다. 따라서 출혈에 대해서 위험이 높은 특정 집단은 없습니다.
PEGASUS 연구 결과
PEGASUS 연구에서 출혈 사례의 전체 결과가 표 3에 제시되어 있습니다.
표 3 – PEGASUS 연구의 전체 출혈 사례를 분석하여 Kaplan–Meier 법으로 예측한 치료 시작 후 36개월에서의 출혈 발생률

	티카그렐러 60mg 1일 2회, (아스피린과 병용) KM% N=6958	위약 (아스피린 단독) KM% N=6996	P
TIMI 기준 주요한 출혈	2.3	1.1	<0.0001
치명적 출혈	0.3	0.3	1.0000
두개내출혈	0.6	0.5	0.3130
TIMI 기준 기타 주요한 출혈	1.6	0.5	<0.0001
TIMI 기준 주요한 + 경미한 출혈	3.4	1.4	<0.0001
TIMI 기준 주요한 + 경미한 + 의학적 주의가 요구되는 출혈	16.6	7.0	<0.0001
PLATO 기준 주요한 출혈	3.5	1.4	<0.0001
치명적/생명을 위협하는 출혈	2.4	1.1	<0.0001
PLATO 기준 기타 주요한 출혈	1.1	0.3	<0.0001
PLATO 기준 주요한 + 경미한 출혈	15.2	6.2	<0.0001

출혈 분류의 정의 :
TIMI 기준 주요한 출혈 : 치명적 출혈 또는 두개내출혈 또는 헤모글로빈 감소량 >50g/L이 동반된 임상적으로 명백한 출혈, 또는 헤모글로빈 자료가 없는 경우 헤마토크릿 감소량 15% 이상
치명적출혈 : 7일 이내 사망을 직접적으로 유도하는 출혈
기타 TIMI 기준 주요한 출혈 : 치명적출혈 및 두개내출혈을 제외한 TIMI 기준 주요한 출혈
TIMI 기준 경미한 출혈 : 헤모글로빈 감소량이 30–50g/L으로서 임상적으로 확실한 출혈
PLATO 기준 주요한 치명적/생명을 위협하는 출혈 : 헤모글로빈이 50 g/L 이상 감소 또는 4 unit 이상의 적혈구 수혈이 필요한 출혈 또는 치명적 출혈 또는 두개내 출혈 또는 심장눌림증이 있는 심장막내 출혈 또는 혈액량감소 쇼크 또는 혈압상승제 또는 수술이 필요한 중증의 저혈압이 있는 출혈
PLATO 기준 기타 주요한 출혈 : 헤모글로빈이 30–50 g/L 감소, 또는 2–3 unit의 적혈구 수혈이 필요한 출혈 또는 유의한 장애를 일으킬 수 있는 출혈
PLATO 기준 경미한 출혈 : 출혈을 멈추거나 치료하기 위해 의학적 시술이 요구되는 출혈

PEGASUS 연구에서 티카그렐러 60mg 1일 2회 병용 시, 아스피린만 단독 투여했을 때보다 TIMI 기준 주요한 출혈이 많았고, 치명적 출혈의 위험은 증가하지 않았으며 두개내출혈은 경미하게 증가한 것으로 나타났습니다. 연구 중 치명적 출혈은 티카그렐러 60mg 병용 군에서 11건 (0.3%), 아스피린 단독 투여군에서 12건 (0.3%)으로 많지 않았습니다. 티카그렐러 60mg 병용 군에서 TIMI 기준 주요한 출혈의 위험이 증가한 것은 위장관계 사건 때문에 기타 주요한 출혈의 빈도가 높아진 것이 주원인이었습니다.
출혈 경향이 증가하는 양상은 TIMI 기준 주요한 출혈, TIMI 기준 주요한 또는 경미한 출혈, PLATO 기준 주요한 출혈 및 PLATO 기준 경미한 출혈에서 유사했습니다 (표 3). 출혈로 인한 투약 중단은 티카그렐러 60mg 병용군 (6.2%)에서 아스피린 단독 투여군 (1.5%)보다 더 빈도가 높았으며, 이들 출혈의 대부분은 중증도가 낮은 (TIMI 기준 의학적 주의가 요구되는 출혈로 분류) 비출혈, 멍, 혈종 등이었습니다.
티카그렐러 60mg의 출혈 프로파일은 TIMI 기준 주요한 출혈, TIMI 기준 주요한 또는 경미한 출혈 및 PLATO 기준 주요 출혈 사건에 대하여, 사전 정의된 여러 하위군 (예 : 나이, 성별, 체중, 인종, 지리학적 지역, 동반 질환, 병용 요법 및 병력) 간에 일정하였습니다.
두개내출혈 : 자발적 두개내출혈은 티카그렐러 60mg 병용군 및 아스피린 단독 투여군에서 유사하게 보고되었습니다 (각각 13건, 0.2%). 외상 및 시술에 의한 두개내출혈은 티카그렐러 60mg 투여군 (15건, 0.2%)에서 아스피린 단독 투여군(10건, 0.1%)보다 경미하게 많았습니다. 치명적 두개내출혈은 티카그렐러 60mg 병용군에서 6건, 아스피린 단독 투여군에서 5건이 있었습니다. 연구 모집단의 유의한 동반이환율과 심혈관계 위험을 고려했을 때 양쪽 치료군 모두에서 두개내출혈의 발생률은 낮았습니다.
② 호흡곤란
숨이 차는 느낌의 호흡곤란이 이 약 투여 환자에서 보고되었습니다. PLATO 연구에서 호흡곤란 이상반응(호흡곤란, 흡식시 호흡곤란, 운동호흡곤란, 발작성 야간호흡곤란, 야간호흡곤란 포함)은 이 약 투여(1일 2회, 1회 90밀리그램) 환자의 13.8%, 클로피도그렐 투여 환자(1일 1회 75밀리그램)의 7.8%에서 보고되었습니다. PLATO 연구에서 이 약 투여 환자의 2.2%, 클로피도그렐 투여 환자의 0.6%에서 치료와 관련한 이상반응으로 판정되었으며, 중대한 이상반응은 거의 없었습니다 (이 약 0.14%, 클로피도그렐 0.02%). 대부분의 보고된 호흡곤란은 경증에서 중등증이었습니다. 그리고 대부분은 치료 시작 후 초기에 단독 사례로서 보고되었습니다.
클로피도그렐과 비교하여, 천식/COPD 환자에서의 이 약 투여 시 심각하지 않은 호흡곤란(이 약 3.29%, 클로피도그렐 0.53%), 중증 호흡곤란 (이 약 0.38%, 클로피도그렐 0.00%)을 경험할 비율이 증가한 것으로 나타났습니다. 절대적인 용어로는 이러한 위험이 전반적인 PLATO 집단에서 높았습니다. 티카그렐러는 천식 또는 COPD 병력이 있는 환자에 투여 시 주의하여야 합니다.
발병 건수의 약 30%는 7일 이내에 해소되었습니다. PLATO 연구는 연구시작 시점에서 울혈성심부전, 만성 폐쇄성 폐질환 또는 천식이 있는 환자들을 포함하였습니다. 이러한 환자들 및 고령자에서 호흡곤란이 더 많이 보고되었습니다. 이 약 복용 환자 중 0.9%, 클로피도그렐 복용 환자 중 0.1%가 호흡곤란으로 투약을 중단하였습니다. 이 약에서 호흡곤란의 더 높은 빈도는 심장 또는 폐질환 발생 또는 악화와 무관합니다. 이 약은 폐기능 검사에 영향을 주지 않습니다.
PEGASUS 연구에서 호흡곤란은 이 약 투여(1일 2회, 1회 60밀리그램) 환자의 14.2%, 아스피린 단독 투여 환자의 5.5%에서 보고되었습니다. PLATO 연구에서와 같이, 대부분의 보고된 호흡곤란은 경증에서 중등증이었습니다. 호흡곤란을 경험한 환자들은 고령이면서 기저 상태에서 호흡곤란, 만성심부전, COPD 또는 천식이 있는 경향을 보였습니다.
③ 실험실적 수치 이상(요산 증가)
혈청 요산 수치가 정상 상한치를 초과한 경우는 PLATO 연구에서 클로피도그렐 투여군에서 13%, 이 약 투여군에서 22% 나타났습니다. PEGASUS 연구에서는 이 약 90밀리그램 투여군, 60밀리그램 투여군, 위약 투여군에서 각각 9.1%, 8.8%, 5.5%로 나타났습니다.
평균 혈청 요산 수치는 PLATO 연구에서 클로피도그렐 투여군에서 약 7.5%, 이 약 투여군에서 15% 증가하였으며, 투약 중단 후 이 약 투여군에서는 약 7% 감소하였으나 클로피도그렐 투여군에서는 감소되지 않았습니다. PEGASUS 연구에서는 평균 혈청 요산 수치의 가역적 변화가 이 약 90밀리그램 투여군, 60밀리그램 투여군, 위약 투여군에서 각각 6.3%, 5.6%, 1.5% 나타났습니다.
통풍성 관절염의 발생빈도는 PLATO 연구에서 이 약 투여군 0.2%, 클로피도그렐 투여군 0.1%였고, PEGASUS 연구에서는 이 약 90밀리그램 투여군, 60밀리그램 투여군, 위약 투여군에서 각각 1.6%, 1.5%, 1.1%로 나타났습니다.
4) 국내 시판 후 이상사례 보고자료(1989–2015년)를 토대로 실마리정보 분석 · 평가 결과 새로 확인된 이상사례는 다음과 같습니다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.
· 전신 및 투여 부위 이상 : 가슴통증
· 호흡기계 : 기침, 폐출혈
※ 국내 시판 후 조사결과
국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 급성관상동맥증후군 환자 3,097명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과, 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 50.60% (1,567/3,097명, 총 3,032건)로 보고되었으며, 가장 흔하게 보고된 이상사례는 호흡곤란(15.37%)이었습니다. 이 중 인과관계와 상관없는 중대한 이상사례 및 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응을 발현 빈도에 따라 아래 표에 나열하였습니다.

발현빈도	기관계명	인과관계와 상관없는 중대한 이상사례 4.88% (151/3,097명, 169건)	인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응 1.29% (40/3,097명, 41건)
드물게 (0.1% 미만)	호흡기계 질환	인두염, 상기도감염, 천식, 흉막삼출, 기관지염, 기흉	인두염, 폐렴, 폐부종
	전신 질환	무력증, 아나필락시스성쇼크	–
	혈소판, 출혈, 응고장애	비출혈, 객혈, 혈종, 뇌출혈	비출혈, 객혈, 혈종, 뇌출혈
	중추 및 말초신경계 장애	어지러움, 착추관협착, 치매, 편두통, 마비, 보행이상	보행이상
	위장관계 장애	복통, 설사, 위식도역류, 직장출혈, 항문출혈, 촉수돌기염	직장출혈, 항문출혈, 촉수돌기염
	근육 · 골격계 장애	건질환, 은활낭염, 횡문근융해	–
	대사 및 영양 질환	당뇨병, 고칼륨혈증, 고혈당증, 갈증, 당뇨병악화	–
	간 및 담도계 질환	간염	–
	정신질환	코골이	–
	일반 심혈관 질환	동맥류	심부전
	심장 박동 장애	두근거림, 심실성빈맥, 부정맥, 심실세동, 심장정지	심실세동
	비뇨기계 질환	요로감염, 신결석	–
	혈관 질환	뇌허혈, 정맥혈착	뇌경색
	심근, 심내막, 심막, 판막 질환	동맥혈착, 협심증, 관상동맥혈전증, 심근허혈	–
	방어기전 장애	곰팡이감염	–
	적혈구 장애	빈혈	–
	청력 및 전정기관 장애	전정장애	–
	신생물	악성남성생식기신생물	–
	중독 관련 용어	화학적중독	–
	기타 용어	시술후혈종, 열상, 도로교통사고, 외상	시술후혈종, 도로 교통사고, 외상
때때로 (0.1 ~ 5% 미만)	호흡기계 질환	호흡곤란, 폐렴, 폐부종	호흡곤란
	전신 질환	가슴통증	가슴통증
	혈소판, 출혈, 응고장애	흑색변, 위장관출혈	흑색변, 위장관출혈
	위장관계 장애	구역, 구토	–
	일반 심혈관 질환	심부전	–
	비뇨기계 질환	급성신부전	–
	혈관 질환	뇌경색	
	심근, 심내막, 심막, 판막 질환	심근경색증	–

또한, 인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례와 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응은 발현 빈도에 따라 다음의 표에 나열하였습니다.

발현빈도	기관계명	인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례 25.99% (805/3,097명, 1,189건)	인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응 7.04% (218/3,097명, 321건)
드물게 (0.1% 미만)	호흡기계 질환	부비동염, 기관지염, 만성폐쇄성기도질환, 후두염, 가래증가, 기관지확장증, 기흉, 수면무호흡, 폐울혈	폐부종, 후두염
	전신 질환	구강부종, 독감유사증후, 결핵균감염, 고체온, 상세불명의탈장, 숨막힘, 아나필락시스성쇼크, 전신부종	말초부종, 얼굴부종, 오한으로인한떨림, 숨막힘
	혈소판, 출혈, 응고장애	혈전증, 다리혈전정맥염, 심부정맥혈전증, 심장내혈전, 응고장애, 혈소판증가혈증	–
	중추 및 말초신경계 장애	언어장애, 척추관협착, 치매, 편두통, 뇌저산소증, 두피압통, 마비, 말초신경병증, 목경직, 발성장애, 발작, 보행이상, 신경병증, 신경통, 운동이상증, 진전, 하반신마비, 혼수	감각저하, 언어장애, 편두통, 보행이상
	위장관계 장애	구강통증, 위장염, 트림, 과민성대장증후군, 구내염, 계양성구내염, 양성위장관신생물, 충수돌기염, 치아질환, 혀질환	구강건조, 위염, 위궤양, 구강통증, 트림, 충수돌기염
	근육 · 골격계 장애	건염, 건질환, 관절증, 연골석회화증, 윤활낭염, 척추골관절염, 횡문근융해	관절염
	피부와 부속기관 장애	접촉성피부염, 진균피부염, 피부질환, 홍반성발진, 각화과다증, 급성두드러기, 손발톱곰팡이증, 탈감소증, 피부경화증, 피부연성섬유증	땀증가, 접촉성피부염, 피부질환, 홍반성발진
	대사 및 영양 질환	고지혈증, 고중성지방혈증, 당뇨병악화, 고콜레스테롤혈증, 지방이영양증, 탈수	갈증, 고중성지방혈증

5. 상호작용
이 약은 주로 CYP3A4의 기질이며 경도의 CYP3A4 저해제입니다. 티카그렐러는 또한 P-당단백(P-glycoprotein, P-gp)의 기질이자 약한 P-gp 저해제로서, P-gp 기질들의 노출을 증가시킬 수 있습니다.
1) 다른 약물이 이 약에 미치는 영향
① 강력한 CYP3A4 저해제 – 티카그렐러와 케토코나졸의 병용투여는 티카그렐러의 Cmax 및 AUC를 각각 2.4배 및 7.3배 증가시켰습니다. 활성대사체의 Cmax 및 AUC는 각각 89% 및 56% 감소하였습니다. 기타 강력한 CYP3A4 저해제 (예 : 클래리스로마이신, 네파조돈, 리토나비르 및 아타자나비르)는 유사한 영향을 가질 것으로 예상되므로 이 약과 병용 투여하지 않도록 합니다.
② 중등도의 CYP3A4 저해제 – 티카그렐러와 딜티아젬의 병용투여는 티카그렐러의 Cmax를 69% 및 AUC를 2.7배까지 증가시켰으며, 활성대사체의 Cmax를 38% 감소시켰고 AUC에는 변화가 없었습니다. 티카그렐러가 딜티아젬 혈장 농도에 미치는 영향은 없었습니다. 기타 중등도의 CYP3A4 저해제들 (예 : 암프레나비르, 아프레피탄트, 에리스로마이신, 플루코나졸)은 유사한 영향을 가질 것으로 예상되므로 이 약과 병용투여 할 수 있습니다.
③ CYP3A 유도제 : 티카그렐러와 리팜피신의 병용투여는 티카그렐러의 Cmax 및 AUC를 각각 73% 및 86% 감소시켰습니다. 활성대사체의 Cmax는 변화되지 않았으며 AUC는 46% 감소되었습니다. 기타 CYP3A4 유도제들 (예 : 페니토인, 카르바마제핀, 페노바르비탈) 또한 이 약의 노출 및 유효성을 감소시킬 것으로 예상됩니다.
④ 임상약리학적 상호작용연구들은 티카그렐러와 헤파린, 에녹사파린 및 아스피린과의 병용투여가 티카그렐러 또는 활성대사체에 영향이 없으며 또는 티카그렐러 단독 투여와 비교시 ADP-유도 혈소판 응집에 영향이 없음을 보였습니다. 티카그