

콘드로이틴설페이트나트륨 300mg 함유 활성비타민+말초혈행장애 치료제

일반 의약품
분류번호: 316

콘티플러스 연질캡슐

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(1,430mg)중

■ 유효성분: 콘드로이틴설페이트나트륨(KP)	300mg
푸르셀티아민(KP)	50mg
리보플라빈부티레이트(KP)	6mg
니코틴산아미드(KP)	10mg
판토텐산칼슘(KP)	10mg
피리독신염산염(KP)	11mg
시아노코발라민(KP)	30μg
토코페롤아세테이트(KP)	50mg
(비타민E로서 50IU)	
γ-오리자놀(KP)	5mg

■ 첨가제(타르색소): 적색40호, 황색5호

■ 첨가제(동물유래성분): 젤라틴(소, 가축내피), 콘드로이틴설페이트나트륨(소, 연골)

■ 기타 첨가제: 농글리세린, 레시틴, 백납, 산화티탄, 소르비톨액(비결정성), 에틸바닐린, 콩기름, 팜유

【성상】 황색의 내용물이 충전된 적색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

1. 다음 종류의 비타민(E, B₁, B₂, B₆)의 보급: 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
· 비타민 E의 보급
· 비타민 B₁의 보급
· 비타민 B₂의 보급
2. 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저림, 수족냉증(손발이 차가움)
3. 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
4. 각기, 눈의 피로

【용법·용량】 성인 및 8세 이상의 어린이: 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

【사용상 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
2) 3개월 미만의 젖먹이
3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
1) 레보도파
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
4. 다음과 같은 사람(경우에는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것)
1) 만 1세 미만의 젖먹이
2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우.
: 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변, 구내염, 식욕 부진, 복부팽만감
2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
4) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경 병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상 반응이 나타날 수 있다.
6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
7) 우발적으로 과량복용한 경우
8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상감사치에 영향을 줄 수 있다.
4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈당지질치를 점검할 것을 권장한다.
이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
7. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
3) 오용(잘못 사용)을 막고, 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 60캡슐(5캡슐/PTP X 12), 120캡슐[(5캡슐/PTP X 12) X 2]

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【제조회원】 (주)씨엘팜 / 충청남도 아산시 신창면 가내길 101

【제조원】 (주)동구바이오제약 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 18

【판매원】 (주)보령컨슈머 / 서울특별시 종로구 창경궁로 136

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 작성일(2018년 03월 06일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.go.kr>)이나 소비자 상담실(080-612-8690 불신자부담)로 문의하시어 확인할 수 있습니다.