

원료약품 및 그 분량

100g 중,

유효성분 : 테르비나핀염산염 (JP) 1g

리도카인 (KP) 2g

에녹솔론 (EP) 0.1g

디펜히드라민염산염 (KP) 1g

이소프로필메틸페놀 (별규) 1g

첨가제 : 글리세린, 락트산, 부틸히드록시톨루엔, 에탄올, 정제수,
체리블라섬HP-AE38101, 폴리옥실40경화피마자유**성상** 무색 투명한 액제**효능·효과** 무좀, 완선(사타구니백선), 백선**용법·용량** 1일 1회 적량을 환부(질환 부위)에 도포한다.**사용상의 주의사항****1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것**

- 1) 이 약 성분에 의한 과민증(발진 및 부적, 가려움, 붓기 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
- 3) 유·소아

2. 다음 부위에는 사용하지 말 것

- 1) 눈과 눈 주위, 점막(예를 들어 입안, 코안, 질 등), 음부, 외음부 등
- 2) 습진
- 3) 습기침, 짓무름, 갈라짐 또는 상처가 심한 질환부위
- 4) 손톱, 두피

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 본인 또는 가족이 알레르기 체질의 사람
- 4) 질환부위가 얼굴에 있거나 광범위한 사람
- 5) 질환부위가 꺾은 사람
- 6) 「습진」과 「무좀·완선(사타구니백선), 체부백선」의 구분이 불확실한 사람
(옴부가려움, 짓무름 등의 증상이 있는 경우에는 습진 등 다른 원인에 의한 경우가 많다.)

**4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것**

- 1) 피부 : 염증, 낙설(비듬이나 대와 같은 피부의 벗겨짐), 상처, 피부건조 및 피부가 당겨지는 느낌, 피부의 갈라짐, 통증, 색소 침착, 자극감, 열감, 인비늘, 짓무름, 수포, 발진 발적(충혈되어 붉어짐)*, 가려움증*, 붓기*, 두드러기* / * : 전신에 발현할 수도 있습니다.
- 2) 2주 정도 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우 또는 이 약의 사용에 의해 증상이 악화된 경우

5. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 준수할 것
- 2) 질환 부위와 그 주위를 깨끗이 한 후 사용할 것
- 3) 눈에 들어가지 않도록 주의. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물 또는 온수로 씻어내고, 즉시 안과의의 진료를 받을 것
- 4) 본 약제가 묻은 손으로 눈이나 점막을 만지지 말 것
- 5) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 말 것
- 6) 테르비나핀염산염 크림제는 모르모트를 대상으로 한 동물실험에서 약한 광독성이 나타났다는 보고가 있다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 습기가 적은 서늘한 곳에 밀봉하여 보관할 것
- 2) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것
- 4) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 말 것. 그리고 사용기한 내이더라도 개봉 후에는 품질 유지를 위해 최대한 빨리 사용할 것
- 5) 합성수지(스티를 등)를 연화시키거나, 도료를 녹이거나 하는 경우가 있기 때문에, 바닥이나 가구 등에 묻지 않도록 할 것
- 6) 화기에 가깝게 두거나 불 속에 넣거나 하지 말 것. 또한 사용이 끝난 용기는 불 속에 던지지 말 것

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관**포장단위** 20mL / 병※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는
한국의약품안전관리원(<http://drugsafe.or.kr> → 의약품유해사례보고)
에 알리도록 하십시오.※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보 참조※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이
발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.