

쫄쫄 씹는 맛있는

소보민시럽

비타민
B3, B6 함유

어린이멀미약

일반의약품

[원료약품 및 분량] 1포 중

- 유효성분 : 디멘히드리네이트(KP) 20.0mg
- 카페인무수물(KP) 3.0mg
- 니코틴산아미드(KP) 5.0mg
- 피리독신염산염(KP) 2.5mg
- 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 0.42mg, 파라옥시벤조산프로필 0.18mg
- 기타 첨가제 : D-소르비톨액, 고과당55, 농글리세린, 말토덱스트린, 시트르산나트륨수화물, 아스파탐, 염화나트륨, 요구르트향(SJ-AG1801126), 프로필렌글리콜

[성상] 알루미늄포에 충전된 단맛을 가진 옅은 황색의 시럽제

[효능·효과] 멀미에 의한 어지러움, 구토, 두통의 예방 및 완화

[용법·용량]

- 만 15세 이상 : 1회 2포(12 mL)
만 11세 이상 ~ 만 15세 미만 : 1회 1½포(9 mL)
만 7세 이상 ~ 만 11세 미만 : 1회 1포 (6 mL)
만 3세 이상 ~ 만 7세 미만 : 1회 ½포 (3 mL)
멀미의 예방에는 승차 30분 전에 연령에 따른 1회 분량을 복용하십시오.
또 필요시 추가 복용할 경우에는 연령에 따른 1회 분량을 4시간 이상의 간격을 두고 복용하십시오.
1일 복용횟수는 3회를 한도로 하십시오.

[사용상의 주의사항]

- 경고
이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 마십시오.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 수유부
 - 만 3세 미만의 영·유아
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오.
 - 다른 진통제, 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제, 전해제, 진해거담제(기침가래약) 등
 - 디펜히드라민을 함유한 외용제
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 환자, 배뇨(소변을 누)장애 환자
 - 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - 폐기종 혹은 만성 기관지염과 같은 호흡기 질환을 앓고 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 이 약을 복용함으로써 발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움, 심계항진(두근거림)등이 나타날 경우
 - 이 약을 복용함으로써 구갈(목마름)이 나타나는 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오.
 - 이 약을 복용함으로써 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의하십시오.
 - 1포를 분할한 후 잔량을 사용할 경우에는 입구를 잘 봉하여 보관하고 2일 이내 사용하십시오.
 - 이 약을 복용하는 동안 알코올 음료를 마시지 마십시오.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
 - 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장 방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 [포장 단위] 2포(6mL X 2)

- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
※ 기타 자세한 사항은 삼익제약홈페이지(www.samik.co.kr) 또는 온라인의약품도서관(drug.mfds.go.kr) 의약품 정보를 참조하세요. 180314, 작성일자 : 2018. 02. 28.


삼익제약주식회사

인천광역시 부평구 청안로 13
학술/개발부 : (02)928-0661