

※의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.



철 결핍성 빈혈엔 - 헤리큐 캡슐

흡수율은 높이고 위장장애는 줄인 빈혈치료제

일반의약품
분류번호 322
KGMP 적격업체

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

- 유착성분 : 폴리사카리드철착염(KP)(철(Fe)로서 150mg) 326.1mg
시아노코발라민1000배산(KP)(시아노코발라민으로서 25μg) 25.0mg
폴산(KP) 1.0mg

■ 첨가제(동물유래) : 유당수화물(가당물 : 소, 사용부위 : 우유)

■ 기타 첨가제 : 포바돈, 스테아르산마그네슘, 캡슐

[성상] 갈색의 가루가 든 상 · 하부 농갈색의 경질캡슐

[효능 · 효과] 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

[용법 · 용량] 성인 : 1일 1회, 1회 1캡슐을 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관합니다. 만약 어린이가 사고로 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락합니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분들의 과민반응 환자
- 2) 12개월 미만의 영아(갓난아기)
- 3) 혈액소중(혈대사 이상으로 철이 간장, 헤모시데린침착(조직 장애는 일으키지 않으나) 국소적 또는 전신적으로 조직의(헤모시데린으로서의) 철 함유량이 증가한 상태) 환자
- 4) 비철결핍성빈혈(예 : 비타민B₁₂ 결핍에 의한 거대적아구성 빈혈) 환자
- 5) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염
- 2) 경구용테트라사이클린계 제제
- 3) 제산제

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차 및 우유 · 유제품은 복용 중, 복용 전후에는 피하십시오.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
- 3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장에(신장(콩팥)장애) 환자
- 5) 저단백혈증 환자

6) 임부, 수유부

7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 함께 복용하는 사람(고칼혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.)

8. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 때때로 흥분(붉은 반점), 피부질환, 가려움, 전신편마, 기관지에 의한 호흡곤란 등의 알레르기 증상이 나타나는 경우
- 2) 두드러기, 가려움, 햇빛에 의한 피부 과민반응
- 3) 복부 · 위 통증, 위경련
- 4) 구토, 설사
- 5) 열, 혼수
- 6) 구역, 식욕부진, 체중감소, 부종(부기), 복통(배 아픔), 설사, 변비, 흑변, 위부불쾌감
- 7) 폴산이 부족한 환자(비타민B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.)
- 8) 대량투여로 인해 복부 통증, 구토, 구역, 설사, 흑변, 토혈(혈액구토), 저혈압, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기), 빈맥(빠른 맥), 대사성 산증, 고지혈증, 탈수, 졸음, 창백, 건태, 발작, 속, 혼수

9. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 3) 치료를 시작하기 전에 빈혈의 유형과 그 원인을 파악해야 합니다. 빈혈은 혈액 손실과 같은 전신적인 장애에 의해 발생할 수 있으므로, 가능한 한 이러한 원인들이 먼저 치료되어야 합니다.
- 4) 이 약에 함유된 폴산은 악성빈혈이 있는 환자에 투여하면 혈액상태는 개선되지만 신경증상에 효과가 없으므로 악성빈혈의 환자에 투여하는 경우에는 비타민B₁₂ 제제와 병용(함께 복용(사용))합니다. 다만, 진단이 확립되지 않은 악성빈혈이 있는 환자의 경우에 혈액상태의 개선에 의해 악성빈혈을 은폐하고 진단 및 치료에 영향을 주게 되므로 주의하십시오.
- 5) 아스코르브산(비타민C) 200mg 이상과 함께 복용하는 경우 철분의 흡수가 증가될 수 있습니다.

10. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관하십시오.
- 3) 오 · 남용(잘못사용 · 함부로 사용)을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 60캡슐, 120캡슐

[제조업체] 에이프로젠제약(주) / 경기도 화성시 안강면 두머리길 16

[제조자] (주)레고켐텍 / 경기도 안성시 원곡면 원당로 354

[판매자] (주)대웅생명과학 / 서울시 송파구 심전로 42

※ 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2018년 04월 06일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 어린이 보호용 안전포장을 사용하였습니다.

☎ 소비자 상담실 (02)561-4011

첨부문서 최종 개정연월일 : 2018년 04월 06일
1804-00